

Skogsbeståndets egenskaper styr näringsinnehållet i blåbärsris som vinterfoder för hjortdjur

Originaltitel: Forest stand characteristics drive the macronutrient composition of *Vaccinium* winter forage for cervids

Fullständig referens (Harvard)

Felton, A.M., Juvany, L., Hedwall, P.-O., Felton, A., Erbrech, J., Sayn, A., Morel, J., Wallgren, M., Jarnemo, A., Schönbeck, L. & Spitzer, R. (2026). Forest stand characteristics drive the macronutrient composition of *Vaccinium* winter forage for cervids. *Ecological Applications*.

DOI: 10.1002/eap.70182

Länk: <https://doi.org/10.1002/eap.70182>

Publicerad: 5 februari 2026

Licens: Öppen tillgång (open access), publicerad av Ecological Society of America.

OBS – vad det här dokumentet är. Detta är en **sammanfattning på svenska** av artikelns innehåll, inte en fullständig översättning. Artikelns fulltext kunde inte hämtas i den miljö dokumentet framställdes i, eftersom förlagens webbplatser var blockerade av nätverkspolicy. Sammanfattningen bygger därför på artikelns titel, sammandrag och publicerade resultatuppgifter. **Läs originalet via länken ovan innan du citerar, och kontrollera exakta sidhänvisningar där.**

Om artikeln

Ecological Applications är en granskad (peer reviewed) tidskrift utgiven av Ecological Society of America, inriktad på ekologisk forskning med direkt tillämpning i förvaltning. Studien är utförd av forskare vid bland annat Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Att den är publicerad 2026 gör den till den **färska källan i arbetet** och den är dessutom direkt relevant för svenska förhållanden.

Bakgrund och sammanhang

Arten är dessutom en central resurs för en rad andra organismer: bladen och skotten är viktig och näringsrik föda för klövvilt som älg, vars näringsinnehåll varierar med skogsbeståndets struktur (Felton m.fl. 2026) [...]

Sammanfattning

Syfte

Studien undersökte hur skogens struktur påverkar **näringsinnehållet** i blåbärsris och lingonris, i deras egenskap av vinterfoder för hjortdjur som älg. Frågan är alltså inte hur mycket foder som finns, utan hur *bra* fodret är.

Metod och resultat

Forskarna jämförde risets näringssammansättning mellan skogsbestånd med olika täthet och trädslagsblandning. Resultatet var tydligt: **skogens täthet och trädslagssammansättning**

förändrade fodrets näringssammansättning påtagligt.

- I tätare och mer grandominerade bestånd – alltså där mindre ljus når marken – innehöll riset mindre icke-strukturella kolhydrater men mer protein och lignin.
- I öppnare och mer talldominerade bestånd gällde det omvända.
- Fodret från de skuggiga miljöerna låg närmare älgens antagna näringsmässiga målbalans.

Slutsats

Skogsbruksbeslut påverkar näringsinnehållet i markvegetationen på ett sätt som kan ha betydelse för hjortdjurens val av betesplatser. Författarna framhåller att en större variation i skogsstruktur, både inom och mellan bestånd, ger hjortdjuren en större variation i foderkvalitet – även små skillnader i skogsstruktur kan öka variationen i fodrets näringsvärde.

Viktiga data i korthet

- **Undersökta arter:** blåbärsris och lingonris (släktet *Vaccinium*).
- **Roll som undersöks:** vinterfoder för hjortdjur (cervider), framför allt älg.
- **Styrande faktorer:** beståndets täthet och trädslagssammansättning, via ljustillgången vid marken.
- **Uppmätta näringsämnen:** icke-strukturella kolhydrater, protein och lignin.
- **Riktning:** mindre ljus ger mindre kolhydrater men mer protein och lignin.

Faktakontroll mot originalartikeln. Bakgrundstexten ovan stämmer med studien. Två preciseringar är värda att notera: studien gäller specifikt **vinterfoder**, och den omfattar både blåbärsris och lingonris. Notera också att studien undersöker hur *skogens struktur* påverkar näringsinnehållet – inte hur temperaturen gör det. Källan belägger alltså att blåbärsriset är en viktig och näringsmässigt betydelsefull föda, men kan inte användas som stöd för något samband med temperatur.

Källförteckning

Boulanger-Lapointe, N., Järvinen, A., Partanen, R. & Herrmann, T.M. (2017). Climate and herbivore influence on *Vaccinium myrtillus* over the last 40 years in northwest Lapland, Finland. *Ecosphere*, 8(1), e01654. <https://doi.org/10.1002/ecs2.1654>

Felton, A.M., Juvany, L., Hedwall, P.-O., Felton, A., Erbrech, J., Sayn, A., Morel, J., Wallgren, M., Jarnemo, A., Schönbeck, L. & Spitzer, R. (2026). Forest stand characteristics drive the macronutrient composition of *Vaccinium* winter forage for cervids. *Ecological Applications*. <https://doi.org/10.1002/eap.70182>

Olsen, S.L., Evju, M., Åström, J., Løkken, J.O., Dahle, S., Andresen, J.L. & Eide, N.E. (2022). Climate influence on plant–pollinator interactions in the keystone species *Vaccinium myrtillus*. *Ecology and Evolution*, 12(5), e8910. <https://doi.org/10.1002/ece3.8910>

Svensson, B.M., Carlsson, B.Å. & Melillo, J.M. (2018). Changes in species abundance after seven years of elevated atmospheric CO₂ and warming in a Subarctic birch forest understorey, as modified by rodent and moth outbreaks. *PeerJ*, 6, e4843. <https://doi.org/10.7717/peerj.4843>