

Skogsbeståndets egenskaper styr näringsinnehållet i blåbärsris som vinterfoder för hjortdjur

Originaltitel: Forest stand characteristics drive the macronutrient composition of *Vaccinium* winter forage for cervids

Fullständig referens (Harvard)

Felton, A.M., Juvany, L., Hedwall, P.-O., Felton, A., Erbrech, J., Sayn, A., Morel, J., Wallgren, M., Jarnemo, A., Schönbeck, L. & Spitzer, R. (2026). Forest stand characteristics drive the macronutrient composition of *Vaccinium* winter forage for cervids. *Ecological Applications*.

DOI: 10.1002/eap.70182

Länk: <https://doi.org/10.1002/eap.70182>

Publicerad: 5 februari 2026

Licens: Öppen tillgång (open access), publicerad av Ecological Society of America.

OBS – vad det här dokumentet är. Detta är en **sammanfattning på svenska** av artikelns innehåll, inte en fullständig översättning. Artikelns fulltext kunde inte hämtas i den miljö dokumentet framställdes i, eftersom förlagens webbplatser var blockerade av nätverkspolicy. Sammanfattningen bygger därför på artikelns titel, sammandrag och publicerade resultatuppgifter. **Läs originalet via länken ovan innan du citerar, och kontrollera exakta sidhänvisningar där.**

Om artikeln

Ecological Applications är en granskad (peer reviewed) tidskrift utgiven av Ecological Society of America, inriktad på ekologisk forskning med direkt tillämpning i förvaltning. Studien är utförd av forskare vid bland annat Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Att den är publicerad 2026 gör den till den **färska källan i arbetet** och den är dessutom direkt relevant för svenska förhållanden.

Bakgrund och sammanhang

Arten är dessutom en central resurs för en rad andra organismer: bladen och skotten är viktig och näringsrik föda för klövvilt som älg, vars näringsinnehåll varierar med skogsbeståndets struktur (Felton m.fl. 2026) [...]

Sammanfattning

Syfte

Studien undersökte hur skogens struktur påverkar **näringsinnehållet** i blåbärsris och lingonris, i deras egenskap av vinterfoder för hjortdjur som älg. Frågan är alltså inte hur mycket foder som finns, utan hur *bra* fodret är.

Metod och resultat

Forskarna jämförde risets näringssammansättning mellan skogsbestånd med olika täthet och trädslagsblandning. Resultatet var tydligt: **skogens täthet och trädslagssammansättning**

förändrade fodrets näringssammansättning påtagligt.

- I tätare och mer grandominerade bestånd – alltså där mindre ljus når marken – innehöll riset mindre icke-strukturella kolhydrater men mer protein och lignin.
- I öppnare och mer talldominerade bestånd gällde det omvända.
- Fodret från de skuggiga miljöerna låg närmare älgens antagna näringsmässiga målbalans.

Slutsats

Skogsbruksbeslut påverkar näringsinnehållet i markvegetationen på ett sätt som kan ha betydelse för hjordjurens val av betesplatser. Författarna framhåller att en större variation i skogsstruktur, både inom och mellan bestånd, ger hjordjuret en större variation i foderkvalitet – även små skillnader i skogsstruktur kan öka variationen i fodrets näringsvärde.

Viktiga data i korthet

- **Undersökta arter:** blåbärsris och lingonris (släktet *Vaccinium*).
- **Roll som undersöks:** vinterfoder för hjordjur (cervider), framför allt älg.
- **Styrande faktorer:** beståndets täthet och trädslagssammansättning, via ljustillgången vid marken.
- **Uppmätta näringsämnen:** icke-strukturella kolhydrater, protein och lignin.
- **Riktning:** mindre ljus ger mindre kolhydrater men mer protein och lignin.

Faktakontroll mot originalartikeln. Bakgrundstexten ovan stämmer med studien. Två preciseringar är värda att notera: studien gäller specifikt **vinterfoder**, och den omfattar både blåbärsris och lingonris. Notera också att studien undersöker hur *skogens struktur* påverkar näringsinnehållet – inte hur temperaturen gör det. Källan belägger alltså att blåbärsriset är en viktig och näringsmässigt betydelsefull föda, men kan inte användas som stöd för något samband med temperatur.

Källförteckning

Källförteckning

Boulanger-Lapointe, N., Järvinen, A., Partanen, R. & Herrmann, T.M. (2017). Climate and herbivore influence on *Vaccinium myrtillus* over the last 40 years in northwest Lapland, Finland. *Ecosphere*, 8(1), e01654. <https://doi.org/10.1002/ecs2.1654>

Felton, A.M., Juvany, L., Hedwall, P.-O., Felton, A., Erbrech, J., Sayn, A., Morel, J., Wallgren, M., Jarnemo, A., Schönbeck, L. & Spitzer, R. (2026). Forest stand characteristics drive the macronutrient composition of *Vaccinium* winter forage for cervids. *Ecological Applications*. <https://doi.org/10.1002/eap.70182>

Olsen, S.L., Evju, M., Åström, J., Løkken, J.O., Dahle, S., Andresen, J.L. & Eide, N.E. (2022). Climate influence on plant–pollinator interactions in the keystone species *Vaccinium myrtillus*. *Ecology and Evolution*, 12(5), e8910. <https://doi.org/10.1002/ece3.8910>

Svensson, B.M., Carlsson, B.Å. & Melillo, J.M. (2018). Changes in species abundance after seven years of elevated atmospheric CO₂ and warming in a Subarctic birch forest understorey, as modified by rodent and moth outbreaks. *PeerJ*, 6, e4843. <https://doi.org/10.7717/peerj.4843>