

Logik

Serie 4

Nikita Emanuel John Fehér, 3793479

Erik Thun, 3794446

30. Mai 2025

Mittwoch 09:15-10:45 Keitsch, Jamie; Gruppe e

H 4-1. Syntax und Semantik

(3 Pkt.)

Sei $I \in \mathcal{B}$ eine Interpretation und $A \in \mathcal{A}$ ein Atom. Zeigen Sie per struktureller Induktion, daß für alle $\varphi \in \mathcal{F}$:

$$I_{[A \mapsto 1]}(\varphi) = I(\varphi[T/A])$$

$\mathcal{I}A$: $\varphi = B$

Fall 1 $B = A$

$$\mathcal{I}_{[A \mapsto 1]}(A) = 1 \quad \varphi[T/A] = T,$$

$$\mathcal{I}(T) = 1 \Rightarrow \mathcal{I}_{[A \mapsto 1]}(A) = \mathcal{I}(\varphi[T/A]) \quad \checkmark$$

Fall 2 $B \neq A$

$$\mathcal{I}_{[A \mapsto 1]}(B) = \mathcal{I}(B), \quad \varphi[T/A] = B,$$

$$\mathcal{I}(B) = \mathcal{I}(B) \Rightarrow \mathcal{I}_{[A \mapsto 1]}(B) = \mathcal{I}(\varphi[T/A]) \quad \checkmark$$

$\mathcal{I}\neg$

Wir nehmen an, dass die Aussage für φ und ψ gilt:

$$\mathcal{I}_{[A \mapsto 1]}(\varphi) = \mathcal{I}(\varphi[T/A]), \quad \mathcal{I}_{[A \mapsto 1]}(\psi) = \mathcal{I}(\psi[T/A])$$

$\mathcal{I}\wedge$

1. $\varphi = \neg x$:

$$\mathcal{I}_{[A \mapsto 1]}(\neg x) = \neg \mathcal{I}_{[A \mapsto 1]}(x) = \neg \mathcal{I}(x[T/A]) = \mathcal{I}(\neg x[T/A]) \quad \text{1.1}$$

$$(\text{da } (\neg x)[T/A] = \neg (x[T/A])) \quad ?$$

2. $\varphi = (x_1 \wedge x_2)$:

$$\mathcal{I}_{[A \mapsto 1]}(x_1 \wedge x_2) = \mathcal{I}_{[A \mapsto 1]}(x_1) \wedge \mathcal{I}_{[A \mapsto 1]}(x_2) = \mathcal{I}(x_1[T/A]) \wedge \mathcal{I}(x_2[T/A]) = \mathcal{I}((x_1 \wedge x_2)[T/A])$$

$$(\text{da } (x_1 \wedge x_2)[T/A] = x_1[T/A] \wedge x_2[T/A]) \quad \text{1.2}$$

∴ Analog für weitere Operatoren.

H 4-2. Alternative Resolventendefinition

(2 Pkt.)


Seien C_1, C_2 Klauseln. Eine Klausel R^* heißt *Resolvente** von C_1 und C_2 , falls es zwei Literale L_1, L_2 gibt mit:

$$L_1, L_2 \in C_1, \quad \overline{L_1}, \overline{L_2} \in C_2 \quad \text{und} \quad R^* = (C_1 \setminus \{L_1, L_2\}) \cup (C_2 \setminus \{\overline{L_1}, \overline{L_2}\})$$

Zeigen Sie, daß unter Resolvente* das Resolutionslemma nicht gilt, d.h. es existieren Klauseln C_1 und C_2 , sodaß:

$$\{C_1, C_2\} \not\models \{C_1, C_2, R^*\}$$

Sei $C_1 = \{A, B\}$

$C_2 = \{A, B\}$ 

$\Rightarrow L_1 = A, L_2 = B$

$\Rightarrow R^* = \emptyset$  2.1

$\Rightarrow \{C_1, C_2\}$ ist erfüllbar (z.B. $\mathcal{I}(A) = 1 = \mathcal{I}(B)$)

$\Rightarrow \downarrow \{C_1, C_2, R^*\}$ ist unerfüllbar da $\emptyset = \perp$

H 4-3. Kompaktheitssatz
Gegeben folgende drei Formeltypen:

(3 Pkt.)

- $\varphi_i = (A_{3i-2} \wedge A_{3i-1}) \vee (A_{3i-2} \wedge A_{3i}) \vee (A_{3i-1} \wedge A_{3i})$
- $\psi_i = \neg(A_{3i-2} \wedge A_{3i-1} \wedge A_{3i})$
- $\xi_i = A_i \leftrightarrow A_{i^2+1}$

Des Weiteren sei $\phi = \bigcup_{n \geq 1} \phi_n$ wobei $\phi_n = \{\varphi_i, \psi_i, \xi_i \mid 1 \leq i \leq n\}$. Zeigen Sie mit Hilfe des Kompaktheitssatzes, daß ϕ erfüllbar ist.

Hinweise: Überlegen Sie zunächst, was die Wahrheit von $\varphi_i \wedge \psi_i$ für den i -ten Dreierblock an atomaren Aussagen kodiert. Zeigen Sie anschließend per vollständiger Induktion, daß ϕ_n für jedes $n \geq 1$ erfüllbar ist.

Damit φ_i wahr ist müssen mindestens zwei A_n wahr sein

Damit ψ_i wahr ist dürfen nicht alle drei A_n wahr sein

$\Rightarrow \varphi_i \wedge \psi_i$ ist wahr wenn genau zwei A_n wahr sind ✓

ξ_i ist wahr A_n und A_{n^2+1} gleich belegt sind

$A_{3i-2}, A_{3i-1}, A_{3i}$ bilden einen Dreierblock ✓

$\exists A$: $n=1$

$A_{3 \cdot 1 - 2} = A_1$
 $A_{3 \cdot 1 - 1} = A_2$
 $A_{3 \cdot 1} = A_3$

Wir zeigen durch $A_1 = \text{wahr}, A_2 = \text{wahr}, A_3 = \text{falsch}$

\Rightarrow mindestens zwei A_n wahr $\Rightarrow \varphi_1$ wahr

\Rightarrow nicht drei A_n wahr $\Rightarrow \psi_1$ wahr

$\Rightarrow A_1$ und A_2 gleich $\Rightarrow \xi_1$ wahr

$\Rightarrow \phi_1$ erfüllbar ✓

$\exists S$: $n+1$

φ_{n+1} nutzt unabhängige A_n zu φ_n

ψ_{n+1} nutzt —||— A_n zu ψ_n

$\Rightarrow \varphi_{n+1} \wedge \psi_{n+1}$ erfüllbar

$$\xi_{n+1} = A_{n+1} \leftrightarrow A_{(n+1)^2+1}$$

da in einem dreier Block 2 Wahr, 1 Falsch möglich ist kann ich φ_{n+1} und ψ_{n+1} immer erfüllen, ich bin immer in der Lage A_{n+1} und A_{n^2+3n} gleich zu wählen

$\Rightarrow \phi_{n+1}$ immer erfüllbar 3.1

$\Rightarrow \phi_n \subseteq \phi \Rightarrow \phi = \bigcup_{n \geq 1} \phi_n$ erfüllbar 3.2

- a) Seien $\varphi = (\neg A_1 \vee A_2) \wedge (A_3 \vee \neg A_2)$ und $\psi = A_1 \rightarrow (A_4 \vee A_3)$. Geben Sie eine Interpolante zu φ und ψ an.
- b) Beweisen Sie mit Hilfe des Interpolationstheorems, daß für alle $\varphi, \psi \in \mathcal{F}$:

Falls $\varphi \models \psi$ und $s(\varphi) \cap s(\psi) = \emptyset$, dann φ unerfüllbar oder ψ tautologisch.

Hinweis: Wir setzen $s(\perp) = \emptyset$.

A	B	C	$(\neg A \vee B) \wedge (C \vee \neg B)$
F	F	F	T
F	F	T	T
F	T	F	F
F	T	T	T
T	F	F	F
T	F	T	F
T	T	F	F
T	T	T	T

A	C	D	$A \rightarrow (D \vee C)$
F	F	F	T
F	F	T	T
F	T	F	T
F	T	T	T
T	F	F	F
T	F	T	T
T	T	F	T
T	T	T	T

a) $\mathcal{I}_{\text{interpolante}} \subseteq s(\varphi) \cap s(\psi) = \{A_1, A_3\}$

$\varphi \models \mathcal{I}, \mathcal{I} \models \psi$

$\mathcal{I}: A_1 \rightarrow A_3$ ✓

b) $\varphi \models \psi \Rightarrow \varphi \models \mathcal{I}, \mathcal{I} \models \psi, s(\mathcal{I}) \subseteq s(\varphi) \cap s(\psi)$

Da $s(\varphi) \cap s(\psi) = \emptyset$

$\Rightarrow s(\mathcal{I}) \subseteq \emptyset$

$\Rightarrow \mathcal{I} \in \{T, \perp\}$ ✓

Fall 1: $\mathcal{I} = \perp$

$\varphi \models \mathcal{I} = \perp \Rightarrow \varphi$ ist unerfüllbar ✓

Fall 2: $\mathcal{I} = T$

$\mathcal{I} = T \models \psi \Rightarrow \psi$ ist tautologisch ✓

a) Gegeben sei die prädikatenlogische Formel

$$\varphi = \forall x (P(x, f(y), c) \rightarrow \exists z (Q(f(z), c) \wedge \neg R(x, z, w, c))) \vee S(y, z, c)$$

- i) Markieren (unterstreichen) Sie den Wirkungsbereich von $\exists z$.
- ii) Markieren (Punkt oberhalb) Sie alle freien Vorkommen von Variablen.
- iii) Gilt für die Menge der Teilformeln $t(\varphi)$, daß $|t(\varphi)| = 10$? Ohne Begründung.
- iv) Was ist $ar(Q)$?

b) Seien $\varphi, \psi \in \mathcal{F}_{PL}$. Betrachten Sie die folgenden Aussagen:

1. Falls $\psi \in t(\varphi)$, dann gilt $frei(\psi) \subseteq frei(\varphi)$.
2. Falls $\psi \in t(\varphi)$, dann gilt $geb(\psi) \subseteq geb(\varphi)$.

a) i)

$$\varphi = \forall x (P(x, f(y), c) \rightarrow \exists z (Q(f(z), c) \wedge \neg R(x, z, w, c))) \vee S(y, z, c) \quad \checkmark$$

ii)

$$\varphi = \forall x (P(x, f(\dot{y}), c) \rightarrow \exists z (Q(f(z), c) \wedge \neg R(x, z, w, c))) \vee S(\dot{y}, \dot{z}, c) \quad \checkmark$$

iii)

Ja \checkmark

iv)

$$ar(Q) = 2 \quad \checkmark$$

b)

1. Wahr \times

2. Falsch \times

z.B. $\psi = \exists z(\dots)$, z kommt außerhalb von φ frei vor $\rightarrow z \in geb(\psi)$, aber nicht unbedingt $z \in geb(\varphi)$

5.1

- a) Gegeben (\mathfrak{A}, β) mit $U^{\mathfrak{A}} = \mathbb{Z}$, $g^{\mathfrak{A}} : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $(n, m) \mapsto g^{\mathfrak{A}}(n, m) = n \cdot m$,
 $f^{\mathfrak{A}} : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $n \mapsto f^{\mathfrak{A}}(n) = n - 1$, $c^{\mathfrak{A}} = 3$, $\beta(x) = 2$.

i) Bestimmen Sie $\beta(g(g(x, x), f(c)))$.

ii) Geben Sie einen Term t an, sodaß $\beta(t) = \beta(y) \cdot \beta(y) - 4 \cdot (\beta(y) - 1)$.

b)

$$\varphi = \forall x \forall y (R(x, y) \rightarrow \exists z (R(x, z) \wedge R(z, y)))$$

i) Sei (\mathfrak{A}, β) mit $U^{\mathfrak{A}} = \mathbb{Z}$, $<_{\mathbb{Z}} = R^{\mathfrak{A}} \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$. Ist (\mathfrak{A}, β) Modell von φ ?

ii) Sei (\mathfrak{B}, γ) mit $U^{\mathfrak{B}} = \mathbb{R}$, $<_{\mathbb{R}} = R^{\mathfrak{B}} \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Ist (\mathfrak{B}, γ) Modell von φ ?

Kurze Begründung im Wahrheitsfalle bzw. Angabe einer falsifizierenden Instanz.

- c) Sei $U = \{\square, \triangle, \circ\}$ und $\varphi = \exists x \exists y R(x, y) \wedge \forall x \forall y (R(x, y) \rightarrow R(y, x))$

i) Gegeben Sie $R^{\mathfrak{A}} \neq U \times U$ an, sodaß (\mathfrak{A}, β) mit $U^{\mathfrak{A}} = U$ ein Modell von φ ist.

ii) Gegeben Sie $R^{\mathfrak{B}} \neq \emptyset$ an, sodaß (\mathfrak{B}, γ) mit $U^{\mathfrak{B}} = U$ kein Modell von φ ist.

a) i)

$$g(x, x) = g(\beta(x), \beta(x)) = g(2, 2) = 2 \cdot 2 = 4$$

$$f(c) = f(3) = 3 - 1 = 2$$

$$g(g(x, x), f(c)) = g(4, 2) = 4 \cdot 2 = \underline{\underline{8}} \quad \checkmark$$

ii) $\beta(t) = \beta(y) \cdot \beta(y) - 4 \cdot (\beta(y) - 1)$

$$= \beta(y)^2 - 4\beta(y) + 4$$

$$= (\beta(y) - 2)^2$$

$$= g(f(f(y)), f(f(y))) \quad \checkmark$$

b) i) Nein

$$\text{z.B. } x=1 \quad y=2 \quad 1 < 2 \Rightarrow R(1, 2)$$

$$\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}, \quad \forall z: z < 1, z < 2 = \{ \} \Rightarrow \text{kein } z \text{ in } \mathbb{Z} \quad \checkmark$$

ii)

Ja

$$\forall x \forall y (x < y \Rightarrow \exists z (x < z < y))$$

$$\text{z.B. } z = \frac{x+y}{2} \quad \checkmark$$

c) i)

$$R^A = \{(\Box, \Delta), (\Box, \Delta)\}$$

→ symmetrisch

→ $\exists x, y: R(x, y)$ erfüllt

→ $\forall x, y: R(x, y) \rightarrow R(y, x)$ erfüllt ✓

ii)

$$R^B = \{(\Box, \Delta)\}$$

$\exists x, y: R(x, y)$ erfüllt

$R(\Delta, \Box)$ fehlt \Rightarrow Nicht symmetrisch

$\Rightarrow (B, \gamma)$ kein Modell ✓

Index der Kommentare

- 1.1 "1-I(...)" schreiben. Wo wird die IH benutzt?
- 1.2 und/oder wurden in dem Kontext nicht definiert. Mit max bzw produkt-Funktion argumentieren
-1BE
- 2.1 Die Resolvente wäre hier {A,B}.
-2BE
- 3.1 Achtung: Was, wenn eins dieser A_m schon bereits vorher anders belegt wurde weil $m=k^2+1$ für ein k in N gilt?

Das muss noch berücksichtigt werden.
(Lösung: Das kann bei höchstens einem der drei A_m passieren, die anderen beiden können frei gewählt werden,
es ist also immer möglich, genau 2 Atome auf wahr zu setzen)
-0.5BE
- 3.2 Warum gilt die Erfüllbarkeit für alle beliebigen endlichen Teilmengen und nicht nur für die ψ_n ?
-0.5BE
- 5.1 dann ist aber $z(\dots)$ Teilformel von ψ , nicht andersum
-1BE