



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Vorlesung 14 - Ringe, Körper, Polynome

Diskrete Strukturen (WS 2024-25)

Łukasz Grabowski

Mathematisches Institut

Übersicht

1. Wiederholung
2. Polynome
3. Abstrakter Sichtpunkt - Ideale und Faktorringer

1. Wiederholung

2. Polynome

3. Abstrakter Sichtpunkt - Ideale und Faktorringer

- Ein Ring ist eine algebraische Struktur $(M, +, \cdot)$, so dass
 - ▶ $(M, +)$ ist eine kommutative Gruppe (genannt additive Gruppe des Rings)
 - ▶ \cdot ist assoziativ und kommutativ
 - ▶ es gibt $1_M \in M$ so dass für alle $m \in M$ gilt $1_M \cdot m = m$ (daraus folgt, dass 1_M eindeutig ist).
 - ▶ für alle $a, b, c \in M$ gilt $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$.

- Körper - ein Ring $(M, +, \cdot)$ so dass für jedes $x \in M$ mit $x \neq 0_M$ existiert $y \in M$ mit $xy = 1_M$.
- Äquivalent: $(M, +, \cdot)$ ist ein Körper, wenn $(M \setminus \{0_M\}, \cdot)$ eine Gruppe ist.
- Beispiele für Körper: $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ und $(\mathbb{C}, +, \cdot)$. $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ ist kein Körper.
- In einem Körper $(M, +, \cdot)$ gilt, dass $xy = 0$ impliziert, dass $x = 0$ oder $y = 0$.
 - In der Tat, wenn $x \neq 0$ dann können wir schreiben $y = x^{-1}xy = x^{-1}0 = 0$.
- Wenn A und B Ringe sind, dann ist $A \times B$ ebenfalls ein Ring. Wenn A und B jedoch Körper sind, dann ist $A \times B$ kein Körper: wir haben $(1_A, 0_B) \cdot (0_A, 1_B) = (0_A, 0_B)$

Beispiel

\mathbb{Z}/m ist ein Ring. Wenn m nicht prim ist, kann man $[a], [b] \in \mathbb{Z}/m$ mit $[a], [b] \neq [0]$ so finden, dass $[a][b] = 0$. Wenn also m nicht prim ist, dann ist \mathbb{Z}/m kein Körper.

Lemma. \mathbb{Z}/p ist ein Körper gdw. p ist eine Primzahl.

- Der Körper \mathbb{Q} und die Körper \mathbb{Z}/p werden als **Primkörper** bezeichnet. Jeder Körper enthält ein Primkörper.
- Gibt's andere als \mathbb{Z}/p endliche Körper?

1. Wiederholung

2. Polynome

3. Abstrakter Sichtpunkt - Ideale und Faktorringer

- Sei $(M, +, \cdot)$ ein Ring, und sei $a_0, \dots, a_n \in M$ mit $a_n \neq 0$. Wir assoziieren mit dieser endlichen Folge ein Polynom:

$$p = a_0 + a_1X + \dots a_nX^n.$$

- Dieses Polynom p definiert eine Funktion $p: M \rightarrow M$. Für alle $x \in M$:

$$p(x) = a_0 + a_1x + \dots a_nx^n \in M.$$

- Wir schreiben auch $\text{grad}(p) = n$. Das **Nullpolynom** p mit $p = 0$ hat kein Grad oder Grad $-\infty$. Ein Element $x \in M$ ist **Nullstelle** von p gdw. $p(x) = 0$.
- Die Menge von allen Polynomen mit Koeffizienten aus M wird mit $M[X]$ bezeichnet.

- Im Körper $\mathbb{Z}/5$ betrachten wir das Polynom $X^2 + 4X + 2$. Es gilt

$$p(2) \equiv 2 + (4 \cdot 2) + (2 \cdot 2) \equiv 2 + 3 + 4 \equiv 4$$

- Für die Bestimmung der Nullstellen von p berechnen wir:

- ▶ $p(0) \equiv 2,$

- ▶ $p(1) \equiv 2 + 4 + 1 \equiv 2,$

- ▶ $p(2) \equiv 4,$

- ▶ $p(3) \equiv 2 + 2 + 4 \equiv 3$ und

- ▶ $p(4) \equiv 2 + 1 + 1 \equiv 4.$

Offenbar hat p keine Nullstellen.

- Wie schnell kann man $p(a)$ berechnen?
 - ▶ Wie viele Operationen $+$ und \cdot werden gebraucht? .
 - ▶ Nicht mehr als: $(n + 1)$ (für $a_n a^n$) $+n$ (für $a_{n-1} a^{n-1} \dots$
 - ▶ Also nicht mehr als $\frac{(n+1)(n+2)}{2} + n$. D.h. Cn^2 .
 - ▶ kann man einen besseren Algorithmus finden?

Lemma. [Horner-Schema] Sei $(M, +, \cdot)$ ein Ring und sei $p = a_0 + a_1 X + \dots + a_n X$ ein Polynom von einem Grad $n \geq 0$. Dann gilt für alle $x \in M$

$$p(x) = a_0 + x \cdot (a_1 + x \cdot (a_2 + \dots x a_n))$$

- Mit Induktion beweisen wir dass mit Horner-Schema brauchen wir nur $2n$ Operationen. Also $C_1 \cdot n$. Deutlich besser als $C \cdot n^2$.

Satz. (Polynomdivision) Sei $(M, +, \cdot)$ ein Körper. Seien p und q Polynome mit $\text{grad}(q) \geq 0$. Dann existieren Polynome t und r mit

$$p(X) = t(X) \cdot q(X) + r(X)$$

und $\text{grad}(r) < \text{grad}(q)$.

- Die Polynome t und r erhält man per Polynomdivision.

$$\begin{array}{r}
 \\
 x^3 \\
 \hline
 x^2 + 1) \\
 x^5 \\
 - x^5 - x^3 \\
 \hline
 - x^3 - 2x^2 + 4x \\
 x^3 + x \\
 \hline
 - 2x^2 + 5x + 7 \\
 2x^2 + 2 \\
 \hline
 5x + 9
 \end{array}$$

- $x^5 - 2x^2 + 4x + 7 = (x^3 - x - 2)(x^2 + 1) + (5x + 9)$

[illegible]

- In \mathbb{Q} : $x^5 - 2x^2 + 4x + 7 = (\frac{1}{2}x^3 - \frac{1}{4}x - 1)(2x^2 + 1) + (\frac{17}{4}x + 8)$
- In $\mathbb{Z}/5$: $x^5 - 2x^2 + 4x + 2 \equiv (3x^3 + x - 1)(2x^2 + 1) + (3x + 3)$

- Folgerung: Wenn M ist ein Körper, dann $M[X]$ hat Euklidischer Algorithmus.
 - ▶ Wenn $p, q \in M[X]$ und $\text{ggT}(p, q) = 1$, dann existieren polynome a, b mit $ap + bq = 1$. ($\text{ggT}(p, q)$ ist nur bis zur Multiplikation mit einer Konstante nicht gleich Null definiert!)
 - ▶ Z.B.
 - ▶ $p = x^4 - 2x^2 - 3x - 2$ $q = x^3 + 4x^2 + 4x + 1$
 - ▶ Euklidischer Algorithmus: $\text{ggT}(p, q) = x + 1$
 - ▶ Bezout-identität:

$$x + 1(5x^2/22 - 3x/11 - 3/11)p + (-5x/22 - 7/11)q$$

- Wir sagen, dass ein Polynom f irreduzibel ist, wenn es mindestens den Grad 1 hat, und seine einzigen Teiler von der Form Cf , C sind, wobei $C \in M$.
- Folgerung: “Unreduzierbare Polynome sind prim”
 - ▶ Das heißt, wenn $f \in M[X]$ irreduzibel ist, dann hat f die folgende Eigenschaft. Wenn $f \mid ab$ und $f \nmid a$, dann $f \mid b$.
 - ▶ Beweis. Wir schreiben $sf + ta = 1$, dann erhalten wir $sf b + tab = b$, und wir erhalten, dass f die linke Seite teilt, und deshalb teilt es auch die rechte Seite.
 - ▶ Zum Beispiel: in $\mathbb{Z}/5$ das Polynom $p = X^2 + 4X + 2$ ist irreduzibel.

- Folgerung: (“Eindeutigkeit der Faktorisierung”) Wenn $f \in M[X]$, dann kann f als Produkt irreduzibler Polynome $p_1 \cdot \dots \cdot p_k$ geschrieben werden. Die Polynome p_1, \dots, p_k sind bis zur Multiplikation mit einer Konstanten eindeutig.
 - Beweis. Nehmen wir an, wir haben zwei Faktorisierungen $p_1 \cdot \dots \cdot p_k = r_1 \cdot \dots \cdot r_l$. Dann teilt p_1 das Produkt $r_1 \cdot \dots \cdot r_l$, und da p_1 irreduzibel ist, teilt p_1 also einen der Faktoren r_i . Dann können wir Induktion benutzen um die Eindeutigkeit zu zeigen.
- Folgerung: Wenn $f \in M[X]$ und $a \in M$, dann sind die folgenden äquivalent: a ist eine Wurzel von f gdw $(X - a) \mid f$.
 - In der Tat: Wir schreiben $f = q(X - a) + r$, mit $\deg r < 1$.

- Folgerung: Ein Polynom f in $M[X]$ vom Grad n hat höchstens n Wurzeln.
 - ▶ Die Polynome $(X - a)$ sind irreduzibel, wenn also a eine Wurzel von f ist, dann erscheint $(X - a)$ in der irreduziblen Faktorisierung von f . Die Behauptung folgt aus dem Vergleich der Grade.
- Für Ringe, die keine Körper sind, gilt dies nicht.
 - ▶ In $\mathbb{Z}/8$ hat das Polynom x^3 die Wurzeln 0, 2, 4, 6.

- Wir können nun Körper mit p^k Elementen konstruieren.
- Wir beginnen mit einem irreduziblen Polynom F vom Grad k . Um z.B. ein Körper mit 25 Elementen zu konstruieren, können wir mit $x^2 + x + 2$ beginnen.
- Als Elemente nehmen wir die Menge $\mathbb{Z}/5[X]/(x^2 + x + 2)$, die aus allen Polynomen vom Grad höchstens $k - 1$ besteht. In unserem Beispiel also $ux + v$, mit $u, v \in \mathbb{Z}/5$.
- Um Elemente zu multiplizieren, reduzieren wir modulo F . Zum Beispiel $(x + 3)(x + 2) \equiv x^2 + 1 \equiv -x - 3$.
 - ▶ Die Irreduzibilität von F wird benutzt, um zu zeigen, dass alle Elemente ungleich Null Inverse haben.
 - ▶ In der Tat: Wenn $g \in M[X]/(x^2 + x + 2)$, dann können wir mit Bezout-Identität $ag + bF = 1$ für einige Polynome a, b schreiben. Dann ist a die multiplikative Inverse von g modulo F .

Satz. [Moore]

- Sei $(M, +, \cdot)$ ein endlicher Körper (auch Galois-Körper genannt). Dann existieren $n, p \in \mathbb{N}$ mit p prim, so dass $|M| = p^n$.
 - Seien \mathcal{K} und \mathcal{N} endliche Körper mit gleich vielen Elementen. Dann sind \mathcal{K} und \mathcal{N} isomorph.
- Insbesondere: kein Körper mit 6 Elemente.

1. Wiederholung

2. Polynome

3. Abstrakter Sichtpunkt - Ideale und Faktorringe

- Sei $(M, +, \cdot)$ ein Ring. Wir sagen, dass $I \subset M$ ein **Ideal** ist, wenn
 - ▶ I eine Untergruppe von $(M, +)$ ist und
 - ▶ für alle $m \in M$ gilt $mI \subset I$

Beispiele

- M ist ein Ideal von M . Jedes andere Ideal heißt **echt**. Ein Ideal ist echt, wenn es 1_M nicht als Element enthält.
- $\{0\} \subset M$ ist ein Ideal.
- $n\mathbb{Z} \subset \mathbb{Z}$ ist ein Ideal für jede natürliche Zahl n .
- $fM[X] \subset M[X]$ ist ein Ideal für jedes Polynomi f .

- Ist $I \subset M$ ein Ideal, so nehmen wir eine Äquivalenzrelation auf M so definiert: $a \equiv b$ gdw $a - b \in I$.
- Die Menge der Äquivalenzklassen nennen wir M/I .

Lemma. $(M/I, +, \cdot)$ wird zu einem Ring, mit $[m] \cdot [n] := [mn]$, und $[m + n] := [m + n]$.

Beweis.

- Wir überprüfen z.B., dass die Multiplikation wohldefiniert ist.
- Nehmen wir also $[m] = [m']$ und $[n] = [n']$ an, so haben wir $m - m', n - n' \in I$. Da I ein Ideal ist, haben wir auch $n(m - m'), m(n - n') \in I$. Daraus folgt, dass $n'(m - m') + m(n - n') = mn - n'm' \in I$ und somit tatsächlich $[mn] = [m'n']$. \square
- Spezieller Fall: $\mathbb{Z}/5[X]/(x^2 + x + 2)$.



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

Łukasz Grabowski

Mathematisches Institut

grabowski@math.uni-leipzig.de