

비상시 행동요령

1. 화재발생시

- (1) 근처에 있는 소화기로 신속히 진화한다.
- (2) 119로 전화한다.
 - ▲ 혁신119 안전센터 : 063-220-4217
 - ▲ 전주완산소방서 현장대응단 : 063-220-4253
- (3) 화재경보기를 작동한다.
- (4) 상황을 보고하고 전파한다.
- (5) 화재 진압요령
 - ① 머리나 옷에 불이 붙었을 경우, 멈춰서기-눕기-구르기(Stop-Drop-Roll) 방법, 담요 및 물 등을 사용하여 옷이나 머리에 붙은 불을 끈다.
 - ② 화재 원인물질의 누출을 먼저 중지시키고 진화를 시도한다.
 - ③ 화재 진압은 바람을 등지고 시도한다.
 - ④ 가능한 한 먼 거리에서 화재를 진압한다.
 - ⑤ 화재 원인이 화학물질인 경우, 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 한다.
 - ⑥ 화재가 진화된 후에도 용기(화학물질, 가스 등)에 다량의 물을 뿌려준다.

2. 화상시

(1) 화염에 의한 국소 부위의 경미한 화상

- ① 얼음물에 화상부위를 20~30분 동안 담근다(통증과 부풀어 오름 완화).
- ② 그리스는 사용하지 않는다(그리스는 화상을 심하게 만든다).

(2) 중증 화상

- ① 응급구조대에 연락하여 즉시 전문가의 치료를 받는다.
- ② 환자를 실온에서 젖은 천이나 수건으로 싸준다.
- ③ 화상부위를 씻거나, 옷이나 오염물질 등을 제거하려고 하지 않는다.
- ④ 환자를 눕히고 안정된 상태를 유지한다.

(3) 눈 화상

- ① 다량의 물을 흘려보낸 후 깨끗한 젖은 수건 등으로 눈을 덮어준다.
- ② 즉시 응급구조대에 연락한다.

(4) 전기에 의한 화상

전기에 의한 화상은 피부표면으로 증상이 나타나지 않기 때문에 피해정도를 알아내기가 힘들뿐만 아니라,
심한 합병증을 유발할 수 있으므로 즉시 의료진의 치료를 받는다.

(5) 화학물질에 의한 화상

- ① 흐르는 차가운 물을 최소 15분 동안 충분히 흘려준다. 가능하다면 환자는 냉수로 샤워를 하게 한다.
- ② 오염부위를 주의하며 화학물질이 묻은 옷은 즉시 제거한다.
- ③ 10분 후 환자를 깨끗하고 젖은 천으로 감싼 후 즉시 응급구조대에 연락한다.

(6) 화재에 의한 연기 흡입

- ① 연기로 가득 찬 공간에 갇혀 있다면 자세를 낮추고 가장 가까운 출구로 기어서 나간다.
- ② 코와 입을 젖은 천으로 가린다.

3. 출혈시

(1) 외부 출혈

- ① 상처부위에 직접 압박을 가하며, 지혈대는 마지막 방법으로 사용한다.
- ② 가능하다면 소독된 붕대를 사용한다.
- ③ 위생용 휴지 및 깨끗한 손수건 또는 손을 직접 이용할 수도 있다.
- ④ 5~15분 동안 강하게 지속적으로 직접 압박을 가한다.
(대부분의 출혈은 수 분 내에 멎는다)
- ⑤ 출혈부위가 손, 팔, 발 및 다리 등일 때에는 이 부위를 심장보다 높게 위치시켜 중력을 이용하여 출혈을 줄일 수 있다.

(2) 내부 출혈

- ① 기침과 토사물 또는 대변, 소변에 혈액이 섞여 있거나 점액성의 검붉은 대변이 나올 경우에는 즉시 의료기관의 검사를 받는다.
- ② 환자를 반듯하게 눕힌 후 깊게 숨을 쉬게 한다.
- ③ 의사의 진찰이 있기 전까지는 어떤 약물이나 음식물도 섭취하지 못하게 한다.
- ④ 응급구조대에 연락한다.

4. 두부 상해시

- ① 상처가 심하지 않더라도 출혈은 심할 수 있지만, 두개골 골절에 의한 출혈을 멈추게 할 시에는 특별한 주의를 요한다.
- ② 두개골 조각들이 뇌를 압박하지 않도록 극도로 주의하면서 상처부위에 압박을 가한다.
- ③ 심한 두부상해시에는 목 부위의 상해도 의심하고, 목과 머리를 고정시킨다.
- ④ 응급구조대에 연락을 취하고, 전문가의 치료를 받는다.

5. 심장 마비시

(1) 환자가 아래와 같은 통증을 느끼면 즉시 응급조치를 취한다.

- ① 가슴에 심한 통증
- ② 가슴에서 팔, 목 및 턱으로 전파되는 통증
- ③ 발한, 오심, 구토 및 숨이 가빠짐
- ④ 어깨에서 등으로 퍼지는 통증

(2) 심장마비 환자의 생명을 위협하는 2가지 증세

- ① 호흡이 느려지거나 멈춤
- ② 심장박동이 느려지거나 멈춤

(3) 환자가 호흡이 멈춘 경우 즉시 인공호흡을 실시하고, 응급조치를 위한 도움을 구한다.

(4) 경동맥에서 맥박이 느껴지지 않는 경우 능숙한 전문가가 인공호흡 및 심폐소생술을 시행한다.

6. 감전시

- ① 전기가 소멸됐다는 확신이 있을 때까지 감전된 사람을 건드리지 않는다. 플러그, 회로 폐쇄기 및 퓨즈상자 등의 전원을 차단한다.
- ② 감전된 사람이 철사나 전선 등을 접촉하고 있다면 마른 막대기 등을 이용하여 이를 멀리 치운다.
- ③ 환자가 호흡하고 있는지 확인한다. 만약 호흡이 약하거나 멈춘 경우에는 즉시 인공호흡을 수행한다.
- ④ 응급구조대에 도움을 요청한다.
- ⑤ 감전된 환자를 담요, 외투 및 재킷 등으로 덮어서 따뜻하게 한다.
- ⑥ 의사에게 검진을 받을 때까지 감전된 사람이 음료수나 음식물 등을 먹지 못하게 한다.

7. 약물 섭취 시

- ① 의식이 있는 사람에 한하여 입안 세척 및 많은 양의 물 또는 우유를 마시게 하되, 억지로 구토를 시키지 않는다.
- ② 독극물을 섭취한 경우, 독극물 치료센터에 도움을 청하고, 부근에 이러한 기관이 없다면 응급구조대를 부른 후 의심되는 독극물의 종류와 용기를 가지고 간다.
- ③ 독극물 중독자가 의식불명인 경우, 환자의 호흡을 확인하여 호흡곤란의 경우에는 머리를 뒤로 기울여 인공호흡을 실시하되, 구강대 구강 인공호흡은 하지 않는다. 이때 환자를 자극하지 않도록 주의하고, 즉시 응급구조대에 도움을 요청한다.
- ④ 독극물 중독자가 구토를 하는 경우, 질식하지 않도록 구부려서 옆으로 눕게 한다.

8. 화학물질의 안구노출시

- ① 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 즉시 세척한다.
(환자가 콘택트렌즈를 사용하는 경우 이를 제거한다).
- ② 병원으로 후송할 준비가 완료될 때까지 생리식염수로 계속 씻어주고 멸균봉대로 감싸준다.

9. 질식시

- (1) 환자가 말을 하며, 기침 및 호흡을 할 수 있으면 그냥 지켜본다. 그러나 질식정도가 차도 없이 계속되면 응급의료지원을 요청한다.
- (2) 환자가 말을 하며, 기침 및 호흡을 할 수 있으면 즉시 다음의 조치를 취하고, 나머지 사람이 응급의료지원을 요청한다.

① 의식이 있는 환자의 경우

- 환자를 세우거나 앉힌다.
- 환자의 머리를 낮추고 환자의 옆 또는 뒤에 서서 한 손으로 환자의 가슴을 지탱한다.
- 견갑골(목덜미 아래쪽의 날개 뼈) 사이로 4회 타격을 가한다.
- 환자의 뒤에 서서 환자의 중앙을 팔로 감싼다.
- 양쪽 손을 서로 잡고 위쪽으로 밀어 넣듯 누른다.
- 몇 번 반복한 후 차도가 없으면, 질식 상태가 없어질 때까지 무의식 상태가 되지 않도록 등을 4회 타격하고 가슴 쪽을 4회 누른다.

② 무의식 상태의 환자의 경우

- 환자를 똑바로 눕힌 채 인공호흡을 실시한다.
- 환자가 공기를 들이쉬지 않으면, 환자를 움직여 환자의 가슴이 치료자의 무릎에 닿게 한 후 견갑골 사이로 4회 타격을 가한다.
- 환자가 여전히 숨 쉬지 않으면, 다시 환자를 똑바로 눕힌 채 환자의 복부에 양쪽 손을 겹쳐 놓은 후 한쪽으로 치우치지 않게 누른다.