

검사 기준 및 방법(제7조 관련)

1. 검사기준

가. 종자

구 분		규 격	기 준(%)
정립종자 비율		해당없음	95.0 이상
유형별 규격 종자 비율	대립종자	지름 5mm초과	95.0 이상
	중립종자	지름 4mm초과 ~ 5mm이하	95.0 이상
	소립종자	지름 4mm이하	95.0 이상
개갑종자 비율		해당없음	95.0 이상
<삭제>			
잡초종자 비율		해당없음	0.1 이하
감염종자 비율	특정병	해당없음	1.0 이하
	기타병	해당없음	3.0 이하

* 비율은 중량기준임 (단, 감염종자 비율은 개수에 대한 비율임)

나. 종묘

구분 항목		규격	기준(%)
정묘 비율		해당없음	95.0 이상
규격(크기) 종묘 비율	길 이	14cm이상	95.0 이상
	중 량	0.68g이상	95.0 이상
감염묘 비율	특정병	해당없음	무
	기타병	해당없음	1.0 이하
충해묘(특정해충) 비율		해당없음	무

* 비율은 중량기준임 (단, 규격 종묘, 감염묘, 충해묘 비율은 개수에 대한 비율임)

다. 종자·종묘검사 용어의 정의

(가) "비율(%)"이라 함은 전체 중량 또는 개체수에 대한 검사항목별 해당 중

량 또는 개체수의 비율을 말한다.

(나) "정립종자"라 함은 이중종자와 이물을 제외한 건실한 종자를 말한다.

(다) "대립종자"라 함은 체눈 크기(aperture)가 5mm인 체에 통과되지 않는 종자를 말한다.

(라) "중립종자"라 함은 체눈 크기 5mm인 체에는 통과되고 체눈 크기 4mm인 체에는 통과되지 않는 종자를 말한다.

(마) "소립종자"라 함은 체눈 크기(aperture)가 4mm인 체에 통과되는 종자를 말한다.

(바) "개갑종자"라 함은 종자를 처리하여 껍질이 연화되고 껍질안의 씨눈이 떨어진 상태의 것을 말하며 종자껍질이 떨어지지 아니한 종자를 미개갑종자라 한다.

(사) "종묘"라 함은 묘포이식을 목적으로 하는 인삼묘를 말하며, 묘포에서 1년간 생육하고 월동한 후 이듬해 싹이 나오기 전까지의 인삼묘를 1년생 묘삼이라 한다.

(아) "정묘"라 함은 뇌두손상묘삼, 뇌두포(包)가 찢진 묘삼, 적색표피묘삼, 표피반점묘삼, 표피손상묘삼, 건조된 묘삼, 달랭이묘삼 등이 아닌 정상묘삼을 말한다.

(자) 종자의 "특정병"이라 함은 점무늬병(*Alternaria panax*), 탄저병(*Colletotrichum gloeosporioides*)을 말한다.

(차) 종자의 "기타병"이라 함은 복합병으로 발생한 부패병 등을 말한다.

(카) 종묘의 "특정병"이라 함은 뿌리썩음병(*Cylindrocarpon destructans*), 균핵병(*Sclerotinia sclerotiorum*)을 말한다.

(타) 종묘의 "기타병"이라 함은 점무늬병(*Alternaria panax*), 잿빛곰팡이병(*Botrytis cinerea*), 모잘록병(*Fusarium solani*)을 말한다.

(파) 종묘의 "특정해충"이라 함은 감자썩이선충(*Ditylanchus destructor*), 뿌리혹선충(*Meloidogyne hapla*)을 말한다.

라. 종자·종묘검사의 불합격 기준

- 종자·종묘검사의 기준에 미달하거나 부적합한 것.

2. 검사방법

가. 종자

(1) 신청물량의 수량 검사

포장재 중량을 뺀 실수량(중량)을 측정한다.

(2) 품위

(가) 본 요령에서 품위는 정립종자 비율, 유형별 규격종자 비율, 개갑종자 비율, 잡초종자 비율을 말한다.

(나) 품위검사는 70g 이상의 시료를 대상으로 하여야 하며 확대경, 현미경, 체 등을 이용하여 검사한다.

(다) 분석결과는 소수점 첫째자리까지 기록한다.

(3) 감염종자 비율

(가) 검사시료는 정립 400립 이상 이어야 한다.

(나) 여지흡습법에 따라 육안 또는 현미경 검경을 통해 감염 여부를 검사한다.

(다) 페트리디쉬에 여지 2매를 깔고 4ml 멸균수를 부은 후 페트리디쉬 당 정립을 20립씩 치상한다. 그리고 20~25℃ 배양기에서 10일간(광조건 12시간 암조건 12시간) 배양후 검사한다. 다만, 현미경 검경에 의해 판단이 어려울 경우 이병부위에서 균을 분리·배양하여 검사한다.

나. 종묘

(1) 신청물량의 수량 검사

포장재 중량을 뺀 실수량(중량)을 측정한다.

(2) 품위

(가) 본 요령에서 품위는 정묘 비율, 규격(크기) 종묘 비율을 말한다.

(나) 품위검사는 400주 이상의 시료를 대상으로 한다.

(다) 분석결과는 소수점 첫째자리까지 기록한다.

(3) 감염묘 비율

(가) 검사시료는 정묘 200주 이상 이어야한다.

(나) 여지흡습법에 따라 육안 또는 현미경 검경을 통해 감염 여부를 검사한다.

(다) 멸균이 가능한 용기(약16×20cm)에 여지 2매를 깔고 20ml 멸균수를 부은 후 용기당 정묘 20본씩 치상한다. 그리고 15~20℃ 배양기에서 10일간(광조건 12시간 암조건 12시간) 배양후 검사한다. 다만, 현미경 검경에 의해 판단이 어려울 경우 이병부위에서 균을 분리·배양하여 검사한다.

(라) 분석결과는 소수점 첫째자리까지 기록한다.

(4) 충해묘 비율 : 선충 피해묘

(가) 검사시료는 정묘 200주 이상 이어야 한다.

(나) 육안 및 현미경 검경에 의하여 검사한다.

(다) 감자썩이선충의 경우 병든 조직에서 해당 선충 유무를 검사하고 뿌리
혹선충인 경우 뿌리혹형성 유무를 검사한다.

(라) 분석결과는 소수점 첫째자리까지 기록한다.