


해체검사 세부기준

1. 해체검사 처리절차도



2. 검사관 또는 도축검사원은 해체검사 전 위생복, 위생화, 안전모, 위생장갑 착용과 검사도구(칼, 칼갈이, 가위, 핀셋 등 축종에 맞는 도구)를 준비 하여야 하며, 해체검사 시 병변이 있는 장기나 조직 또는 내장을 절개한 경우에는 반드시 손과 칼 등 사용도구에 대한 세척·소독을 실시하여 식육에 오염되지 않도록 하여야 한다.

3. 포유류

가. 공통사항

해체검사시 장기의 육안병변 확인은 전체 장기 앞·뒤면의 관찰 및 축진을 통해 크기, 색깔, 모양, 경도 등을 확인하고 필요한 경우 장기 및 관련 림프절[별도1 참고]을 절개하여 이상유무를 검사한다. 지육의 경우도 내·외부, 척주 관찰 및 축진을 통해 병변여부 등 이상유무를 확인하고 이상이 있는 경우 관련 림프절

및 근육 등을 절개하여 검사한다.

나. 소

- (1) 머리 : 머리표면과 눈의 이상유무를 관찰하고 교근을 하악골에 평행하게 절개한다. 귀밑림프절, 인두뒤림프절, 아래턱림프절을 촉진, 절개하여 검사한다. 혀를 촉진한다.
- (2) 폐장 : 종격림프절의 촉진, 절개 및 기관지 림프절을 촉진, 절개하여 검사한다. 폐엽을 촉진하고 필요시 폐엽을 절개하여 검사한다.
- (3) 심장 : 종축으로 좌우심실 및 심방을 절개하여 검사한다.
- (4) 횡격막 및 종격막 : 횡격막의 근육부의 장막을 절개하고 종격림프절을 세절하여 검사한다.
- (5) 간장 : 간의 횡격막면과 내장면을 촉진하고 필요시 절개한다. 간장림프절의 절개 및 담관을 종축을 따라 절개하여 검사한다.
- (6) 위 및 장 : 위 림프절 및 장간막 림프절을 세절하여 검사한다.
- (7) 비장 : 표면을 촉진하며 필요시 절개하여 검사한다.
- (8) 췌장 : 표면을 촉진하며 필요시 절개하여 검사한다.
- (9) 신장 : 피막을 벗기고 신장 표면을 촉진하며 필요시 종축으로 이등분 절개하여 피질, 수질, 신우의 상태를 관찰한다. 신장림프절을 절개하여 검사한다.
- (10) 유방 : 유방을 촉진하며 필요시 절개하며 상유방림프절을 절개하여 검사한다.
- (11) 자궁 : 절개하여 검사한다.
- (12) 지육 : 지육의 외관을 관찰한다. 지육 바깥면의 장골밑림프절과 얇은목림프절을 절개한다. 지육 안쪽면의 얇은살림프절, 내측장골림프절, 허리림프절을 절개하여 검사한다. 척추를 관찰한다.

다. 송아지

송아지의 검사는 특히 배꼽 및 관절에 주의를 기울이고 소에 준하여 실시한다.

라. 말

- (1) 머리 : 하악골에 따라 후낭부를 검사할 수 있도록 절개하여 검사한다.
- (2) 간장 : 담관을 절개하여 검사한다.
- (3) 비장 : 장측면을 비분에 따라 절개하여 검사한다.
- (4) 폐, 심장, 위장 및 지육 등 : 소에 준하여 실시한다.

마. 돼지

- (1) 머리 : 머리 표면을 관찰하며 아래턱림프절을 절개하여 검사한다. 혀를 관찰한다.
- (2) 폐장 : 소에 준하여 검사한다.
- (3) 간장 : 소에 준하여 검사한다
- (4) 심장, 위장 등 : 소에 준하여 검사를 실시한다.
- (5) 지육 : 지육의 외관을 관찰한다. 지육 내면의 얇은살림프절, 내측장골림프절을 절개한다.

바. 면양 및 산양

- (1) 머리 : 소에 준하여 검사한다.
- (2) 폐장, 심장, 간장, 비장 및 지육 등 : 소에 준하여 검사를 실시한다. 단, 폐의 경우 좌우 1개소씩 실시한다.

사. 검사관은 필요하다고 인정될 때에는 두부, 지육 및 내장 등에서 시료를 채취하여 실험실 검사를 실시할 수 있다.

아. 검사에 의해 이상을 발견하고 정밀검사를 실시한 때에는 검사 결과가 확정될 때까지 그 조치를 보류하여야 한다.

자. 해체검사결과 다음질병에 감염되었다고 판단될 경우에는 지육 및 내장 등을 폐기하여야 한다.

- (1) 관절염(Arthritis) : 전신 증상이 없는 경우 해당 관절 부위 폐기
- (2) 소 전신부종(Generalized edema) : 현저한 전신성 부종인 경우 전체 폐기, 국소성인 경우 해당 부위 폐기
- (3) 방선균증(Actinomycosis), 액티노바실러스증(Actinobacillosis) 및 포도상진균증(Botryomycosis)
 - (가) 전신성 감염인 경우 : 전체 폐기
 - (나) 국소성 또는 전이가 제한된 경우 : 감염 부위 폐기

- (4) 리스테리아증(Listeriosis) : 지육이 정상일 경우 머리 폐기, 전신성인 경우 전체 폐기
- (5) 결핵(Tuberculosis) : 전체 폐기 및 정밀검사
- (6) 종양(Neoplasms)
 - (가) 종양이 있는 부위 및 장기 폐기
 - (나) 종양이 전이되어 전신성으로 존재할 때 전체 폐기
 - (다) 악성 림프종(Lymphosarcoma)은 전체 폐기
 - (라) 상피세포종(Squamous cell carcinoma)
 - 1) 전체 폐기
 - 가) 종양이 머리뼈까지 침투하여 화농 및 괴사가 있을 때
 - 나) 종양이 전이되어 눈에서 이하선 림프절, 내장, 근육 등에 전이 되었을 때
 - 다) 악액질과 관련 되었을 때
 - 2) 지육은 정상이고 눈에만 종양이 있는 경우 머리(혀 포함)만 폐기
- (7) 기생충성 질병(Parasites)
 - (가) 낭미충증(Cysticercosis)
 - 1) 소 무구낭미충(Cysticercus bovis)
 - 가) 감염이 광범위(낭미충 10개 이상 확인)하고 근육에 부종 및 변색이 있을 때 식육 전체 폐기
 - 나) 감염이 심하지(낭미충 10개 미만 확인) 않은 경우 해당 부위만 폐기. 단, 해당 식육은 -12°C 이하에서 20일 이상 처리 후 식용 가능
 - 2) 돼지 유구낭미충(Cysticercus cellulosae) :
 - 가) 감염이 광범위한 경우 식육 전체 폐기
 - 나) 감염이 심하지 않은 경우 해당 부위만 폐기. 단, 해당 식육은 -12°C 이하에서 5일 이상 처리한 경우 또는 가열 조리한 경우에는 식용 가능
 - (나) 소 사상충(Parafilaria bovicola) : 감염부위 폐기
 - (다) 세경낭미충(Cysticercus tenuicollis, ovis), 포충증

(Echinococcosis), 공미낭충(Coenurus cerebralis) :

가) 감염이 광범위한 경우 식육 전체 폐기

나) 감염이 심하지 않은 경우 해당 부위만 폐기. 단, 가열 조리한 경우에는 식용 가능

(라) 장 및 장막하 조직의 만성 섬유증, 육아종(기생충 감염) : 장 전체 폐기

(마) 분선충증(Strongylosis)(폐, 위 및 장) 및 편충(소화기) : 해당 장기 전체 폐기

(바) 분선충 유충(Strongylus larvae) : 감염부위 폐기

(사) 간질증(Fascioliosis; Fluke) : 간 전체 폐기

(아) 말파리 유충(Botfly larvae) : 소의 등근육, 척추관 및 식도, 말의 인두, 양의 머리 등 해당 감염부위 폐기

(자) 돼지 개선충(Sarcoptes mite) : 감염부위 폐기

(차) 양 개선충(Psoroptes mite) : 감염부위 폐기

(카) 선모충증(Trichinella spp.) : 전체 폐기

(8) 원충성 질병(Protozoa)

(가) 주육포자충증(Sarcosporidiosis) : 감염 부위 폐기

(나) 장 콕시디움증(Eimeriosis, isosporosis, cryptosporidiosis) : 장 전체 폐기

(9) 색소침착(Pigmentary deposits)[흑색증(Melanosis), 황색증(Xanthosis) 및 갈색증(Ochronosis) 등] : 전신성 색소침착인 경우 전체 폐기, 국소성인 경우 색소 침착 부위 폐기

(10) 찰과상(Abrasion), 타박상(Bruises), 농양(Abscesses) 등 : 전신성인 경우 전체 폐기, 국소성인 경우 감염 부위 폐기

(11) 식중독을 일으킬 수 있는 다음의 증상이 있는 경우 : 전체 폐기

(가) 폐장, 흉막, 심외막, 복막 또는 수막의 급성 염증

(나) 산후, 창상 또는 원인불명 등에 의한 패혈증 또는 농혈증

(다) 괴저성 또는 심한 출혈성 장염 또는 위염

(라) 급성 미만성 자궁근염 또는 유방염

(마) 제대정맥의 정맥염

- (바) 감염성 또는 화농성의 창상성 심외막염
- (사) 급성 염증, 농양 또는 화농성 궤양
- (아) 살모넬라증
- (12) 괴사간균증(Necrobacillosis) : 도체의 영양상태가 양호하고 국소성인 경우 감염부위 폐기, 도체의 상태가 쇠약하고 실질조직 및 림프절 종창이 있는 독혈증 상태의 경우 전체 폐기
- (13) 패혈증(Septicemia), 농혈증(Pyemia), 독혈증(Toxemia) 및 바이러스혈증(Viremia) : 전체 폐기
- (14) 근육 염증, 변성, 침윤(Muscular inflammation, degeneration, infiltration) : 병변을 제거하기 어려우면 전체 폐기, 병변제거가 가능하면 감염부위 폐기
- (15) 콕시듐관련 육아종(Coccidioidal granuloma) : 전신성인 경우 전체폐기, 국소성인 경우 감염부위 폐기
- (16) 옴(Mange or Scab) : 악액질을 수반하거나 광범위한 염증이 있는 경우 전체폐기, 경미한 경우 감염부위 폐기
- (17) 돼지 두드러기(Urticaria), 모낭충(Demodex folliculorum), 홍반(Erythema) : 감염부위 폐기
- (18) 소생식기캠필로박터증(Bovine genital campylobacteriosis) : 감염부위 폐기
- (19) 송아지디프테리아[Calf diphtheria(Fusobacterium necrophorum)] : 전체 폐기
- (20) 면양 부제병(Dichelobacter nodosus) : 감염부위 폐기
- (21) 랩토스피라증[Leptospirosis(Leptospira interrogans)] : 전체 폐기
- (22) 황달(Icterus) : 어느 정도 황달 상태가 보이면 전체 폐기
- (23) 쇠약(Emaciation) : 근육조직의 장액성 위축, 지방조직의 장액성 또는 점액성 변성이 있는 경우 전체 폐기
- (24) 빈혈(Anemia), 수혈증(Hydremia), 부종(General edema) : 전체 폐기
- (25) 배아(Embryos), 태아(Fetuses), 유·사산(Abortion & stillbirth) 및 신생 동물(New-born animals) : 전체 폐기

- (26) 과탕지 돼지(Scalding hog) : 전체 폐기
- (27) 비정상적 냄새, 맛 또는 색깔(Abnormal smell, taste, color) : 전체 폐기
- (28) 생물학적 잔류물질(Biological residues) 허용한계치 초과 : 지육 및 장기 전체 폐기
- (29) 성취가 심한 지육(Sexual odor) : 전체 폐기
- (30) 급성 제대감염(Acute umbilical infection) : 전체 폐기
- (31) 오염(Condemnation) : 분변 등 오염부위 폐기
- (32) 신경계 병변(Nervous system)
 - (가) 급성 뇌염(Acute encephalitis), 뇌척수막염(Cerebrospinal meningitis) 및 척수염 : 전체 폐기
 - (나) 만성 뇌염 및 척수염(Chronic cerebral or spinal cord inflammation) : 두부 및 척주 폐기
 - (다) 만성 뇌 농양(Chronic brain abscess) : 두부 폐기
- (33) 심장혈관계 병변(Pericardium, heart and Cardiovascular system)
 - (가) 급성 삼출성 심외막염(Acute exudative pericarditis) : 전체 폐기
 - (나) 만성 삼출성 심외막염(Chronic exudative pericarditis) : 심장 폐기
 - (다) 창상성 심외막염(Traumatic pericarditis)[삼출물 축적, 순환 장애, 쇠약 또는 복합감염] : 전체 폐기
 - (라) 만성 섬유소성 심외막염(Chronic fibrous pericarditis) : 심장 폐기
 - (마) 혈전성 심내막염(Endocarditis with thrombosis)[Ulcerative and verrucous] : 전체 폐기
 - (바) 감염성, 혈전성 동맥 및 정맥 내막염(Infectious endarteritis and endophlebitis with thrombosis) : 전체 폐기
 - (사) 비감염성 심장질병(Non-infectious heart disease)[선천성 기형 등] : 심장 폐기

(아) 기생충에 의한 혈전(Thrombosis) : 심장 폐기

(자) 점상출혈(Petechia) : 급성 열성 질병이 의심되는 경우 전체 폐기

(차) 심장지방의 장액성 위축(Collagenic atrophy) : 심장 폐기

(카) 심근농양(Heart abscess) : 내장 · 머리 및 지육 폐기

(34) 호흡기 병변(Respiratory tract and lungs)

(가) 부비강염(Sinusitis), 비염(Rhinitis) : 머리 폐기

(나) 위축성비염(Atrophic rhinitis) : 머리 폐기

(다) 만성 기관지폐렴(Chronic bronchopneumonia) : 폐장 폐기

(라) 돼지 흉막폐렴(pleuropneumonia) : 심급성 또는 25% 이상의 급성 병변인 경우 전체 폐기, 25% 미만의 급성 병변인 경우 폐장 폐기

(마) 구획된 폐 괴사 및 농양(Demarcated necrosis and abscesses) : 폐장 폐기

(바) 농혈증에 의한 괴사 및 농양(Necrosis and abscesses of pyemic organ) : 전체 폐기

(사) 기관염(Tracheitis) 및 기관지염(Bronchitis) : 폐장 폐기

(아) 무기폐(Atelectasis), 폐기종(Emphysema), 색소침착(Pigmentation), 출혈(Bleeding), 폐수종(Pulmonary edema), 기관지확장증(Bronchiectasia) 및 혈액 등 흡인폐(Aspiration) : 폐장 폐기

(35) 흉막 병변(Pleura)

(가) 섬유소성, 장액섬유소성, 화농성 또는 부패성 흉막염(Fibrous, serofibrinous, suppurative or putrid pleuritis) : 전체 폐기 (25% 이하 병변인 경우 감염부위 폐기)

(나) 만성 섬유소성 흉막염(Chronic fibrous pleuritis) : 감염부위 및 폐장 폐기

(36) 위장 병변(Stomach and Intestine)

(가) 위염 또는 장염(Gastritis or enteritis) : 위 또는 장 폐기, 전신성인 경우 전체 폐기

(나) 급성 섬유소성, 괴사성, 디프테리아성 또는 출혈성 장염
(Acute fibrinous necrotising diphtheric or hemorrhagic enteritis) : 전체 폐기

(다) 만성 섬유소성, 괴사성, 디프테리아성 또는 출혈성 장염
(Chronic fibrinous necrotizing diphtheric or hemorrhagic enteritis) : 장 폐기

(라) 전위(Displacement)

1) 회장 염전, 감돈 또는 중첩(Torsion, invagination or incarceration of ileum) : 장 폐기

2) 탈장[Constipation of all animals] : 장 폐기

(마) 고창증(Gas colic and bloat) : 장 폐기

(바) 장간막 기종(돼지)[Mesenteric emphysema] : 장 폐기

(사) 장출혈(돼지)[Universal intestine bleeding] : 장 폐기

(아) 직장탈(Rectal prolapse) : 장 폐기

(자) 제1위염(반추류)[Rumenitis] : 위장 전체 폐기

(차) 제2위염(반추류)[Reticulitis] : 제2위-황격막-심장막 누관
형성시 전체 폐기

(카) 직장협착(Rectostenosis) : 장 폐기, 돼지의 살모넬라 감염이
의심되는 경우 식육 전체 폐기

(타) 농양(Abscess) : 장 폐기

(파) 장의 지방조직 염증 및 괴사[Adipose tissue inflammation
and necrosis]: 장과 유착된 지방조직의 염증이 분리 가능할 경우
감염부위 폐기, 광범위한 유착에 의한 장 분리가 어려울 경우
장 전체 폐기

(37) 복막 병변(Peritoneum)

(가) 급성 미만성 복막염(Acute diffuse peritonitis) : 전체 폐기

(나) 급성 국소성 복막염(Acute local peritonitis) : 감염부위 폐기

(다) 만성 국소성 복막염(농양포함)[Chronic local peritonitis] :
감염부위 폐기

(38) 간장 병변(Liver)

(가) 모세혈관 확장증(부맥반)[Telangiectasia], 낭포(Cysts) 및 담석(Gallstone) : 간장 폐기

(나) 국소성 또는 미만성 지방 침윤(지방간)[Local or diffuse fat infiltration; fatty liver] : 간장 폐기, 전신성인 경우 전체 폐기

(다) 괴사성 간염(Necrotic hepatitis)

1) 급성 및 아급성 미만성 간염(다발성, 지역성 확대)[Diffuse acute and subacute cases with multifocal or zonal extention] : 전체 폐기

2) 급성 및 아급성 국소성 괴사(Single acute or subacute necrosis) : 간장 폐기

3) 만성 간염(기생충 감염)[Chronic hepatitis] : 간장 폐기

(라) 간경화(Liver cirrhosis) : 간장 폐기, 전신성인 경우 전체 폐기

(마) 간농양(Liver abscesses)

1) 급성 및 아급성 간농양(Acute and subacute liver abscesses)(다발성 또는 농혈증) : 전체 폐기

2) 만성 간농양(Chronic liver abscesses) : 간장 폐기

3) 속립성 간괴사(송아지)[miliary liver necrosis] : 전체 폐기

(바) 간출혈(Liver hemorrhage) : 부분 폐기

(사) 간질증(Fasciola hepatica), 밀크반점(Milkspot; ascariasis) : 간장 폐기

(아) 파라티프스결절(Paratyphoid nodule) : 간장 폐기, 전신성인 경우 전체 폐기

(39) 비장 병변(Spleen)

(가) 비장 염전, 무균성 괴사(비장경색) 및 파열(Torsion of the spleen, aseptic necrosis and rupture) : 비장 폐기

(나) 비장염 또는 창상성 비장염(Splenitis or traumatic splenitis) : 전체 폐기, 전신성이 아닌 경우 비장 폐기

(다) 비장종대(Enlarged spleen) : 비장 폐기, 전신성인 경우 전체

폐기

(40) 췌장 병변(Pancreas)

(가) 췌장염 및 췌장의 순환장애(부종)[Pancreatitis and disturbance of the circulation(edema)] : 췌장 폐기

(나) 결석 침착(Accumulation of concrement) : 췌장 폐기

(41) 비뇨기 병변(Urinary tract)

(가) 신장결석(Kidney concrement), 신낭포(Cystic formation), 백반신(White spotted kidney), 수신증(Hydronephrosis) 및 색소침착(Pigmentation) : 신장 폐기

(나) 급성 감염성 사구체신염 및 간질성 신염(Acute infectious glomerulonephritis and interstitial nephritis) : 전체 폐기

(다) 만성 사구체 및 간질성 신염(Chronic glomerulonephritis and interstitial nephritis) : 신장 폐기

(라) 백혈구림프구성 신우신염(Leucolymphocytic pyelonephritis) : 신장 폐기

(마) 아밀로이드증(Amyloidosis) 및 신증(Nephrosis) : 신장 폐기

(바) 신장 괴사(Renal necrosis) : 신장폐기

(사) 색전성 신염(경색 포함)[Embolic nephritis] : 전체 폐기

(아) 감염성 상행성 신우신염(Infectious ascending pyelonephritis) : 신장폐기

(자) 점상출혈(Petechia) : 신장 폐기, 전신성 감염시 전체폐기

(차) 농양(Abscess) : 신장 폐기, 신장 림프절 농양시 다른장기 및 지육 정밀검사 실시, 전신성 감염시 전체폐기

(카) 방광염(Urocystitis) : 신장 및 방광 폐기

(타) 방광 또는 요관 파열, 또는 결합조직염(Rupture of the bladder or urinary duct or urinary phlegmone) : 신장 폐기

(42) 생식기 병변(Reproductive organs)

(가) 자궁염(Metritis)

1) 급성 자궁염(섬유소성 디프테리아성 괴사성 및 세균성 자궁내막염 포함)[Acute metritis(fibrinous, diphtheriod,

necrotic and septic endometritis)] : 전체 폐기

2) 만성 자궁내막염(자궁축농증, 부패 및 미이라 태아 포함)
[Chronic endometritis(pyometra, macerated/putrified
fetuses or mummified fetuses)] : 전체 폐기

(나) 후산정체(Retained placenta) : 자궁 및 태아 폐기

(다) 자궁염전, 자궁탈 또는 파열(Torsion or prolapse or
rupture of uterus) : 자궁 폐기

(라) 자궁수종(Hydrometra) : 자궁 폐기

(마) 고환염 또는 부고환염(Orchitis or epididymitis) : 고환 폐기

(43) 유방(Udder)

(가) 패혈성 및 급성 괴사성 유방염(Septic and acute necrotic
mastitis) : 전체 폐기

(나) 급성, 카탈성 또는 화농성 유방염(Acute, catarrhal or
purulent mastitis) : 감염부위 폐기

(다) 만성, 카탈성, 화농성 또는 괴사성 유방염(Chronic, catarrhal,
purulent or necrotic mastitis) : 감염부위 폐기

(44) 뼈, 관절 및 힘줄 병변(bones, joints and tendons)

(가) 뼈 골절(Bone fracture)

1) 6시간 이상 개방된 골절(Open fractures older than 6 hours)
: 전체 폐기

2) 감염된 골절(Infected fractures) : 전체 폐기. 단, 국소성인
경우 발골 후 식육 가능

3) 비감염성의 급성, 치유 중 또는 치유된 골절(Non-infected,
acute or healing or healed fractures) : 감염부위 폐기

(나) 골수염(Osteomyelitis)

1) 급성 전색성 골수염(화농상태)[Acute embolic osteomyelitis
(pyemic condition)] : 전체 폐기

2) 만성 전색성 골수염(화농상태)[Chronic embolic osteomyelitis
(pyemic condition)] : 감염부위 폐기

3) 국소성 골수염(Local osteomyelitis) : 감염부위 폐기

(다) 중이염(Otitis media) : 두부 폐기

(라) 뼈 및 골막내 색소침착(Pigmentation deposits in bones and periosteum) : 해당부위 폐기

(마) 건염(tendonitis)을 포함한 관절염증

1) 급성 감염성 관절염(Acute infectious arthritis) : 전체 폐기

2) 만성 감염성 또는 비감염성 관절염(Chronic infectious or non-infectious arthritis) : 감염부위 폐기

3) 관절증(Arthrosis) : 감염부위 폐기

(45) 근육 병변(Muscle)

(가) 무균성 근육괴사(Aseptic muscle necrosis) : 해당부위 폐기

(나) 근육변성(Muscle degeneration : PSE, DFD)

1) 심한 변성(High degree of degeneration) : 전체 폐기

2) 국소성 변성(Limited spread of high or low degree of degeneration) : 해당부위 폐기

(다) 근육 조직 및 색깔 변화(Changes of texture and color of muscle) : 전체 폐기

(46) 피부 등 병변(Skin etc)

(가) 창상·봉와직염·흉터(Wounds, phlegmone and scars) : 감염부위 폐기

(나) 타박상 및 열상(Contusion and laceration) : 해당부위 폐기

(다) 화상(Burns)

1) 급성 표면 화상(Acute superficial burns) : 해당부위 폐기

2) 급성 심부 화상(2-3도 화상)[Acute profound burns] : 해당부위 폐기, 피부의 5% 이상 화상을 입은 경우 전체 폐기

(라) 만성 피부염(습진 포함)[Chronic dermatitis including eczema] : 해당부위 폐기

(마) 피부홍반(동상, 태양에 의한 홍반, 화학적 부식)[Skin erythema(frost bite, sun erythema or chemical corrosions)], 구진(papule) : 해당부위 폐기

(바) 백선증(Ringworms) : 해당부위 폐기

4. 가금

가. 개체별로 도체 전체의 크기(여위었는지 여부), 다리 관절의 종대, 체표의 색조, 내장(간장, 비장, 심장 및 장관 등)의 색, 형태, 크기 및 단단함과 체벽 내측면의 상태, 병변 및 이물오염 등을 확인하여야 한다.

나. 해체검사 절차

- (1) 검사자 반대측의 도체 체표면을 신속하게 거울상에서 확인한다.
- (2) 도체와 내장은 각각 검사자가 위치하는 측의 손으로 만진다
- (3) 도체의 체벽 내측면은 엄지를 도체 개구부에 넣어 개구부를 넓게 벌려 확인한다.
- (4) 검사자측의 도체의 체표면을 확인한다.
- (5) 확인결과 이상도체(분변오염 포함)등은 검사대(hang back rack)로 이동하여 검사한다.

다. 해체검사결과 다음과 같이 판단될 경우에는 지육 및 내장 등을 폐기하여야 한다.

- (1) 결핵, 패혈증 및 독혈증(Tuberculosis, septicemia and toxemia) : 전체 폐기
- (2) 복수/부종(Ascites/edema) : 전체 폐기
- (3) 타박상/골절(Bruising and fractures) : 병변이 심한 경우 전체 폐기, 국소성인 경우 해당부위 폐기
- (4) 봉와직염(Cellulitis) : 국소성인 경우 감염부위 폐기, 전신성인 경우 전체 폐기
- (5) 오염(Contamination) : 국소성인 경우 해당부위 폐기, 전신성인 경우 전체 폐기
- (6) 두부 미절단/방혈 불량(Uncut/Badly bled) : 전체 폐기
- (7) 피부염(Dermatitis) : 국소성인 경우 감염부위 폐기, 전신성인 경우 전체 폐기
- (8) 쇠약/왜소증(Emaciation/runts) : 전체 폐기
- (9) 간염(담관간염, 괴사소)[Hepatitis(cholangiohepatitis/necrotic

foci) : 간 폐기, 다른장기 및 지육오염시 전체 폐기

- (10) 관절병변/관절염(Hock joint lesion/arthritis) : 국소성인 경우 해당부위 폐기, 전신성인 경우 전체 폐기
- (11) 기계적 손상(Machine damage) : 국소성인 경우 해당부위 폐기, 전신성인 경우 전체 폐기
- (12) 과탕지(Overscald) : 전체 폐기
- (13) 심외막염(Pericarditis) : 진행형의 심한 심외막염 또는 2차 증상(질병)이 확인되는 경우 전체폐기, 치유되거나 아급성의 심외막염의 경우 심장폐기
- (14) 복막염/간포막염(Peritonitis/perihepatitis) : 전체 폐기
- (15) 호흡기질병/기낭염(Respiratory disease/airsacculitis) : 급성인 경우 전체 폐기, 만성인 경우 감염부위 폐기
- (16) 난관염(Salpingitis) : 2차 질병(증상)과 관련된 경우 전체폐기, 국소성인 경우 난관 폐기
- (17) 백혈병/종양/결절(Leukosis/Tumors/nodules) : 국소성인 경우를 제외하고는 전체 폐기
- (18) 탈모불량(Poor plucking) : 깃털 제거, 깃털 제거가 어려운 경우 지육 폐기
- (19) 황달/백색근육(Jaundice/white muscle) : 전체 폐기
- (20) 선천성 기형(Congenital malformation) : 해당 부위 폐기