

[별표 1] 적조예비특보·특보 발표기준

구 분		규 모	적조생물 밀도(개체/ml)	비 고
<u>예비특보</u>		적조생물의 출현밀도가 증가하여, 적조발생이 예상될 때	○편모조류: 종의 세포크기와 독성도에 따라 결정 - <i>Chattonella</i> spp.: 1,000이상 - <i>Cochlodinium polykrikoides</i>: 10이상 - <i>Gyrodinium</i> sp.: 200이상 - <i>Karenia mikimotoi</i>: 500이상 - 그 밖에 편모조류: 10,000이상 ○규조류: 20,000이상 ○혼합형: 편모조류가 50%이상 때 20,000이상	○수과원장은 적조생물, 해황 및 해역의 특성에 따라 피해가 우려될 경우 적조 규모 및 밀도에 관계없이 적조특보를 발표할 수 있음
<u>특보</u>	주의보	반경 2~5km (12~79km ²) 수역에 걸쳐 발생하고 어업피해가 우려될 때	○편모조류: 종의 세포크기와 독성도에 따라 결정 - <i>Chattonella</i> spp.: 2,500이상 - <i>Cochlodinium polykrikoides</i>: 100이상 - <i>Gyrodinium</i> sp.: 500이상 - <i>Karenia mikimotoi</i>: 1,000이상 - 그 밖에 편모조류: 30,000이상 ○규조류: 50,000이상 ○혼합형: 편모조류가 50%이상 때 40,000이상	○수과원장은 적조의 진행정보(유해종의 출현, 확산)의 전파 및 어업피해방지에 관한 조치가 필요할 때 적조특보를 발표할 수 있음
	경보	반경 5km(79km ²)이상 수역에 걸쳐 발생하여 상당한 어업피해가 예상될 때	○편모조류: 종의 세포크기와 독성도에 따라 결정 - <i>Chattonella</i> spp.: 5,000이상 - <i>Cochlodinium polykrikoides</i>: 1,000이상 - <i>Gyrodinium</i> sp.: 2,000이상 - <i>Karenia mikimotoi</i>: 3,000이상 - 그 밖에 편모조류: 50,000이상 ○규조류: 100,000이상 ○혼합형: 편모조류가 50%이상 때 80,000이상	○적조생물 밀도는 양식생물 피해 최소화를 위해 양식장 환경관리, 먹이공급 중단 등 적조 대응을 위한 특보발표 기준이며, 양식생물 폐사를 판단하는 기준은 아님