

## 연구실 사고발생시 대처요령

### 1. 사고 시 행동요령

- 가. 사고가 발생하였을 때에는 정확하고 빠르게 대응해야 한다.
- 나. 연구실 내 샤워장치, 세안장치, 소화전, 소화기, 화재경고기 등 안전장비 및 비상구의 위치를 자세히 알고 있어야 한다.
- 다. 사고가 발생하면 다음과 같이 행동한다.
  - 1) 긴급조치 후 신속히 큰소리로 다른 근무자에게 알리고 즉시 연구실책임자에게 보고해야 한다.
  - 2) 화재나 사고를 가능한 한 초기에 신속히 진압하고, 필요시 응급조치를 한다.
  - 3) 초기진압이 어려운 경우에는 진압을 포기하고 건물 외부로 대피한다.
  - 4) 소방서, 경찰서, 병원 등에 긴급전화를 하여 도움을 청한다.
  - 5) 필요시 구급요원 등에 대해 사고 진행 상황을 상세히 알린다.

### 2. 사고 시 응급조치

- 가. 호흡정지
  - 1) 환자가 의식을 잃고 호흡이 정지된 경우 즉시 인공호흡을 해야 한다.
  - 2) 환자를 소생시키면서 주변의 도움을 청해야 한다.
- 나. 심한출혈
  - 1) 환자는 편안하게 눕히고 상처부위를 패드나 천으로 눌러서 지혈시킨다.
  - 2) 충격을 피하기 위해서 상처부위를 감싸고 즉시 응급요원을 부른다.
  - 3) 피가 흐르는 부위는 신체의 다른 부분보다 높게 하여 계속 누르고 있어야 한다.

#### 다. 화상

- 1) 경미한 화상은 얼음이나 생수로 화상부위를 식힌다.
- 2) 옷에 불이 붙었을 경우에는 다음 각목의 행동요령에 따른다.
  - 가) 바닥에 누워 구르거나 근처에 소방담요가 있다면 화염을 덮어 싸도록 한다.
  - 나) 불을 끈 후에는 약품에 오염된 옷을 벗고 샤워 장치에 샤워를 한다.
  - 다) 상처부위를 씻고 열을 없애기 위해서 얼마동안 수돗물에 상처부위를 담근다.
  - 라) 상처부위를 깨끗이 한 후 얼음주머니로 적시고 충격을 받지 않도록 감싼다.
  - 마) 사람을 향해 소화기를 사용하지 않도록 한다.

#### 라. 유해물질에 의한 화상

- 1) 유해물질이 묻거나 화상을 입었을 경우 즉각 물로 씻는다.
- 2) 유해물질에 오염된 모든 의류는 제거하고 접촉부위는 물로 씻어낸다.
- 3) 유해물질이 눈에 들어갔을 경우 15분 이상 세안장치를 이용해 깨끗이 씻고 즉각 도움을 청한다.
- 4) 몸에 유해물질이 묻었을 경우 15분 이상 샤워 장치를 이용해 깨끗이 씻어내고, 전문의의 진료를 받는다.
- 5) 유해물질이 몸에 얹질러진 경우 오염된 옷을 빨리 벗는다.

#### 마. 외상

- 1) 외상 쇼크의 경우 재해의 성격이 분명하지 않다면 환자를 따뜻하게 하고 편안하게 눕힌 뒤 병원으로 이송시킨다.

#### 바. 구급약품

- 1) 연구실에는 구급약품이 보관된 구급상자를 이용이 편리한 장소에 갖추어 놓고, 정기적으로 점검한다.