

[별표 2]

한국 수출을 위한 멕시코과실파리 예찰 및 방제 방법(제6조)

1. 예찰 방법(국가 외래 과실파리 트랩조사 가이드라인)

가. 예찰은 1주일에 1회 실시한다.

나. 예찰 트랩의 종류와 설치 수량은 다음과 같다.

트랩종류	유인제	설치수량(기준: 1 평방마일)			
		고위험지역 (공항만 도시 및 도시외곽지역)	중위험지역 (도시 기타지역)	저위험지역 (농촌지역)	기타지역
Multi-lure 트랩	2 component lure (putrescine + ammonium acetate)	5~10	2~5	1~2	0.2
McPhail 트랩	torula yeast				

다. 2 component lure는 6~8주마다, torula yeast는 1주 단위로 교체한다.

2. 방제 방법(텍사스주 멕시코과실파리 실행계획)

가. 멕시코과실파리의 발생 시 규제지역의 설정 및 트랩의 설치는 다음과 같이 이행한다. 다만, 불임충 방사 지역에서는 트랩 비율을 3×3, grid 당 20개를 설치한다.

5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	지역 전체 면적 (Mi²) 평방마일당 트랩수 전체 트랩수 코어지역 첫 번째 버퍼지역 두 번째 버퍼지역 세 번째 버퍼지역 네 번째 버퍼지역 합계
5	10	10	10	10	10	10	10	5		
5	10	20	20	20	20	20	10	5		
5	10	20	40	40	40	20	10	5		
5	10	20	40	80	40	20	10	5		
5	10	20	40	40	40	20	10	5		
5	10	20	20	20	20	20	10	5		
5	10	10	10	10	10	10	10	5		
5	5	5	5	5	5	5	5	5		

나. 발생지역 반경 200m 이내의 지역은 2세대 간 과실 절개검사를 실시한다.

다. 발생 1주일 이내 발생지점 반경 200~500m 이내에 bait spray를 실시한다.

라. 1주일에 1회 1에이커당 500마리의 불임충(bisexual strains) 또는 200

마리의 불임충(male strains)을 방사한다.

3. 멕시코과실파리의 예찰과 방제와 관련하여 상기 언급된 이외의 사항들은 "국가 외래 과실파리 검출 포획 지침(National Exotic Fruit Fly Detection Trapping Guideline, USDA, 2015)"과 "텍사스 멕시코과실파리 실행계획[Texas Action Plan for Mexican Fruit Fly *Anastrepha ludens* (Loew), Jang *et al*, 2015]"에 따른다.