

Bactrocera dorsalis 저발생 유지를 위한 트랩 조사 및 방제 방법
(제4조제4항 관련)

1. 목적

- 특별관리해충인 *Bactrocera dorsalis* 저발생 유지를 위한 예찰 및 방제

2. 트랩조사 관리·감독 주체

- 필리핀 식물검역당국(BPI) 식물검역관

3. 트랩 설치 및 조사 방법

- ① 트랩은 20ha당 1개를 설치하되 설치 단위를 과수원으로 함(즉, 20ha 미만 과수원은 1개, 20ha 이상 과수원은 20ha당 1개 설치)
- ② CPTD(Catch Per Trap per Day)는 과수원 단위로 산정하며, 과수원 내 트랩에 잡히는 개체 수의 평균으로 산정
예) 50ha 과수원은 트랩 3개를 설치하고, 트랩 3개에 잡힌 개체가 1일 총 6마리 이상일 때 CPTD가 2 이상인 것으로 판정(7일 기준 42마리 이상)
- ③ 유인제 및 교체 시기: 메틸유제놀(Methyl-Eugenol), 4주마다 교체

4. 트랩 조사 기간 및 주기

- 1회/1주

5. 개체 수 ‘2마리/트랩/일’ (CPTD $\geq$ 2) 이상일 경우 조치사항

- ① BPI는 발생상황 확인 즉시 한국으로 발생상황을 통보하고, 해당 과수원은 CPTD $<$ 2가 될 때까지 수출 중단 (최소 4주)
- ② 발생상황 확인일로부터 4주간 해당 과수원에 과실판리 트랩 2배 설치, 유살제 살포, 매주 조사 결과 통보
 - 유살제 : Spinosad계 유살제(GF-120 등)
 - 살포방법 : 과실판리 유인지점 집중 살포(그림 참조)
 - 기타 : 살포 후 3시간 이내 비가 올 시 재 살포
- ③ 4주간 매주 조사한 결과* CPTD $\geq$ 2이 2번 이상 되는 경우 해당 과수원

은 당해연도 수출에서 제외

* 발생상황 확인일로부터 7일 후부터 매주 조사

- ④ 4주 이후 수출에서 제외되지 않은 농가에서 다시 $CPTD \geq 2$ 이 되는 경우 5.①번부터 재조치

[그림. 과수원 내 유살제 살포방법]

