

예방접종 후 이상반응 범위 등(제2조 관련)

예방접종 종류	이상반응의 범위	예방접종 후 이상반응이 나타날 때까지의 시간
장티푸스 (주사용)	1. 아나필락시스	24시간 이내
	2. 국소 이상반응	7일 이내
	3. 그 밖에 접종과 연관성이 있는 것으로 의심되는 이상반응	기한 없음
	4. 제1호부터 제3호로 인한 후유증	기한 없음
신증후군출혈열	1. 아나필락시스	24시간 이내
	2. 국소 이상반응	7일 이내
	3. 그 밖에 접종과 연관성이 있는 것으로 의심되는 이상반응	기한 없음
	4. 제1호부터 제3호로 인한 후유증	기한 없음
코로나바이러스감염증-19	1. 아나필락시스	24시간 이내
	2. 지연된 알러지 반응	7일 이내
	3. 국소 이상반응	7일 이내
	4. 접종 후 발생할 수 있는 전신 이상반응* * 발열, 오한, 두통, 근육통, 관절통, 구토, 설사 등	7일 이내
	5. 림프계 이상	10일 이내
	6. 주사 부위 연조직염	28일 이내
	7. 심근염	42일 이내
	8. 심낭염	42일 이내
	9. 다형홍반	42일 이내
	10. 횡단성 척수염	42일 이내
	11. 벨마비	28일 이내
	12. 이상자궁출혈	의학적 인정 가능한 상당기간
	13. 필러 시술자 얼굴 부종	의학적 인정 가능한 상당기간
	14. 그 밖에 접종과 연관성이 있는 것으로 의심되는 이상반응	기한 없음
	15. 제1호부터 제14호로 인한 후유증	기한 없음

* 기한없음: 이상반응 종류에 따라 시간이 상이