

[별표 21] <신설 2014.12.8., 개정 2016.12.01., 개정 2017.4.1, 개정 2021.12.29., 개정 2022.7.22., 개정 2023.10.04.>

사료 중 특정성분의 함량 제한기준(제12조제1항 관련)

성분명	사료명	허용기준
가. 구리	양돈용 배합사료	포유자돈 및 이유돈용 : 100ppm 이하 육성돈용 : 60ppm 이하 기타 양돈용 배합사료 : 25ppm 이하
	남은음식물사료	29ppm 이하(건물기준)
나. 아연	양돈용 배합사료	포유자돈 및 이유돈용 : 120ppm 이하 (다만, ZnO를 첨가하는 경우에는 2,000ppm 이하) 육성돈용 : 90ppm 이하 비육돈용 : 75ppm 이하 번식돈용 : 150ppm이하
	남은음식물사료	87ppm 이하(건물기준)
다. 인	양돈용 배합사료	포유자돈용 : 0.8% 이하 육성돈용 및 비육돈용 : 0.6% 이하 기타 양돈용 배합사료 : 0.7% 이하
	가금용(닭, 오리) 배합사료	산란초기, 산란중기, 산란말기 : 0.6% 이하 기타 가금용(닭, 오리) 배합사료 : 0.7% 이하
	수산동물용 배합사료 (갑각류를 제외)	어린물고기, 종묘용, 육성용 : 1.8% 이하 큰물고기용 : 1.5% 이하 뱀장어 및 해수어용 : 2.7% 이하
라. 휘발성 염기태질소	낙농가공부산물류, 박류, 동물성단백질류사료(새우분, 어분, 육분), 어골분	0.3% 미만
	곤충류, 기타 동물성단백질류사료, 남은음식물사료, 플랑크톤류, 혼합성 단미사료	0.5% 미만
마. 셀레늄	배합사료, 단미사료	돼지, 닭 배합사료 : 4ppm 이하 수산동물용 배합사료 : 10ppm 이하 기타 배합사료(프리믹스용 배합사료는 제외한다) : 2ppm 이하 남은음식물사료, 혼합성 단미사료 : 2ppm 이하
바. 조단백질	양돈용 배합사료	포유자돈: 20% 이하 이유돈: 18% 이하 육성돈: 16% 이하 비육돈: 14% 이하 번식용 모돈: 15% 이하 임신돈: 13% 이하 포유돈: 19% 이하
	산란계용 배합사료	산란어린병아리: 21% 이하 산란중병아리: 18% 이하

		산란큰병아리: 16% 이하 산란전: 17% 이하 산란초기: 19% 이하 산란중기: 18% 이하 산란말기: 17% 이하 산란종계: 19% 이하
	육계용 배합사료	육용어린병아리: 20% 이하 육용중병아리: 17% 이하 육용종계: 16% 이하 육계초기: 23% 이하 육계전기: 22% 이하 육계후기: 20% 이하
	오리용 배합사료	육용오리전기: 21% 이하 육용오리후기: 19% 이하 어린오리: 22% 이하 육성오리: 18% 이하 산란오리: 20% 이하
	고기소용 배합사료	어린송아지: 24% 이하 육성우: 18% 이하 번식우: 16% 이하 종모우: 17% 이하 임신우: 15% 이하 포유우: 18% 이하 큰소전기: 17% 이하 큰소후기: 15% 이하
	젖소용 배합사료	젖소어린송아지: 24% 이하 젖소중송아지: 19% 이하 젖소큰송아지: 18% 이하 젖소임신우: 17% 이하 젖소종모우: 17% 이하 비유초기: 24% 이하 비유중기: 19% 이하 비유말기: 18% 이하 건유기: 17% 이하 고능력우: 22% 이하
	고기소용 섬유질 배합사료	어린송아지: 22% 이하 중송아지: 20% 이하 큰소전기: 19% 이하 큰소후기: 17% 이하 번식우: 15% 이하
	젖소용 섬유질 배합사료	어린송아지: 22% 이하 큰송아지: 17% 이하 비유기: 20% 이하 건유기: 16% 이하
사. 산가	쌀겨	70 이하
아. 트리메틸아민(TMA)	염화콜린, 비테인염산염(베타인염)	500ppm 이하

	산염)	
--	-----	--

* 이 고시에서 별도로 기준을 정하지 않은 것은 잠정적으로 국제식품규격위원회(CAC : Codex Alimentarius Commission) 규정을 준용할 수 있으며, 국제식품규격위원회 규정이 없는 경우에는 농림축산식품부장관이 해당물질별 관련 자료와 선진외국의 엄격한 기준 등을 종합적으로 검토하여 판정할 수 있다.

** 남은음식물사료 구리·아연 건물기준 계산 산식(ppm) : 구리·아연 측정치(원물),ppm/(100-수분함량,%)×100

- 예1) 남은 음식물사료 성분 측정결과 수분 40%. 구리 6ppm 인 경우: $6\text{ppm}/(100-40)\times 100=10\text{ppm}$
- 예2) 남은 음식물사료 성분 측정결과 수분 40%, 구리 12ppm 인 경우: $12\text{ppm}/(100-40)\times 100=20\text{ppm}$