

[별표4]

제품의 약효 및 약해 시험성적서 검토기준

(제5조제2호 관련)

4-1. 공통 조건

- 4-1-1. 사용량 변경시험에서 농도를 높일 때에는 약해시험만 실시하고, 농도를 낮출 때에는 약효시험만 실시할 수 있다. 다만, 사용량이 증가될 경우에는 타당한 근거 자료를 검토한다.
- 4-1-2. 직권변경등록 시험은 1년에 지역을 달리한 2개 이상의 포장시험 성적서를 인정할 수 있으며, 나머지 검토기준은 변경시험에 준한다.
- 4-1-3. 신규등록제품은 신청자가 제시한 검토기준에 의하고 이 기준에서 구체적으로 정하지 아니한 사항에 대하여는 농약의 등록기준에 준하여 검토한다.

4-2. 일-메틸사이클로프로펜발생기의 약효 및 약해시험 성적서 검토 기준

- 4-2-1. 신규제품은 2~3년간 실시한 3개 이상의 포장시험(포장시험이 필요 없는 경우에는 실내시험) 성적서 이어야 하며, 2~3년차 시험은 각각 다른 지역에서 동시에 실시할 수 있다.
- 4-2-2. 공시약제당 3시기의 처리시기를 달리하여 시험한 성적을 검토하는 것을 원칙으로 하나, 해당 작물의 특성 및 적용 병해충을 고려하여 1시기에 시험한 성적도 검토할 수 있다.
- 4-2-3. 해당약제의 개발보급이 시급히 요망되는 경우와 포장시험이 불필요한 실내 재배작물 또는 농산물에 대해서는 1년에 3개소 시험도 인정할 수 있다.
- 4-2-4. 시험 결과가 대조제품과 비교하여 비등 또는 그 이상의 효과가 인정되어야 한다. 다만, 특성상 사용방법 등을 감안하여 종합적으로 평가할 수 있다.
- 4-2-5. 대조제품이 없거나 구입이 불가할 경우에는 무처리와 비교하여 유의성이 인정되어야 한다.
- 4-2-6. 변경등록 제품은 2개이상의 포장시험(포장시험이 필요 없는 경우에는 실내시험) 성적서 이어야 한다. 다만, 동일작물에 대하여 동일한 사용량, 사용방법으로 적용 병해충을 확대하고자 하는 경우에는 약해 시험성적서의 검토를 면제할 수 있다.

4-3. 페로몬 활용제품의 약효 및 약해시험 성적서 검토 기준

- 4-3-1. 신규제품은 2년 이상 실시한 2개 이상의 포장시험 성적서 이어야 한다.
- 4-3-2. 시험 결과가 무처리와 비교하여 방제가 기준 70% 이상이어야 하며, 교미 억제율은 90% 이상이어야 한다. 다만, 특성상 사용방법 등을 감안하여 종합적으로 평가할 수 있다. <개정 2012.09.11., 2015. 9. 14.>
- 4-3-3. 삭제 <2012. 9. 11.>
- 4-3-4. 변경등록 제품은 2개이상의 포장시험 성적서 이어야 한다. 다만, 동일작물에 대하여 동일한 사용량, 사용방법으로 적용 병해충을 확대하고자 하는 경우에는 약해 시험성적서의 검토를 면제할 수 있다.

4-4. 에틸렌발생제의 약효 및 약해시험 성적서 검토 기준 <신설 2012. 9. 11.>

- 4-4-1. 신규제품은 2~3년간 실시한 3개 이상의 포장시험(포장시험이 필요 없는 경우에는 실내시험) 성적서 이어야 하며, 2~3년차 시험은 각각 다른 지역에서 동시에 실시할 수 있다.
- 4-4-2. 공시약제당 3시기의 처리시기를 달리하여 시험한 성적을 검토하는 것을 원칙으로 하나, 해당 작물의 특성 및 적용 병해충을 고려하여 1시기에 시험한 성적도 검토할 수 있다.
- 4-4-3. 해당약제의 개발보급이 시급히 요망되는 경우와 포장시험이 불필요한 실내 재배작물 또는 농산물에 대해서는 1년에 3개소 시험도 인정할 수 있다.
- 4-4-4. 시험 결과가 대조제품과 비교하여 비등 또는 그 이상의 효과가 인정되어야 한다. 다만, 특성상 사용방법 등을 감안하여 종합적으로 평가할 수 있다.
- 4-4-5. 대조제품이 없거나 구입이 불가할 경우에는 무처리와 비교하여 유의성이 인정되어야 한다.
- 4-4-6. 변경등록 제품은 2개 이상의 포장시험(포장시험이 필요 없는 경우에는 실내시험) 성적서 이어야 한다. 다만, 동일작물에 대하여 동일한 사용량, 사용방법으로 적용 병해충을 확대하고자 하는 경우에는 약해 시험성적서의 검토를 면제할 수 있다.