

[별표 1]

한우 · 젃소 정액 검사기준

1. 정액 검사시기 및 방법

- 한우 · 젃소 당대검정우는 검정완료 직후(한우는 12개월령, 젃소는 12~16개월령) 씨수소 선발 예정두수의 1.5배에 해당하는 유전능력 상위두수를 1회 이상 실시한다.
- 한우 · 젃소 씨수소는 후대검정 교배용 정액 생산시(한우는 13~15개월령, 젃소는 13~17개월령)에 2회 이상 실시한다.

2. 검사항목 및 기준

- 정액량 : 1회 1.5ml 이상
- 정자의 활력 : 70% 이상
- 정자의 기형률 : 15% 이내
- 정자수 : 1ml당 5억개 이상
- 정자의 내동성 : 양호
- 수소이온 농도(pH) : 6~7
- 삼투압 : 250~350 Osmol
- 기타 : 무색, 무취이며 혈액이나 농이 없는 것

3. 정자의 등급

	A(100)	B(85)	C(50)	D(25)	E(0)
생존율(%)	91 이상	71~90	51~70	31~50	30 이하
활 력	5	4	3	2	1
기형률(%)	10 이하	11~15	16~25	26~40	41 이상

※ 생존율, 활력, 기형률 중 1개 항목이라도 C급 이하일 경우 선발대상에서 제외

※ 정자의 활력 판정기준

- 5 (최우량) : 80% 이상이 매우 활발한 운동을 하는 것
- 4 (우 수) : 70~80% 정도가 활발한 운동을 하는 것
- 3 (양 호) : 50~70% 정도가 전진운동을 하는 것

- 2 (보 통) : 30~50% 정도가 약한 전진운동을 하는 것
- 1 (불 량) : 30% 미만의 전진운동과 진자운동을 하는 것