

[별표1]

누에 우수품종 지정 시험의 조사항목 및 조사기준(제6조 관련)

1. 부화조사

조 사 항 목	조 사 기 준	방 법	단 위
가. 부화란수	실용부화조사 가. 첫 부화일부터 5일간 매일조사 나. 1아육 : 모든 아구에 대해 조사 다. 아구혼합육 : 모든 소잠아구 조사 라. 알맹이 누에씨 : 500립씩 평부 잠중으로 만들어 조사 마. 일별부화란 조사시간 춘잠기 : 11시, 하·추잠기 : 10시	흑색, 적색 싸인펜 으로 100알씩 표시, 계수	개
나. 불수정란수	유전적으로 백란(겉으로 보기에 노란색을 띤다)인 계통을 제외하고 품종 고유알색으로 변하지 않는 알	계수	개
다. 최청사란수	배자가 발육하여 최청란에 이른 후 첫부화일부터 5일이 경과되어도 부화하지 않은 알로서 외관상 엷은 푸른색을 띤 알	계수	개
라. 사란수	최청 이전에 또는 최청 중 최청란기 배자상태에서 죽은알을 말하며 흑색에 가까운 색깔을 나타내며 장액막 색소이상란, 백사란, 갈색란, 찌그러진알 등이 이에 속한다.	계수	개
마. 부화비율 1) 총란수 부화비율	$(\text{부화두수} \div \text{총란수}) \times 100$	산출	%
2) 수정란수 부화비율	$(\text{부화두수} \div \text{수정란수}) \times 100$	산출	%
3) 실용부화 비율	$(\text{연속한 2일간의 최대 부화두수} \div \text{수정란수}) \times 100$	산출	%
4) 부화의 고름새율	$(\text{부화두수} \div \text{소잠두수}) \times 100$	산출	%

2. 유충 경과조사

조 사 항 목	조 사 기 준	방 법	단 위
가. 사육일수	소잠부터 종숙까지 일·수.시간 ※ 24일 6시간이면 24.06으로 표시	관찰	일수. 시간
나. 죽중온도	상죽후 4일간 평균온도	산출	℃
다. 초숙일시	숙잠 5% 발현시간	관찰	일수. 시간
라. 종숙일시	숙잠 95% 발현시간	관찰	일수. 시간
마. 각령온(습)도	각령 누적 관측회수 ÷ 각령 누적 온(습)도	산출	℃ (%)
바. 전령온(습)도	전령 총관측회수 ÷ 전령 누적 온(습)도	산출	℃ (%)
사. 죽중온(습)도	총관측회수 ÷ 죽중 4일간 총온(습)도	산출	℃ (%)
아. 숙잠발현 시간	종숙일시~초숙일시 ※ 1일 4시간이면 28시간으로 표시	관찰	시간

3. 유충 생육조사

조 사 항 목	조 사 기 준	방 법	단 위
가. 5령기잠체중	4면탈피후 식욕이 생기기 직전 암수 각각 25두를 무게를 달아 그 평균치로 표시 ※ 육안으로 생식선에 의한 암수감별, 한성품종은 반문이나 혈색에 의하여 구별	측정	g
나. 5령3일체중	5령3일째(7회급상 2시간후)암수 각각 25두를 3회 이상 무게를 달아 평균으로 표시	측정	g
다. 5령최대체중	5령 5일째 최대성장 중심으로 암수 각각 25두를 3회 이상 무게를 달아 평균으로 표시	측정	g
라. 유충무늬	형, 회, 비백, 암갈, 흑호, 호, 갈원 등으로 표시 ※ 5령 5일째 조사, 해당반문 기록	관찰	
마. 체 색	청, 백, 적, 기타 등으로 표시 ※ 진함, 얼음 등 구체적으로 표시	관찰	
바. 체 형	가늘고 길, 보통, 짧고 굵음 등으로 표시	관찰	
사. 혈 색	황색, 백색 등으로 표시	관찰	
아. 뽕먹는 상태	1 : 활발, 2 : 보통, 3 : 느림	관찰	
자. 발육상태	1 : 고름, 2 : 보통, 3 : 고르지 못함	관찰	
차. 잠때의 고름새	1 : 고름, 2 : 보통, 3 : 고르지 못함	관찰	
카. 경과의 지속	1 : 빠름, 2 : 보통, 3 : 늦음	관찰	
타. 사육의 난이	1 : 쉬움, 2 : 보통, 3 : 어려움	관찰	

4. 유충 두수조사

조 사 항 목	조 사 기 준	방 법	단 위
가. 시험두수	4령 향식후 24시간이내에 반복당 200~250두를 세어 시험두수로 한다	계수	두
나. 보정두수	시험두수에서 제외잠수를 뺀 수를 말한다	산출	두
다. 상족두수	두수를 세어올리거나 세어올리기가 불가능할 때는 족중의 감잠을 조사하여 수견두수에 더하여 산출한다	산출	두
라. 화용두수	춘잠은 상족후 8일째, 추잠은 7일째 조사 ※ 쌍고치는 절개 조사하고 보통고치는 흔들어보거나 투시법에 의해서 조사한다. 반화용, 미화용은 감잠으로 처리	계수	두
마. 제외잠수	누에, 번데기 기간 중 병해와 인위적인 피해를 받아 제외된 누에 두수	계수	두
바. 장잠 감잠 비율	$(\text{장잠 감잠수} \div \text{보정두수}) \times 100$	산출	%
사. 족중 감잠 비율	$(\text{족중 감잠수} \div \text{보정두수}) \times 100$	산출	%
아. 견중 감잠 비율	$(\text{견중 감잠두수} \div \text{보정두수}) \times 100$	산출	%
자. 화용비율	$(\text{화용두수} \div \text{보정두수}) \times 100$	산출	%

5. 고치 두수조사

조 사 항 목	조 사 기 준	방 법	단 위
1. 상견비율	상견 : 외관상 상견중에서 반화용고치, 미화용고치, 내부오염고치를 제외한 것 (상견수 ÷ 총 수견수) × 100	산출	%
2. 중견비율	중견 : 외관상 상견인 내부오염견, 농·연화병고치, 반화용고치, 미화용고치 (중견수 ÷ 총 수견수) × 100	산출	%
3. 하견비율	하견 : 얇은고치, 속죽은 고치, 끝빠진 고치, 기타 조사불능 고치 (하견수 ÷ 총 수견수) × 100	산출	%
4. 옥견비율	두마리 이상의 누에가 공동으로 만든 고치 (옥견수 ÷ 총 수견수) × 100	산출	%
5. 1만두수견량	[(상견 중량 + 옥견 환산중량) ÷ 보정두수] × 10,000 ※ 옥견 환산중량 = 건용수×상견비율×전견중	측정	kg

6. 견질조사

조 사 항 목	조 사 기 준	방 법	단 위
1. 생수견1ℓ갯수, 생견1ℓ무게	춘잠은 상죽후 8일째, 추잠은 7일째 조사 갯수 및 무게는 횡반립을 기준한다	측정	개, g
2. 전견중	아구혼합육 : 암수 각 50개 이상 1아육 : 암수 각 25개 이상 ※ 소수 2자리 위로 표시	측정	g
3. 견충중	아구혼합육 : 암수 각 50개 이상 1아육 : 암수 각 25개 이상 ※ 소수 1자리 위로 표시	측정	cg
4. 견충비율	암수 같은 수의 견충중 및 전견중으로 계산 (견충중 ÷ 전견중) × 100	산출	%
5. 고치색	수견 및 견질조사시 백색, 녹색, 황색 등을 짚음, 열음 등으로 표시	관찰	
6. 고치모양	타원형, 땅콩형, 구형, 기타 등으로 표시	관찰	
7. 고치주름	조밀, 보통, 성김으로 표시하고 2종류 이상이 섞여 있을 때는 그 비율을 조사	관찰	
8. 고치크기	대, 중, 소로 표시	관찰	
9. 고치고름새	고름, 보통, 고르지 않음 등으로 표시	관찰	

7. 발아 및 산란조사

조 사 항 목	조 사 기 준	방 법	단 위
1. 발아조사	가. 초발아일 포함 8일간 매일 조사 나. 아구당 암수 각각 100개를 골라내어 조사 다. 발아 후 이상 상태를 나타내는 것은 이상 나방으로 한다 라. 발아비율, 비정상 발아비율은 정수로 표시		
2. 발아비율	$(\text{정상발아수} \div \text{시험고치수}) \times 100$	산출	%
3. 이상나방 비율	$(\text{이상나방수} \div \text{시험고치수}) \times 100$	산출	%
4. 최다발아일	암수별로 가장 많이 발아한 날	나방 계수	
5. 산란조사	정상 산란 10나방 조사		
6. 정상산란 나방비율	총산란 나방구에 대하여 비정상란 나방구의 백분율로 표시하고 정수로 표기	산출	%
7. 1나방당 산란수	투명종이를 덮고 부화수 조사요령 알수를 셈	계수	개
8. 알색	월년중의 경우 9~10월중에 조사하며 우리말색채이름사전(KBS색채연구소발행)의 기준 색채를 참고	관찰	
9. 비정상 산란 나방수	가. 불수정란이 20%이상 섞여있는 것 나. 산란수가 평균산란수의 40%이하인 것 다. 겹쳐진 알이 현저히 많은 것 라. 재출란이 20%이상 섞여있는 것 마. 죽은 알이 현저히 많은 것 바. 알이 산란대지에 붙지 않은 나방	계수	개

8. 보급 누에씨조사

조 사 항 목	조 사 기 준	방 법	단 위
1. 누에알 무게	20,000알(1상자) 무게를 달거나 표본추출(1,000알)후 상자당 무게로 환산	측정	g
2. 상자당 수용 알수	상자별 전량조사 또는 표본추출후(1,000알) 무게를 달아 상자당 알수로 환산	측정	개
3. 정상알비율	누에씨 1,000알중 불수정란, 사란, 재출란 등에 대한 정상알의 백분율	산출	%
4. 오교비율	조사구별(구당 500두)로 민무늬 누에두수를 조사	계수	%

9. 견사질조사

조 사 항 목	조 사 기 준	방 법	단 위
1. 고치 말린 비율	$(\text{마른고치무게} \div \text{생고치무게}) \times 100$	산출	%
2. 골라낸 고치 비율	$(\text{골라낸 고치무게} \div \text{공시 고치무게}) \times 100$	산출	%
3. 고치실길이	$(\text{생실 길이} \times \text{평균 실켜는 고치수}) \div \text{실이 켜진 총고치수}$	산출	m
4. 고치실량	$\text{생실 정량(g)} \div \text{실이 켜진 고치수(개)}$	산출	cg
5. 견사섬도	$(\text{생실 정량(g)} \times 9,000) \div (\text{생실 길이} \times \text{평균입부수})$	산출	d
6. 생실량 비율	$[(\text{실 정량} + \text{실켜다 남은고치 생실 환산량}) \div \text{실켜기구 고치의 무게}] \times 100$ ※ 실켜다 남은 고치의 생실 환산량(g) = 고치실량(cg) × 실켜다 남은 고치 환산 개수(개)	산출	%
7. 연감율	$[(\text{시료의 무수량} - \text{정련견사 무수량}) \div \text{시료 무수량}] \times 100$	산출	%