

[별표]

소나무재선충병 예방약제별 약효 지속기간

연번	품목명	작물명	적용병해충	사용방법	약효 지속 기간
1	아바멕틴 미탁제 1.8%	소나무	소나무재선충	나무주사	2년
2	아바멕틴 분산성액제 1.8%	소나무	소나무재선충	나무주사	2년
3	아바멕틴 분산성액제 1.8%	잣나무	소나무재선충	나무주사	2년
4	아바멕틴 유제 1.8%	소나무	소나무재선충	나무주사	2년
5	아바멕틴·설펍사플로르 분산성액 제 6(1.8+4.2)%	소나무	소나무재선충	나무주사	2년
6	아바멕틴·설펍사플로르 분산성액 제 6(1.8+4.2)%	잣나무	소나무재선충	나무주사	2년
7	아바멕틴·아세타미프리트 미탁제 8.6(1.6+7)%	소나무	소나무재선충	나무주사	2년
8	아바멕틴·아세타미프리트 미탁제 8.6(1.6+7)%	잣나무	소나무재선충	나무주사	2년
9	아세타미프리트·에마멕틴벤조에이트 분산성액제 10(8+2)%	소나무	소나무재선충	나무주사	2년
10	아세타미프리트·에마멕틴벤조에이트 분산성액제 10(8+2)%	잣나무	소나무재선충	나무주사	2년
11	에마멕틴벤조에이트 미탁제 2.15%	소나무	소나무재선충	나무주사	2년
12	에마멕틴벤조에이트 분산성액제 15.1%	소나무	소나무재선충	나무주사	2년
13	에마멕틴벤조에이트 액제 2%	소나무	소나무재선충	나무주사	2년
14	에마멕틴벤조에이트 유제 2.15%	소나무	소나무재선충	나무주사	2년
15	에마멕틴벤조에이트 유제 2.15%	잣나무	소나무재선충	나무주사	2년
16	에마멕틴벤조에이트 직접살포액 제 9.7%	소나무	소나무재선충	나무주사	3년
17	아세타미프리트·에마멕틴벤조에이트 16(10+6)%	소나무	소나무재선충	나무주사	4년
18	밀베멕틴 유제 2%	소나무	소나무재선충	나무주사	6년