

포장검사 병주 판정기준

작물별	구 분	병 명	병 주 판 정 기 준
벼	특 정 병	키다리병	증상이 나타난 주
	"	벼잎선충병	"
	기 타 병	이삭도열병	이삭의 1/3이상이 불임 고사된 주
	"	잎도열병	위로부터 3엽에 각 15개이상 병반이 있거나, 엽면적 30%이상 이병된 주
	"	기타도열병	이삭이 불임 고사된 주
	"	깨씨무늬병	위로부터 3엽의 중앙부 5cm 길이 내에 50개 이상 병반이 있는 주
	"	이삭누룩병	이병된 영화수 비율이 50%이상인 주
	"	잎집무늬마름병	이삭이 불임 고사된 주
	"	흰잎마름병	지엽에서 제3엽까지 잎가장자리가 회색 변색된 주
	"	오 갈 병	증상이 나타난 주
	"	줄무늬잎마름병	"
	"	세균벼알마름병	이삭입수의 5.0%이상 이병된 주
맥류	특 정 병	겉깜부기병	증상이 나타난 주
	"	속깜부기병	"
	"	비린 깜부기병	"
	"	줄무늬병	"
	기 타 병	흰가루병	위로부터 3엽에 엽면적 50%이상 이병된 주
	"	줄기녹병	" 30%이상 "
	"	좁 녹 병	" 30%이상 "
	"	붉은곰팡이병	이삭입수의 5.0%이상 이병된 주
	"	위 축 병	증상이 나타난 주
	"	잎마름병	백수가 된 주
	"	바이러스병	증상이 나타난 주
콩	특 정 병	자주무늬병	병반이 10개이상 있거나 엽면적의 30%이상 이병된 잎의 엽수비율이 10%이상인 주
	기 타 병	모자이크병	증상이 나타난 주
	"	세균점무늬병	병반이 50개이상 있거나 엽면적의 30%이상 이병된 잎의 엽수비율이 50%이상인 주
	"	불마름병	"
	"	탄 저 병	"
	"	노 균 병	"
옥수수	기 타 병	잎마름병	이삭 붙은 하위 1엽이상 엽에 50개이상 병반이 있거나 엽면적의 30%이상 이병된 주
	"	깨씨무늬병	"
	"	이삭썩음병	"
	"	깜부기병	증상이 나타난 주

작물별	구 분	병 명	병 주 판 정 기 준
감 자	특정병	바이러스병	증상이 나타난 주
	"	들레씩음병	"
	"	갈죽병	"
	"	꽃마름병	"
	기타병	검은무늬씩음병	증상이 나타난 주
	"	시들음병	"
	"	역병, 검둥근무늬병	각 엽에 병반이 5개 이상이거나 엽면적의 10%이상 이병된 잎의 엽수비율이 50%이상인 주
	"	기 타 병	각엽에 병반이 20개이상 있거나 엽면적 50%이상 이병된 잎의 엽수비율이 50%이상인 주
고구마	특 정 병	검은무늬병	각엽에 병반이 5개이상 있거나 엽면적의 5%이상 이병된 잎의 엽수비율이 50%이상인 주
	"	빛자루병	증상이 나타난 주
	기 타 병	덩굴쫄김병	줄기에 증상이 나타난 주
	"	선 충 병	선충에 의한 피해가 현저한 주
팔, 녹두	특 정 병	콩세균병	각엽에 병반이 30개이상 있거나 엽면적의 10%이상 이병된 잎의 엽수비율이 30%이상인 주
	"	바이러스병(위축병, 황색모자이크병)	병증이 나타난 주
	기 타 병	불마름병, 갈색점무늬병 및 탄저병	각엽에 병반이 50개이상 있거나 엽면적의 30%이상 이병된 잎의 엽수비율이 50%이상인 주
	"	흰가루병	종자 품위에 영향이 있을 정도의 심한 주
	"	녹두모틀바이러스병	병증이 나타난 주
참깨	특 정 병	역 병	종자 품위에 영향이 있을 정도로 심한 주
	"	시들음병	"
	기 타 병	잎마름병	종자 품위에 영향이 있을 정도로 심한 주
들깨	특정병	녹 병	종자 품위에 영향이 있을 정도로 심한 주
	기타병	줄기마름병	종자 성숙에 영향이 있을 정도로 심한 주
유 채	특정병	균 핵 병	종자 품위에 영향이 있을 정도로 심한 주
	기타병	흰녹가루병, 뿌리씩음병	종자 성숙에 영향이 있을 정도로 심한 주
	"	공 동 병	"
땅콩	특정병	갈색 무늬 병	종자 품위에 영향이 있을 정도로 심한 주
	기타병	검은무늬병, 좁균핵병	"
	"	흰비단병	"

작물별	구 분	병 명	병 주 판 정 기 준
사과주 ¹	바이러스바 이로이드	사과황화잎반점바이러스병(ACLSV)	어린잎에서 황화반점이 보이거나 잎이 뒤틀림
	"	사과줄기그루빙바이러스병(ASGV)	병징 없음(잠재)주2, 일부 품종에서 목질부 괴사
	"	사과줄기홍바이러스병(ASPV)	병징 없음(잠재)주2, 일부 품종에서 목질부에 흠
	"	사과모자이크바이러스 병(ApMV)	잎에 밝은 크림 색의 원형 병반 및 옆맥을 따라 크림 색의 선이 생성됨
	"	사과바이로이드병(AS SVd)	과피에 황색 반점 형성, 착색 불균형, 과피에 주름
	기타병	뿌리혹병	근두나 지하경에 딱딱한 암갈색의 혹이 생긴 주
배주 ¹	바이러스바 이로이드	ACLSV	등근 모자이크 증상
	"	ASGV	병징 없음(잠재)주2
	"	ASSVd	과피에 녹이 슨 것 같은 증상, 기형과 형성
	기타병	뿌리혹병	근두나 지하경에 딱딱한 암갈색의 혹이 생긴 주
복숭아 주 ¹	바이러스바 이로이드	ACLSV	싹의 괴사, 잎의 변형 및 황화
	"	호프스턴트바이로이드 병(HsVd)	과피색이 얼룩덜룩하게 보임
	기타병	근두암중병(뿌리혹병)	근두나 지하경에 딱딱한 암갈색의 혹이 생긴 주
포도주 ¹	바이러스바 이로이드	포도잎말림바이러스병 -1(GLRaV-1)	초가을부터 잎이 아래쪽으로 말리며 황화 증상이 나타남
	"	포도잎말림바이러스병 -3(GLRaV-3)	초가을부터 옆맥을 제외한 잎 전체가 붉어짐
	"	포도얼룩반점바이러스 병(GFkV)	옆맥따라 황화 증상
	기타병	뿌리혹병	근두나 지하경에 딱딱한 암갈색의 혹이 생긴 주
	"	뿌리혹선충	증상이 나타난 주
감귤주 ¹	바이러스바 이로이드	접목이상부바이러스병 (CTLV)	병징 없음(잠재)주2, 일부 품종에서 잎 황화 증상
	"	갈색줄무늬오갈병 (CTV)	바이러스 타입별로 유묘의 황화 및 나무 고사
	기타병	케양병	잎, 가지, 열매에 진한 갈색 반점이 나타난 주
감주 ¹	바이러스바 이로이드	감잠재바이러스병 (PeCV)	옆맥과 잎 가장자리에 괴사 증상
	"	감바이로이드병 (PVd)	잎에 검은 반점 및 과피의 괴사 반점
	"	감굴바이로이드병 (CVd)	나무의 왜화
	기타병	뿌리혹병	근두나 지하경에 딱딱한 암갈색의 혹이 생긴 주

※ 상기에 명시되지 아니한 작물의 병주 판정기준은 포장에 나타난 병이 당대 종자품위 및 성숙에 미치는 영향과 차세대 종자에 미치는 영향 등을 고려하여 분류한다.

(주1) 과수바이러스병은 같은 바이러스에 의한 발병도 과종 및 품종에 따라 병징이 상이하게 나타날 수 있으며, 목측할 수 있는 병징은 대부분 이른 봄 어린 잎에서 가장 쉽게 관찰할 수 있다.

(주2) 병징이 없고, 잠재적인 바이러스병은 일부 감수성 품종에서는 병징이 나타나나 대부분 뚜렷한 병징을 보이지 않고, 다른 바이러스와 복합 감염 시 심한 증상을 야기하기도 한다. 과수에서 병징이 없더라도 지표 식물(담배, 명아주 등)에서 병징을 유발하기도 한다.