

캘리포니아주 무발생지역의 양벚과실파리류 검출에 대한 긴급조치
계획(제15조 관련)

1. 서부양벚과실파리(WCFF)와 Black Cherry Fruit Fly(BCFF)의 트랩조사는 캘리포니아의 일반적인 과실파리 검출 프로그램의 일부로 수행되며, Pherocon AMTM 트랩, McPhail 트랩, ChamPTM 트랩과 여러 종의 과실파리를 검출하기 위한 일반목적 트랩들을 사용한다.
 - Pherocon AMTM 트랩: 노란색의 양면 평면 트랩으로 식욕 자극제인 두 종류의 유인물질(ammonium acetate, protein hydrolysate)이 포함되어 접착성 표면으로 유인
 - McPhail 트랩: 먹이 유인 역할을 하는 혼합물이 녹아있는 액체가 들어있는 유리병 트랩으로 파리가 아래부분의 통로로 들어와서 액체에 떨어짐
 - ChamPTM 트랩: 노란색의 함몰된 평면 트랩으로 두 개의 구멍이난 접착성 표면을 가지며, 접으면 커다란 티백 모양이 된다. 먹이 유인 역할을 하는 Ammonium bicarbonate lure가 트랩의 중앙부위에 위치하고 트랩 측면의 둥그런 구멍을 통해 퍼진다.
2. 트랩들은 지역의 특성(도심, 농촌 주거환경, 기타 지역 등)을 고려하여 평방마일 당 2-5개 범위의 밀도로 적절한 기주 나무에 설치한다. ChamPTM 트랩과 McPhail 트랩은 대부분의 남부 캘리포니아에서는 연중 설치하고, 샌프란시스코와 남부 캘리포니아 일부지역에서는 4월 1일부터 11월 30일까지, Imperial 카운티는 11월 1일부터 5월 31일까지, Riverside 카운티의 Coachella valley에서는 9월 1일부터 6월 30일까지, 그리고 과실파리의 정착이 가능한 기후 조건의 나머지 지역에서는 5월 1일부터 10월 31일까지 설치된다. Pherocon AMTM 트랩은 지역에 따라 5월 1일 이전부터 9월 30일 또는 10월 31일까지 설치된다.

3. 트랩 조사는 트랩의 종류와 지역에 따라서 4주 간격으로 조사되며, 끈 끈이판은 최소 4주마다 교체한다. 성숙되거나 성숙 중인 과실이 달린 기주식물에 트랩을 유지하기 위해 트랩의 위치를 변경한다.

4. WCFF 또는 BCFF가 캘리포니아의 무발생지역에서 검출될 경우에는 지역 카운티의 농업협회는 캘리포니아주정부 농업부(CDFA)의 가이드라인에 따라 다음의 조치를 포함하는 박멸프로그램을 개시해야 한다.

- 검출 지역들로부터 반경 0.5마일 내에 Pherocon AM™ 트랩을 이용한 *Rhagoletis* 예찰구역 설정
- 검출 및 인근 지역에서 유충 및 알 검출을 위한 과실 절개 검사 실시, 2마리 이상의 파리가 검출된 경우에는 주변 200미터 내 모든 지역에서 과실절개 검사를 실시
- WCFF 또는 BCFF가 존재 한다고 판단되는 밀도(정의: 유충, 번데기 또는 교미암컷이 검출되거나 2마리 이상의 성충이 동일한 세대기간동안 1마일 이내에 검출되는 경우)가 확인되면 박멸조치 개시. 박멸조치는 다음 사항들을 포함한다:
 - 과실 성숙기에는 발견 지역 주변 200미터 내에 살충제와 bait를 사용하여 방제 실시
 - 필요한 경우 감염 지역과 인근 지역 나무들의 과실 제거 작업 실시
 - 감염된 모든 지역에서 과일과 토양과 같은 잠재적 오염물질의 이동방지 조치
 - delimitation trapping 수준에서 박멸조치 이후 모니터링 실시

5. 카운티 농업협회는 검역구역 설정과 박멸프로그램 수행 및 개발을 위해 CDFA와 긴밀하게 협조해야 하고, 추가적으로 카운티 자체의 조치계획을 수립할 수 있다. 카운티 자체 조치계획은 San Joaquin County의 조치계획의 내용을 반영하여 작성되어야 한다.