

[별표 1]

뉴질랜드산 양벚의 검역 방법(제4조 관련)

1. 포장재료의 검역

포장재료에는 잎 등 식물성 물질이 포함되지 않은 새것이 사용되어야 하며, [별표 2]의 검역병해충이 없어야 한다.

2. 과실의 검역

- 검역은 최소 1000럭스(lux) 조명의 깨끗한 검역장소에서 수행되어야 한다.
- 표본 추출된 박스로부터 과실을 채취하여 병해충을 면밀히 검역한다.
- 과실에 잎과 다른 이질적인 식물체가 없는지 검역한다.
- 꼭지를 포함하여 과실의 모든 부분에 대해 병해충 유무를 면밀히 조사한다. 과실 및 꼭지에 대해 Shothole의 오염이 의심되면 Shothole의 증상(과실의 융기, 거칠고 코르크화된 작은 자주빛 반점, 꼭지에 작게 움푹 들어간 병반)을 조사한다.
- 다음과 같은 것의 분명한 증상을 판단하기 위해, 의심되는 과실을 절개한다.
 - 유충의 뽕(frass), 거미줄망(webbing), 구멍(puncture marks), 갉아먹은 자국(chewing) 또는 그을음(sooty mould)
- 한국에 도착시 병해충 분류동정 등으로 인해 화물의 통관이 지연되는 것을 방지하기 위해 유해 병해충이 실질적으로 없어야 한다.
- 과실검역에서 병해충이 발견될 경우, 한국측 우려 병해충 목록을 참고하여 그 병해충을 정확히 분류동정한다.
- 발견된 병해충의 확인결과 의심되는 샘플은 뉴질랜드 정부가 인정한 연구소에 송부되며, 여기에서 동정된 결과는 검역관에게 송부된다.
- 확인이 되지 않는 병해충은 검역병해충으로 처리한다.
- 검역병해충이 발견될 경우, 동 재배자의 화물은 불합격 조치된다.
- 모든 발견 사항을 기록한다.