[별표 5]

산림병해충별 발생밀도(피해도) 조사 기준이 없는 기타병해충에 대한 조사요령(제16조 관련)

구 분	구분방법	발생밀도(피해도) 구분			조 사 요 령
		심	중	경	
식엽성 해충에 대한 피해도 조사	나비목 등 식엽성해충의 경우 피해엽 면적에 대해 구분	50% 이상	20~50% 미만	20% 미만	1. 조사지 3개소(10 × 15m)에서 조사 2. 육안 피해엽량으로 피해목별 피해도를 조사 1) '가' : 50% 이상 2) '나' : 20~50% 미만 3) '다' : 20% 미만 3. 피해율 = [{5 × ('가'의 그루수) + 3 × ('나'의 그루수) + 1 × ('다'의 그루수)} / (총 조사 그루수 × 5)] × 100
천공성 해충에 대한 피해도 조사	피해 그루수 및 천공수에 의한 구분	50% 이상	20~50% 미만	20% 미만	1. 조사지 3개소(10 × 15m)에서 조사 2. 피해목별로 4방위에 대해 수고 1m 이하에서 투명판(크기 20 × 20cm, 면적 400㎠) 내 천공수를 조사한 후 평균 천공수를 계산 1) '가' : 35개 이상 / 400㎠ 2) '나' : 5~35개 미만 / 400㎠ 3) '다' : 5개 미만 / 400㎠ 3. 피해율 = [{5 × ('가'의 그루수) + 3 × ('나'의 그루수) + 1 × ('다'의 그루수)}] / (총 조사 그루수 × 5)] × 100
종실가해 해충에 대한 피해도 조사	피해종실 비율에 의한 구분	50% 이상	20~50% 미만	20% 미만	1. 조사대상지 내에서 피해정도가 평균이 되는 조사목 5그루 선정 2. 조사목 1그루당 4방위에서 1가지의 종실수를 세고 그 중에 피해 종실수 계산 3. 피해율 = 피해받은 종실의 수 / 총 종실수 × 100
흡즙성 해충에 대한 피해도 조사	약·성충수에 의한 구분	1,000마리 이상	100~1,000마리 미만	100마리 미만	1. 실 발생면적을 조사·확정하고 발생상황의 표준이 되는 지역을 선정 2. 목본성, 초본성 기주식물을 중심으로 30그루를 육안조사하여 약충과 성충의 평균 마리수를 계산
뿌리·줄기에 발생하는 병해, 시들음 병해, 전신감염성[1] 병해에	피해본수 및 피해증상에 의한 구분	50% 이상	20~50% 미만	20% 미만	1. 조사지 3개소(10 × 15m)에서 조사 2. 피해율 = $\frac{\text{피해 그루수}}{\text{총 조사 그루수}} \times 100$

대한 피해도 조사	(바이러스, 파이토플라스마 등)				
가지에 발생하는 병해에 대한 피해도 조사	피해본수 및 피해가지수에 의한 구분	50% 이상	20~50% 미만	20% 미만	1. 조사지 3개소(10 × 15m)에서 조사 2. 피해가지의 수로 피해목별 피해도를 조사 1) '가' : 5개 이상 2) '나' : 3~5개 미만 3) '다' : 3개 미만 3. 피해율 = [{5 × ('가'의 그루수) + 3 × ('나'의 그루수) + 1 × ('다'의 그루수)} / (총 조사 그루수 × 5)] × 100
잎·과실에 발생하는 병해에 의한 피해도 조사	피해본수 및 피해잎수에 의한 구분	50% 이상	20~50% 미만	20% 미만	1. 조사지 3개소(10 × 15m)에서 조사 2. 육안 피해엽량으로 피해목별 피해도를 조사 1) '가' : 50% 이상 2) '나' : 20~50% 미만 3) '다' : 20% 미만 3. 피해율 = [{5 × ('가'의 그루수) + 3 × ('나'의 그루수) + 1 × ('다'의 그루수)} / (총 조사 그루수 × 5)] × 100

[1]. 바이러스, 파이토플라스마 등