

[별표 3]

장애유형별 장애상태 기준

장애유형명	분류 기호	장애상태
지체장애 (팔 절단)	나	· 두 손의 엄지손가락을 손가락관절(지관절) 이상 부위에서 잃은 사람 · 한 손의 엄지손가락을 손가락관절(지관절) 이상 부위에서 잃고 둘째손가락을 몸쪽손가락관절(근위지관절) 이상 부위에서 잃은 사람 · 한 손의 엄지손가락을 손가락관절(지관절) 이상 부위에서 잃고 2개의 손가락을 몸쪽손가락관절(근위지관절) 이상 부위에서 잃은 사람
	다	· 한 손의 엄지손가락을 손가락관절(지관절) 이상 부위에서 잃고 1개의 손가락을 몸쪽손가락관절(근위지관절) 이상 부위에서 잃은 사람 · 한 손의 엄지손가락을 손허리손가락관절(중수지관절) 이상 부위에서 잃은 사람 · 한 손의 둘째손가락을 포함하여 3개의 손가락을 몸쪽손가락관절(근위지관절) 이상 부위에서 잃은 사람
지체장애 (다리 절단)	가	· 두 다리를 가로발목뼈관절(Chopart's joint) 이상 부위에서 잃은 사람 · 한 다리를 무릎관절 이상 부위에서 잃은 사람
	나	· 두 다리를 발목발허리관절(lisfranc joint) 이상 부위에서 잃은 사람 · 한 다리를 발목관절 이상 부위에서 잃은 사람
	다	· 두 발의 엄지발가락을 발가락관절(지관절) 이상 부위에서 잃고 다른 모든 발가락을 몸쪽발가락관절(근위지관절(제1관절)) 이상 부위에서 잃은 사람 · 한 다리를 가로발목뼈관절(Chopart's joint) 이상 부위에서 잃은 사람
지체장애 (팔 관절)	나	· 한 팔의 3대 관절 중 한 관절의 운동범위가 75% 이상 감소된 사람 · 두 손의 엄지손가락의 관절총운동범위가 각각 75% 이상 감소된 사람 · 한 손의 엄지손가락과 둘째손가락의 관절총운동범위가 각각 75% 이상 감소된 사람 · 한 손의 엄지손가락 또는 둘째손가락을 포함하여 3개 손가락의 관절총운동범위가 각각 75% 이상 감소된 사람 · 한 손의 엄지손가락 또는 둘째손가락을 포함하여 4개 손가락의 관절총운동범위가 각각 50% 이상 75% 미만 감소된 사람

장애유형명	분류 기호	장애상태
지체장애 (팔 관절)	다	· 한 팔의 3대 관절 중 2개의 운동범위가 각각 50% 이상 75% 미만 감소된 사람 · 한 팔의 모든 3대 관절의 운동범위가 각각 25% 이상 50% 미만 감소된 사람 · 두 손의 엄지손가락의 관절총운동범위가 각각 50% 이상 75% 미만 감소된 사람 · 한 손의 엄지손가락의 관절총운동범위가 75% 이상 감소된 사람 · 한 손의 엄지손가락과 둘째손가락의 관절총운동범위가 각각 50% 이상 75% 미만 감소된 사람 · 한 손의 엄지손가락 또는 둘째손가락을 포함하여 3개 손가락의 관절총운동범위가 각각 50% 이상 75% 미만 감소된 사람 ※ 어깨관절, 팔꿈치관절, 손목관절에 인공관절치환술을 시행하여 2관절 이상 예후가 불량한 경우(뚜렷한 골 융해, 삽입물의 이완, 중등도 이상의 불안정 또는 강직, 염증 소견이 뼈스캔 사진 등 영상자료로 확인되는 경우)에도 준용한다. 다만, 관절기능의 기여도가 적은 팔꿈치 관절의 요골두 치환술이나 손목관절의 원위척골 치환술과 같은 부분치환술을 시행한 경우는 장애정도를 인정하지 않는다. - 중등도 이상의 불안정은 방사선상 아탈구가 나타나는 경우를 말하며, 중등도 이상의 강직은 관절운동의 범위가 해당 관절 운동범위의 50%이상 감소된 경우를 말한다.
지체장애 (다리 관절)	가	· 한 다리의 모든 3대 관절의 운동범위가 각각 75% 이상 감소된 사람
	나	· 두 다리 각각의 3대 관절 중 2개의 운동범위가 각각 50% 이상 75% 미만 감소된 사람 · 두 다리의 모든 3대 관절의 운동범위가 각각 25% 이상 50% 미만 감소된 사람 · 한 다리의 엉덩관절 또는 무릎관절이 완전강직 되었거나 운동범위가 90% 이상 감소된 사람 · 한 다리의 3대 관절 중 2개의 운동범위가 각각 75% 이상 감소된 사람 · 한 다리의 모든 3대 관절의 운동범위가 각각 50% 이상 75% 미만 감소된 사람
	다	· 한 다리의 엉덩관절 또는 무릎관절의 운동범위가 75% 이상 감소된 사람 · 한 다리의 발목관절이 완전강직 되었거나 운동범위가 90% 이상 감소된 사람 · 한 다리의 3대 관절 중 2개의 운동범위가 각각 50% 이상 75% 미만 감소된 사람 · 한 다리의 모든 3대 관절의 운동범위가 각각 25% 이상 50% 미만 감소된 사람 · 두 발의 모든 발가락의 관절총운동범위가 각각 75% 이상 감소된 사람 ※ 엉덩관절, 무릎관절, 발목관절에 인공관절치환술을 시행하여 2관절 이상 예후가 불량한 경우(뚜렷한 골 융해, 삽입물의 이완, 중등도 이상의 불안정 또는 강직, 염증 소견이 뼈스캔 사진 등 영상자료로 확인되는 경우)에도 준용한다. 다만, 관절기능의 기여도가 적은 슬개골 치환술 등과 같은 부분치환술을 시행하는 경우는 장애정도를 인정하지 않는다. - 중등도 이상의 불안정은 방사선상 아탈구가 나타나는 경우를 말하며, 중등도 이상의 강직은 엉덩관절 또는 무릎관절의 운동범위가 해당 관절 운동범위의 50% 이상 감소된 경우 또는 발목관절의 운동범위가 75% 이상 감소된 경우를 말한다.

장애유형명	분류 기호	장애상태
지체장애 (팔 기능)	나	· 두 손의 엄지손가락을 완전마비로 각각 전혀 움직이지 못하는 사람(근력등급 0, 1) · 한 손의 엄지손가락과 둘째손가락을 완전마비로 각각 전혀 움직일 수 없는 사람(근력등급 0, 1) · 한 손의 엄지손가락 또는 둘째손가락을 포함하여 3개의 손가락을 완전마비로 각각 전혀 움직일 수 없는 사람(근력등급 0, 1) · 한 손의 엄지손가락이나 둘째손가락을 포함하여 4개의 손가락을 마비로 각각 기능적이지는 않지만 어느 정도 움직일 수 있는 사람(근력등급 3)
	다	· 한 팔을 마비로 기능적이지는 않지만 어느 정도 움직일 수 있는 사람(근력등급 3) · 두 손의 엄지손가락을 마비로 각각 기능적이지는 않지만 어느 정도 움직일 수 있는 사람(근력등급 3) · 한 손의 엄지손가락을 완전마비로 전혀 움직일 수 없는 사람 (근력등급 0, 1) · 한 손의 엄지손가락과 둘째손가락을 마비로 각각 기능적이지는 않지만 어느 정도 움직일 수 있는 사람(근력등급 3) · 한 손의 엄지손가락 또는 둘째손가락을 포함하여 3개의 손가락을 마비로 각각 기능적이지는 않지만 어느 정도 움직일 수 있는 사람(근력등급 3)
지체장애 (다리 기능)	가	· 한 다리를 완전마비로 전혀 움직일 수 없는 사람(근력등급 0, 1) · 두 다리를 마비로 각각 조금 움직일 수 있는 사람(근력등급 2, 3)
	나	· 두 다리를 마비로 기능적이지는 않지만 어느 정도 움직일 수 있는 사람(근력등급 3) · 한 다리를 마비로 겨우 움직일 수 있는 사람(근력등급 2)
	다	· 한 다리를 마비로 기능적이지는 않지만 어느 정도 움직일 수 있는 사람(근력등급 3) · 두 발의 모든 발가락을 완전마비로 각각 전혀 움직일 수 없는 사람(근력등급 0, 1) · 한 발목의 마비로 굴곡 및 신전 기능이 모두 소실된 사람(근력등급 0, 1)
지체장애 (척추)	가	· 목뼈 또는 등.허리뼈의 운동범위가 정상의 4/5 이상 감소된 사람 · 강직성 척추질환으로 목뼈 2번 이하와 등뼈 및 허리뼈가 완전강직된 사람
	나	· 목뼈 또는 등.허리뼈의 운동범위가 정상의 3/5 이상 감소된 사람
	다	· 목뼈 또는 등.허리뼈의 운동범위가 정상의 2/5 이상 감소된 사람 · 강직성 척추질환으로 목뼈와 등뼈 또는 등뼈와 허리뼈가 완전강직된 사람

장애유형명	분류 기호	장애상태
지체장애 (변형)	다	· 한 다리가 건강한 다리보다 10cm 이상 또는 건강한 다리의 길이의 10분의 1 이상 짧은 사람
뇌병변장애	나	· 보행과 대부분의 일상생활동작 수행에 간헐적으로 타인의 도움이 필요하며, 수정바델 지수가 70 ~ 80점인 사람
	다	· 보행과 대부분의 일상생활동작을 타인의 도움 없이 자신이 수행하나 간헐적으로 수행하지 못하는 때가 있으며 수정바델지수가 81 ~ 89점인 사람
시각장애	나	· 좋은 눈의 시력이 0.1 이하인 사람 · 두 눈의 시야가 각각 모든 방향에서 10도 이하로 남은 사람
	다	· 좋은 눈의 시력이 0.2 이하인 사람 · 두 눈의 시야가 각각 정상시야의 50% 이상 감소한 사람
청각장애 (청력)	가	· 두 귀의 청력손실이 각각 80데시벨(dB) 이상인 사람
	나	· 두 귀의 청력손실이 각각 70데시벨(dB) 이상인 사람 · 두 귀에 들리는 보통 말소리의 최대의 명료도가 50 퍼센트 이하인 사람
	다	· 두 귀의 청력손실이 각각 60데시벨(dB) 이상인 사람 · 심한 이명이 있으며, 청력장애 정도가 한귀의 청력손실이 80데시벨(dB)이상 다른 귀의 청력손실이 40데시벨(dB) 이상인 사람
청각장애 (평형기능)	가	· 양측 평형기능의 소실이 있으며 두 눈을 감고 일어서기가 곤란하거나 두 눈을 뜨고 10미터 거리를 직선으로 걷다가 쓰러지고(임상적으로 불가피한 경우 6미터를 걷게 하여 진단할 수 있다) 일상에서 자신을 돌보는 일 외에는 타인의 도움이 필요한 사람
	나	· 양측 평형기능의 소실이나 감소가 있으며 두 눈을 뜨고 10미터 거리를 직선으로 걷다가 중간에 균형을 잡으려 멈추어야 하고 (임상적으로 불가피한 경우 6미터를 걷게 하여 진단할 수 있다) 일상에서 자신을 돌보는 일과 간단한 보행이나 활동만 가능한 사람
	다	· 평형기능의 감소가 있으며 두 눈을 뜨고 10미터 거리를 직선으로 걸을 때 중앙에서 60센티미터 이상 벗어나고 (임상적으로 불가피한 경우 6미터를 걷게 하여 진단할 수 있다) 일상에서 복합적인 신체운동이 필요한 활동이 불가능한 사람

장애유형명	분류 기호	장애상태
언어장애	가	· 발성이 불가능하거나 특수한 방법(식도발성, 인공후두기)으로 간단한 대화가 가능한 음성장애 · 말의 흐름에 심한 방해를 받는 말더듬(SSl 97%ile 이상, P-FA 91%ile 이상) · 자음정확도가 30% 미만인 조음장애 · 의미 있는 말을 거의 못하는 표현언어지수가 25미만인 경우로서 지적장애 또는 자폐성 장애로 판정되지 아니하는 경우 · 간단한 말이나 질문도 거의 이해하지 못하는 수용언어지수가 25미만인 경우로서 지적 장애 또는 자폐성장애로 판정되지 아니하는 경우
	나	· 발성(음도, 강도, 음질)이 부분적으로 가능한 음성장애 · 말의 흐름이 방해받는 말더듬(SSl : 아동 41~96%ile, 성인 24~96%ile, P-FA 41~90%ile) · 자음정확도 30-75%정도의 부정확한 말을 사용하는 조음장애 · 매우 제한된 표현만을 할 수 있는 표현언어지수가 25-65인 경우로서 지적장애 또는 자폐성장애로 판정되지 아니하는 경우 · 매우 제한된 이해만을 할 수 있는 수용언어지수가 25-65인 경우로서 지적장애 또는 자폐성장애로 판정되지 아니하는 경우
정신장애	나	· 조현병 또는 뇌의 신경학적 손상으로 인한 기질성 정신장애로 망상, 환청, 사고장애, 기괴한 행동 등의 양성증상 또는 사회적 위축 등의 음성증상이 지속되어 기능 및 능력장애로 인하여 능력장애 측정기준 6항목 중 3항목 이상에서 경미한 도움이 필요한 사람 · 양극성 정동장애(조울증)에 따른 기분 · 의욕 · 행동 및 사고의 장애 등의 증상기가 심하지는 않으나 지속되거나 자주 반복되어 기능 및 능력장애로 인하여 능력장애 측정기준 6항목 중 3항목 이상에서 경미한 도움이 필요한 사람 · 재발성 우울장애로 기분 · 의욕 · 행동 등에 대한 우울 증상기가 심하지는 않으나 지속되거나 자주 반복되는 경우로서 기능 및 능력 장애로 인하여 능력장애 측정기준 항목 중 3항목 이상에서 경미한 도움이 필요한 사람 · 조현정동장애로 장애의 정도가 심하지 않은 장애인의 1호 내지 3호에 준하는 증상이 있는 사람 · 지속적인 치료에도 호전되지 않는 강박장애, 투렛장애(Tourette's disorder) 및 기면증에 따른 기분 · 의욕 · 행동 및 사고장애의 증상이 심하여, 일상생활이나 사회생활에 상당한 제한이 있는 경우로서 기능 및 능력장애로 인하여 능력장애 측정기준 6항목 중 3항목 이상에서 수시로 도움이 필요한 사람
신장장애	다	· 신장을 이식받은 사람
심장장애	다	· 심장을 이식받은 사람 · 폐탄수술을 받은 사람
호흡기장애	다	· 폐를 이식받은 사람 · 늑막루가 있는 사람

장애유형명	분류 기호	장애상태
간장애	다	· 간을 이식받은 사람
안면장애	가	· 노출된 안면부의 75% 이상의 변형이 있는 사람 · 노출된 안면부의 50% 이상의 변형이 있고 코 형태의 2/3 이상이 없어진 사람
	나	· 노출된 안면부의 60% 이상의 변형이 있는 사람 · 코 형태의 2/3 이상이 없어진 사람 · 노출된 안면부의 45% 이상 변형이 있고 코 형태의 1/3 이상이 없어진 사람
	다	· 노출된 안면부의 45% 이상이 변형된 사람 · 코 형태의 1/3 이상이 없어진 사람
장루,요루 장애	가	· 장루와 함께 요루 또는 방광루를 가지고 있는 사람 · 장루 또는 요루를 가지고 있으며, 장피누공, 배뇨기능장애 또는 합병증 중 하나 이상의 증상이 있는 사람
	나	· 장루 또는 요루를 가진 사람 · 방광루를 가지고 있으며, 합병증으로 장피누공이 있는 사람 · 코크파우치, 미트라파노프 수술을 시행한 경우 · 선행성 관장루를 가지고 있고 코크파우치 또는 미트라파노프 수술을 시행한 경우
	다	· 방광루를 가진 사람 · 선행성 관장루를 시행한 경우 · 심각한 배뇨장애가 있는 사람 · 장루를 복원한 후 심각한 배변장애가 있는 사람

장애유형명	분류 기호	장애상태
뇌전증장애	나	· (성인) 만성적인 뇌전증에 대한 적극적인 치료에도 불구하고 월 1회 이상의 중증발작 또는 월 2회 이상의 경증발작이 연 6회 이상 있고, 이로 인하여 협조적인 대인관계가 곤란한 사람 · (소아청소년) 전신발작은 1개월에 1 ~ 3회의 발작이 있는 사람 · (소아청소년) 신체의 손상을 초래할 수 있는 경우로 넘어지면서 머리가 먼저 바닥에 떨어지는 발작(head drop, falling attack)은 6개월에 1 ~ 5회의 발작이 있는 사람 · (소아청소년) 영아연축(Infantile spasm), 레녹스-가스토 증후군(Lennox-Gastaut syndrome) 등과 같은 뇌전증성 뇌병증 (epileptic encephalopathy)은 6개월에 1 ~ 5회의 발작이 있는 사람 · (소아청소년) 근간대성발작(myoclonic seizure)이 중하여(severe) 자주 넘어져 다칠 수 있는 경우(falling attack을 초래하는 경우)는 6개월에 1 ~ 5회의 발작이 있는 사람 · (소아청소년) 부분발작은 1개월에 1 ~ 9회의 발작이 있는 사람
	다	· (성인) 만성적인 뇌전증에 대한 적극적인 치료에도 불구하고 월 1회 이상의 중증발작 또는 월 2회 이상의 경증발작이 연 3회 이상 있고, 이로 인하여 협조적인 대인관계가 곤란한 사람
췌장장애	가	· 혈장포도당 농도가 140mg/dL 이상이면서 이와 동시에 측정한 (1)C-peptide가 0.6ng/ml 미만 또는 (2)단회뇨 C-peptide/creatinine ratio가 0.2nmol/mmol 미만 중 하나에 해당하고, 6개월 이상 다회인슐린주사요법을 받거나 인슐린자동주입기를 사용하는 사람
	다	· 췌장을 이식받은 사람

※ 비고

- 지체장애(팔기능, 다리기능)의 근력등급, 뇌병변장애의 수정바텔지수, 간장애의 만성 간질환 평가척도(Child- Pugh score)는 보건복지부 고시 「장애정도판정기준」의 ‘근력등급표’, ‘뇌병변장애 판정을 위한 수정바텔지수 활용방법 안내’, 간장애의 ‘Child-Pugh 분류법’을 각각 따른다. (이하 이 고시에서 같다.)