

[별표 2]

벗초파리 시스템적 접근법 (systems approach)(제6조제1항제1호 관련)

이 시스템적 접근법은 *Vitis vinifera* 및 *V. vinifera* hybrid에 적용한다.

1. 수확 전 조치

가. 재배지 및 선과장 등록

재배지와 선과장은 매년 검역본부에 등록해야하며 지역본부장 또는 사무소장은 등록된 재배지와 선과장의 호주 수입 요건 충족여부를 모니터링 한다.

나. 참여농가와 선과 전문가 교육

매년 시즌이 시작될 때 지역본부장 또는 사무소장은 벗초파리에 의한 피해를 확인할 수 있도록 참여농가와 선과 전문가를 대상으로 교육을 실시한다.

다. 재배지검역

지역본부장 또는 사무소장은 등록된 재배지에 대해 최소 수확 2주전 부터 수확이 완료될 때까지 식물검역관으로 하여금 매주 재배지검역을 실시하도록 한다. 식물검역관은 아래의 방식에 따라 포도 과실에 대하여 재배지검역을 실시한다.

1) 면적 1ha 미만의 재배지: 20주

2) 면적 1ha 이상의 재배지: 30주

표본의 추출은 8자형으로 무작위로 추출하고 검역결과는 확인이 가능하도록 보관한다. 검역결과 봉지를 씌운 과일에서 벗초파리에 의한 피해가 확인된 재배지는 해당 시즌 호주 수출에서 제외된다.

라. 재배지 모니터링

벗초파리에 대한 모니터링을 통해 재배지 내에 벗초파리를 초기에 감지해내고 방제를 통해 수확시기까지 재배지에서의 벗초파리 밀도가 가능한 낮게 유지되도록 한다. 재배지 내 식초/와인 트랩은 다음 기준

에 맞게 설치되어야 한다.

1) 면적 0.5ha 이하의 재배지: 2개

2) 면적 0.5ha를 초과하는 재배지의 경우 초과 0.5ha 당 추가 트랩 1개씩 설치

예) 재배지 면적 0.5ha_{초과}~1ha_{이하}: 3개, 1ha_{초과}~1.5ha_{이하}: 4개, 1.5ha_{초과}~2ha_{이하}: 5개

최소 수확 4주전에 식초/와인 트랩을 재배지 안에 설치하고 수확이 완료될 때까지 매주 확인해야하며 수확 전 최소한 연속 4회는 확인이 이루어져야한다. 모니터링 결과는 확인이 가능하도록 보관한다.

1) 농약 사용 가능 시기(봉지 씌우기 전): 트랩에서 벼초파리가 검출되면 등록된 농약으로 방제를 실시하여야한다.

2) 농약 사용 불가능 시기(봉지 씌운 후): 매주 트랩을 확인하고 확인 시 트랩에서 검출된 벼초파리 수가 트랩 당 평균 10마리 이상 일 때 해당 참여농가는 당해 시즌 수출에서 제외된다.

마. 농약 사용

포도 재배농민은 봉지 씌우기 전과 벼초파리가 검출될 경우 등록된 농약을 사용하여 방제를 실시하여야 한다.

바. 재배지 위생

벼초파리 밀도를 낮은 수준으로 유지하기 위하여 재배종과 수확 후에도 재배지 내의 상처과나 낙과를 제거한다.

사. 봉지 씌우기

재배지에서는 포도알의 지름이 대략 8~10mm 시기 또는 알숙기 종료 직후에 봉지를 씌워야한다. 어린 포도가 벼초파리에 감염되지 않도록 봉지 씌우기 이전에 약제 살포 등이 이루어져야 하며, 손상된 봉지는 교체한다.

2. 수확 방법

포도송이는 봉지를 씌운 채로 수확하고 선과장에 반입될 때까지 봉지가 제거되어서는 안 된다. 건전한 송이를 골라서 수확한다. 수확 후 선과장으로 이동시 망(구멍 지름 0.98mm 이하)으로 덮어야 한다.

3. 선과장 조치

매 시즌 시작 때 선과장은 청결하고 병해충의 감염이 없는 상태로 유지되어야 하며, 선과중에는 매일 청소하여야 한다. 호주 수출 선과 작업 전에 선과 라인을 청소하여야 한다. 상처과나 선과중에 제거된 포도는 당일 선과 종료 후에 선과장에서 치워야 한다.

가. 선과장 내 트랩

호주 수출 선과작업 중에 선과장 내부에는 최소 4개의 트랩이 설치되어야 하며 매일 확인하여야 한다. 만약 벚초파리가 트랩에서 검출될 경우 해당 로트는 호주 수출이 제외되며, 다음 호주 수출 선과전에 벚초파리가 검출된 선과장 구역은 소독되어야 한다.

나. 선과

등록된 재배지에서 재배되고 상처가 없는 과일만을 선과하여야 한다. 선과중에 상처과와 병해충 감염의 흔적이 있는 포도는 제거하기 전에 10배 확대경으로 벚초파리 감염여부를 확인한다. 벚초파리에 의한 감염으로 확인될 경우 해당 로트는 호주 수출에서 제외된다. 선과장 내부의 온도는 14℃ 이하로 관리하여야 하며, 10~11℃로 유지할 것을 권장한다.

다. 포장

포장 표기사항은 수출검역요령에 따른다. 포장상자에 환기구멍이 있는 경우 벚초파리 성충의 침입을 막기 위해 구멍 지름 0.98mm 이하의 망으로 씌워야 하며, 상자 내부에 비닐포장(구멍 0.98mm 미만)을 하는 경우에는 망을 씌우지 않아도 된다.

라. 보관

호주로 수출될 포도는 교차 감염되지 않도록 구분하여 안전하게 보관하여야 한다.

마. 강화된 식물 검역

수출검역 시 검사 수량(로트나 화물당 600송이 검사) 중 일부 송이(6kg)는 10배 확대경으로 검사하여 벚초파리의 감염여부를 확인한다. 만약 벚초파리가 발견될 경우 해당 화물은 불합격되고 해당 참여농가는 당해시즌 수출에서 제외된다. 호주 측에 동 사실을 통보하고 원인 규명을 실시한다.