

시료의 수거방법 및 시료수거량 기준(제16조제2항 관련)

1. 시료의 수거방법

가. 모든 시료는 소집단(Seed lot)이 편성되어 있어야 하며 소집단별로 대표성이 유지되도록 수거하여야 한다. 시료수거 소집단은 작물, 품종, 필지, 수입업체, 수입일, 포장일자 또는 생산연도 등에 따라 균일성이 유지되도록 편성한다. 다만, 검사공무원이 시료의 원활한 수거를 위하여 소집단 편성의 변경이 필요하다고 판단되는 경우에는 수거대상 시료의 대표성에 영향을 미치지 않는 범위 내에서 소집단 편성의 일부를 변경할 수 있다.

나. 시료는 소집단별로 무작위로 수거하여야 하며, 수거방법은 다음과 같다. 다만, 시료수거 소집단의 양이 소량으로 채취부위별 기준수량의 채취가 곤란한 경우에는 채취부위별 수량을 감하여 채취할 수 있다.

- 1) 산물을 포장, 보관 및 운송하는 과정 중에 수거하는 경우에는 소집단별로 시료수거 총량을 고려하여 대표성을 유지할 수 있도록 부위별로 총 5회 이상 채취하여 혼합한 후 검정시료로 사용한다.
- 2) 포장물을 판매하는 과정 중에 수거하는 경우에는 보관 적재하고 있는 수량을 고려하여 부위별로 균일하게 시료를 채취하여 혼합한 후 검정시료로 사용한다.
- 3) 재배 중인 식물체 또는 기타 생체시료의 경우 검정이 용이한 조건에서, 소집단별로 잎이 5장 이상인 식물체 3주(또는 생체시료 50g)를 5지점에서 대표성이 최대한 유지되도록 부위별로 균등하게 채취하여, 혼합한 후 검정의 시료로 사용한다.

다. 나목에 따라 채취한 시료를 축분할 경우에는 균분기를 사용하여 축분한다. 다만, 균분기가 없을 경우 또는 균분기로 축분할 수 없는 시료에 대하여는 그 보조방법으로 4분법에 따라 축분한다.

- 1) 균분기를 사용한 시료 축분법

가) 시료는 축분 전에 충분히 혼합한다.


나) 균분기를 수평으로 안치한 후 깔때기에 시료를 넣고 개폐기를 일시에 가볍게 완전히 연다.

다) 2분된 시료 중 임의로 그 하나를 선택하여 소요량이 될 때까지 반복하여 축분한다.

2) 4분법(보조방법)

가) 시료는 축분 전에 충분히 혼합한다.

나) 혼합된 시료를 다음 그림과 같이 원형으로 평평히 얹게 펴놓고 종횡으로 선을 그어 4등분 한다.



(4분법 도해)

다) 4등분된 시료는 대각의 부분끼리 모아 2개로 축분한다.

라) 2개로 축분된 시료 중 그 하나를 임의로 택하여 이와 같은 방법으로 소요량이 될 때까지 반복하여 축분한다.

2. 시료수거량

가. 축분한 시료는 검정의뢰를 위한 검정용 1점을 수거함을 원칙으로 하되, 피검사자가 필요하다고 요청하는 경우에는 피검사자용 1점을 추가로 수거할 수 있다.

나. 작물별 소집단 편성을 위한 최대크기와 시료 채취량 기준은 다음 표와 같다. 다만 소집단의 중량·크기, 포장 단량, 검정에 소요되는 시료량 등을 고려하여 가감할 수 있다.

작물	소집단의 최대 크기(Kg)	부위별 채취량(g)	시료채취 부위수	수거량(g)
콩	30,000	200	5	1,000
옥수수	40,000	200	5	1,000
밀	30,000	200	5	1,000
면화	25,000	200	5	1,000
유채	10,000	20	5	100
아마	10,000	30	5	150
식물체	필지 등으로 별도 편성	3주	5(지점)	15(주)
기타작물	소집단 크기 및 수거량(최소 시료 제출량)은 국제종자검정협회 (ISTA) 규정에 따른다			