

[별표 12] 비정상적으로 발현하는 식물체의 이형주 조사

비정상적인 특성 발현은 식물체 일부분에서 나타날 수 있으나 식물체 전체를 통해서 지속적으로 나타나지는 않는다. 이러한 비정상적인 발현의 유전적 원인은 돌연변이, 키메라 및 전이 등을 포함한다.

구 분	발 현 형 태
이형주인 경우	○ 모든 줄기는 빨간색이나 한 개의 줄기가 녹색인 경우 ○ 점이나 반점을 가진 얼룩무늬 품종에서 한 개의 줄기가 녹색인 경우 ○ 식물체 어떤 부위에서 발생할 수 있는 돌연변이와 같은 유전적 원인으로 야기된 비정상적인 발현 ○ 레갈 펠라고늄에서 전면 자주색이 아닌 꽃잎의 빈도가 상당히 다른 식물체
이형주가 아닌 경우	○ 비정상적인 발현의 원인을 제공하는 것이 외부인자인 아래의 경우들은 이형주로 간주되지 않는다. (가) 부위효과 - 다른 광이나 온도에 노출(예, 포장에서 다른 위치에 배치된 경우) 다른 색깔 안토시아닌의 다른 수준 또는 다른 수준의 무늬를 가진 식물체가 생산될 수 있음 - 임성의 변이, 포장의 위치에 따라 pH나 수분함량 또는 화분재배의 경우 화분 간의 차이 (나) 병충해에 감염되어 나타나는 차이 (다) 물리적 손상(환경 및 화학적 적용: 태양, 바람, 강우, 서리, 제초제 접촉) 등 (라) 수분 불량(예: 딸기의 수분불량으로 인한 착과불량) (마) 접목 불친화성 (바) 번식 방법에 따른 영향 ○ 유전적 요인으로 인해 비정상적 발현을 보인 나무에 달린 열매 하나 ○ 출원품종의 종에 속하지 않는 식물체 ○ ‘있다’와 ‘없다’로 표현되는 특성은 이형주로 보기에 충분하지 않으며, 비정상적인 발현의 빈도와 정도를 고려해야 한다. ○ 식물체에서 꽃들은 동일한 색상과 형태를 보이진 않지만 줄무늬의 변이가 모든 식물체에서 일정한 경우 ○ 레갈 펠라고늄에서 전면 자주색이 아닌 꽃잎들이 동일한 빈도로 모든 식물체에서 나타나는 경우 ○ 포복성을 가진 품종내의 일부 줄기는 모든 개체들에서 유사한 빈도로 직립하지만 체세포변이와 같은 유전적인 근거가 없는 경우