

[별표 3]

수출과수원에서의 코드린나방(*Cydia pomonella*) 예찰 및 생과실  
조사(제7조 관련)

1. 예찰활동

- 가. 모든 수출과수원에는 코드린나방의 발생을 예찰하기 위한 트랩 [(E,E)-dodeca-8,10-1-OL lure가 포함된 델타트랩]을 설치하여야 한다.
- 나. 한국 수출용으로 SAG에 등록된 수출과수원 내에는 모든 코드린나방의 기주식물(양벚은 제외)이 제거되어야 한다.
- 다. 예찰활동은 매년 9월 첫째 주부터 양벚 생과실의 수확이 종료될 때까지 실시한다.
- 라. 트랩은 수출과수원별로 1ha 당 2개씩이며 1ha가 커질수록 1을 더한 수의 밀도로 트랩을 설치한다.

| 면 적(ha)    | 트랩 수 |
|------------|------|
| 1ha 이하     | 2    |
| 1 ~ 1.99ha | 3    |
| 2 ~ 2.99ha | 4    |
| 3 ~ 3.99ha | 5    |
| N ~ N.99ha | N+2  |

- 1) 수출과수원이 블록(block)이나 섹터(sector)로 나누어지는 경우, 다음과 같이 예찰을 이행할 수 있다.
- 가) 블록이나 섹터 사이의 거리가 100미터를 초과한 경우, 다른 구성단위로 간주하여야 하며 트랩 설치 수는 각 구성단위의 면적에 따라 결정해야 한다.
- 나) 블록이나 섹터 사이의 거리가 100미터 이하인 경우, 하나의 구성단위로 간주하여야 하며 트랩 설치 수는 전체 면적에 따라 결정해야 한다.
- 마. 트랩조사는 매주 실시하여야 하며, 코드린나방용 페르몬 미끼(pheromone lure)는 30일마다 교체되어야 한다.
- 바. SAG는 1주에 트랩 당 평균 5마리를 초과하여 코드린나방이 포획된 과수원(하나의 과수원이 한 개 이상의 블록이나 섹터로 구성되는 경

우, "구성단위별")은 당해 수출 시즌의 나머지 기간 동안 한국 수출 과수원에서 제외시켜야 한다. SAG는 평균 5마리가 초과한 과수원명과 등록번호를 APQA에 통보하여야 한다.

○ 트랩 당 평균 마리 수 = 과수원별 주간 포획된 코드린나방 총수 ÷ 트랩 수

사. SAG는 예찰프로그램을 감독하고 코드린나방 예찰 기록을 보관하여야 하며, APQA가 요구하는 경우에 예찰 기록을 제공하여야 한다.

## 2. 생과실 조사

가. 수출과수원별로 코드린나방의 기생여부 확인을 위해 생과실 조사를 실시해야 한다.

나. 수확 전 수출과수원 또는 선과 전 수출선과장의 별도 공간에서 표본 추출된 600개의 양벧 생과실을 절개하여 코드린나방의 기생여부를 조사해야 한다.

다. 표본 추출된 양벧 생과실에서 코드린나방(유충 등 미성숙된 것)이 검출되는 경우, 해당 과수원(하나의 과수원이 한 개 이상의 블록이나 섹터로 구성되는 경우 "구성단위별")은 당해 시즌의 나머지 기간 동안 대한민국 수출을 중단해야 한다. SAG는 코드린나방이 검출된 수출과수원명과 등록번호를 APQA에 통보하여야 한다.

라. SAG는 생과실 조사 프로그램을 감독하고 생과실 조사 기록을 보관하여야 하며, APQA가 요구하는 경우에 생과실 조사 기록을 제공하여야 한다.