

[별표 7]

소독시험 자료 검토 기준(제37조제3항 관련)

1. 해충 감수성 시험

- 1.1. 대상해충의 태별 감수성이 평가되어 약제 등 내성이 강한 태가 확인되어야 한다.
- 1.2. 제1.1항의 내성이 강한 태에 대하여 살충농도 LC_{99} 값, LT_{99} 값, LCT_{99} 값, ED_{99} 값 또는 LD_{99} 값을 통계적으로 산출되어야 한다. 다만, 태별 감수성 평가가 어려운 해충의 경우는 혼합태의 살충농도로 대체될 수 있다.

2. 수착 및 침투성 시험

- 2.1. 용적율별로 가스의 수착정도를 확인할 수 있어야 하며, 수착율이 반영되어 소독약량 등 소독처리기준이 설정되어야 한다. 또한, 다양한 온도별로 소독처리기준을 설정할 경우는 온도별 수착 정도가 확인될 수 있어야 한다.
- 2.2. 훈증처리 시간이 2~3시간인 경우는 15~20분정도, 24~48시간인 경우는 2시간 정도 지난 후에는 가스가 피훈증물 내부에 균일하게 침투되어야 한다.

3. 식물체 영향 평가시험

- 3.1. 소독처리후 식물체에 대한 약해 등 부정적 영향 정도를 정도가 커지는 순서로 0부터 5까지로 구분하였을 때 부정적 영향의 정도가 1이하 이어야 한다.
- 3.2. 메틸브로마이드 대체 소독방법인 경우 3.1항의 약해기준을 초과하더라도 메틸브로마이드 처리에 비하여 약해 등 부정적 영향이 동등하거나 적을

때는 검토기준에 적합한 것으로 간주한다.

4. 현장 적용 시험

4.1. 현장 적용 시험에 사용된 해충은 가장 내성이 강한 태(1.2항에 따른 태 구별이 어려운 경우 혼합태)로 2회 반복하여 총 1,000마리 이상이어야 하며, 완전 사멸되어야 한다. 다만, 하늘소류와 같이 공시충 확보에 과도한 예산이 소요되는 등 확보가 어렵다고 인정되는 경우 공시충 수가 500마리 이상으로 할 수 있다.

4.2. 메틸브로마이드 대체 소독방법인 경우 4.1항의 완전 사멸조건을 미달한다 하더라도, 시험 등의 방법으로 메틸브로마이드 처리기준과 비교하여 살충 수준이 동등하거나 높을 때는 검토기준에 적합한 것으로 간주한다.