

[별표 2]

한국 수출을 위한 특별위험관리병해충의 예찰 및 방제 방법(제7조 관련)

1. 수출 과수원(블록)은 개화기부터 수확 완료 시까지 매주 1회 예찰을 실시한다.
2. 예찰 대상 선정 및 조사 방법은 다음과 같다.
 - 가. 블록 면적 1ha당 블루베리나무 10그루이상을 선정하되 한 블록에 최소 20그루를 조사하도록 선정(가장자리 열을 제외하고 각 열의 나무를 지그재그 방식으로 선정)
 - * 예시) 한 수출 과수원(블록)이 1ha 면적의 블록 하나만으로 구성된 경우 조사 대상으로 20그루 선정
 - 나. 선정된 나무 1그루당 조사할 나뭇가지 5개를 무작위로 선정
 - 다. 선정된 나뭇가지마다 가지 전체(잎, 꽃, 과실 포함)에 대하여 다음을 육안검사
 - 1) 진균: *Colletotrichum* spp. 병징 유무
 - 2) 잎말이나방류: 알, 유충, 성충 발생 여부
 - 라. 나뭇가지 5개 중 1개는 털어잡기법(beatting)을 활용하여 흰색판(가로 50cm × 70cm 이상) 위에서 잎말이나방류 집중조사
3. 예찰 결과 다음 중 어느 하나에 해당하는 블록은 화학적 방제조치를 실시하여야 한다.
 - 가. 진균: 블록당 예찰조사한 총 나뭇가지 개수 중 *Colletotrichum* spp. 의심 병징이 나타난 나뭇가지의 개수가 4%* 이상
 - 나. 잎말이나방류: 블록당 예찰조사한 총 나뭇가지 개수 중 알, 유충, 성충이 발생한 나뭇가지의 개수가 2%* 이상
 - * 예시) 한 블록의 면적이 2ha인 경우 방제조치기준: (2 × 10그루) × 나뭇가지 5개 × 4% 또는 2%
4. 다음 사항 중 어느 하나에 해당하는 수출 과수원은 당해 연도 수출시점의 나머지 기간동안 수출을 중단하여야 한다. 다만, 수출 과수원이 블록별로 MPI에 등록하여 관리한 경우에는 블록별로 수출 중단 조치할 수 있다.
 - 가. 첫 수확을 시작하기 전 8주 동안 방제조치 기준에 해당하는 결과가 연속하여 4회 이상 발생한 경우
 - 나. 예찰결과 첫 수확 직전 및 수확 중 방제조치 기준에 해당하는 결과가

발생한 경우

다. 방제조치 기준에 해당함에도 불구하고 기타 사유로인해 방제 조치가 불가능한 경우

5. 수출 과수원(블록)은 *Colletotrichum* spp.에 대하여 예찰결과와 관계 없이 개화기와 착과기 사이의 취약한 기간 동안에 2회 이상 화학적 방제를 실시하여야 한다.

6. 수출 과수원(블록)은 가지치기와 같은 필요한 조치를 취하고, *Colletotrichum* spp.관리를 위하여 화학적 방제(예: 수확 후 농약 살포)를 실시하여야 한다.

7. 수출 과수원(블록)은 잎말이나방류 3종에 대하여 개화기부터 수확 완료 시까지 교미교란제 또는 성페로몬 트랩을 설치하여야 한다.

가. 교미교란제는 Aliphatic acetates 등 성분이 포함되어야 하며 1ha당 100개 이상 설치하여야 한다.

나. 성페로몬 트랩은 2ha당 1개 이상 설치하여야 하며 유인제는 6주마다 교체하여야 한다.