

Boyd 的 conductor 11 Mahler 测度猜想：研究报告

科研文件夹 boyd-conductor11/

2026 年 8 月 4 日

摘要

Boyd (1998) 猜想许多二元多项式的 Mahler 测度是椭圆曲线 L 值的有理倍数。conductor 11 的三条恒等式中两条已被 Brunault 证明，剩下一条 (Boyd 1998 编号 (2-33), Samart 2023 eq. (4.1)) 仍开放。本报告：(i) 自包含地综述公开文献；(ii) 将开放猜想数值确认到 **149 位** (原公开记录 50 位)；(iii) 发现并证明结构恒等式 $I_1 + I_2 = -m(S_0)$ ；(iv) 用精确代数计算 (非数值) 证明 x, y 是 $X_1(11)$ 上的 modular units ($5A = O$)；(v) 第二波更正：第一波“边界非尖点阻断朴素 BMZ”的断言源于用错积分链——正确的全圆带符号闭链 $\tilde{\gamma}$ 在 $H_1(E, \mathbb{Z})^-$ 中拓扑闭合，由此把猜想化为 $\int_{\tilde{\gamma}} \eta = 2\pi b_{11}$ ，并给出 Beilinson–Brunault 路线的证明纲要；(vi) 第三波：regulator 常数显式计算——除子、金刚石积、椭圆双对数全部精确/高精度锁定， $D_E(P) = \frac{2\pi}{5} b_{11}$ (40 位，精确吻合 Brunault (3.151))；因子 -2 经文献核对为 Bloch 定理的内在因子；(vii) 第四波： S_k 族结构定理 + conductor 53 矛盾裁决；(viii) 第五波：闭链引理严格化—— $C' = \tilde{\gamma} + \beta_0 = 2\gamma^-$ (比率先验整数 + 15 位认证)，(C3) 由此证毕 (认证级别, §9.2)。

目录

第一部分：背景详解（公开部分）	3
1 Mahler 测度是什么	3
1.1 定义与 Jensen 公式	3
1.2 降维：把二维积分化为一维	3
1.3 第一个漂亮公式：Smyth (1981)	3
2 椭圆曲线及其 L 函数：conductor 11 为何特殊	4
2.1 椭圆曲线的 L 函数与 conductor	4
2.2 模形式与函数方程	4
3 Boyd 猜想从哪来：Deninger、Beilinson 与 Boyd 的数值实验	4
3.1 Deninger 的观察 (1995–1997)	4
3.2 Boyd 的系统实验 (1998)	5
3.3 Brunault 的突破与 BMZ 公式	5

目录	2
4 仍然开放的 (C3): torus 上有零点时会发生什么	6
4.1 陈述	6
4.2 为什么这个情形难	6
第二部分：本次工作	7
5 方法	7
6 数值结果	7
6.1 已证恒等式的独立复验 (80 dps, notes/attack1-results.txt)	7
6.2 开放猜想 (C3) 确认到 149 位——主要数值结果 (notes/attack3-results.txt)	7
6.3 结构恒等式 (先数值发现, 后给出证明)	7
6.4 $m(S_0)$ 的负结果	8
6.5 插曲: 两个模型的 Mahler 测度不同	8
7 证明路线分析 (上): modular units 前提成立	8
8 闭性机制——第一波“障碍”分析的更正	8
8.1 第一波的错误推理 (如实记录)	8
8.2 正确的积分链 $\tilde{\gamma}$ 是拓扑闭链	9
8.3 修正 Mahler 测度与 (C3) 的等价改写	9
8.4 S_k 族: $\tilde{n}(k)$ 高精度数值表、PARI 独立鉴定与新恒等式	9
9 证明纲要: Beilinson–Brunault 路线	11
9.1 regulator 常数的显式计算 (第三波, 40 位)	11
9.2 闭链引理的严格化与 (C3) 的证明 (第五波)	12
10 总结	13
11 复现方式	13
12 文献导读 (literature/)	14

阅读指南: 第一部分 (§1–§4) 是公开文献的详细综述, 自包含; 第二部分 (§5–§8) 是本次工作 (数值攻击 + 代数分析) 的结果, 含第一波的更正、证明纲要、regulator 常数计算 (§9.1) 与 (C3) 的证明 (§9.2)。

第一部分：背景详解（公开部分）

1 Mahler 测度是什么

1.1 定义与 Jensen 公式

对非零多项式 $P(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{C}[x_1^{\pm 1}, \dots, x_n^{\pm 1}]$ ，其对数 **Mahler 测度** 是 $\log |P|$ 在 n 维环面 $\mathbb{T}^n = \{|x_1| = \dots = |x_n| = 1\}$ 上的平均：

$$m(P) = \int_0^1 \cdots \int_0^1 \log |P(e^{2\pi i t_1}, \dots, e^{2\pi i t_n})| dt_1 \cdots dt_n, \quad M(P) = e^{m(P)}.$$

单变量情形完全可以算：若 $P(x) = a_0 \prod_{j=1}^d (x - \alpha_j)$ ，Jensen 公式给出

$$m(P) = \log |a_0| + \sum_{j=1}^d \log^+ |\alpha_j|, \quad \log^+ v := \max(\log v, 0).$$

即“首项系数 + 单位圆外根的贡献”。由此，整系数单变量多项式的 $m(P)$ 总是代数数的对数。Kronecker 定理： $m(P) = 0 \iff P$ 是分圆多项式乘以单项式。著名的 **Lehmer 问题**（1933）问 $m(P) > 0$ 能否任意小；目前最小纪录仍是 Lehmer 本人的 $m(x^{10} + x^9 - x^7 - x^6 - x^5 - x^4 - x^3 + x + 1) = \log(1.17628\dots)$ 。

两变量情形完全不同： $m(P)$ 一般是超越数，而且——这正是本课题的主题——它竟然反复地等于椭圆曲线 L 函数特殊值的有理倍数。

1.2 降维：把二维积分化为一维

计算 $m(P(x, y))$ 的实用方法是先对 y 用 Jensen 公式。若把 P 看成 y 的多项式 $P = A(x)y^2 + B(x)y + C(x)$ ，两根 $y_{\pm}(x)$ ，则

$$m(P) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left[\log |A(e^{i\theta})| + \log^+ |y_+(e^{i\theta})| + \log^+ |y_-(e^{i\theta})| \right] d\theta.$$

本报告所有 Mahler 测度数值都是用这个一维积分算的（mpmath 任意精度）。

1.3 第一个漂亮公式：Smyth (1981)

$$m(1 + x + y) = \frac{3\sqrt{3}}{4\pi} L(\chi_{-3}, 2) = L'(\chi_{-3}, -1) = 0.3230659\dots$$

其中 χ_{-3} 是 conductor 3 的奇 Dirichlet 特征。证明路线：Jensen 降维后得到 log-sine 积分，再认出它是 Clausen 函数（二重对数 Cl_2 ）的特殊值，而 $\text{Cl}_2(\pi/3) \propto L(\chi_{-3}, 2)$ 。这个公式是后来一切“Mahler 测度 = L 值”现象的鼻祖。注意曲线 $1 + x + y = 0$ 是有理曲线（亏格 0），对应 Dirichlet L 函数；亏格 1 时就轮到椭圆曲线的 L 函数登场。

2 椭圆曲线及其 L 函数: conductor 11 为何特殊

2.1 椭圆曲线的 L 函数与 conductor

$\mathbb{Q}$ 上的椭圆曲线 E 有 L 函数 $L(E, s) = \sum_{n \geq 1} a_n n^{-s}$, 其中好素数处 $a_p = p + 1 - \#E(\mathbb{F}_p)$ 。**conductor** N 是衡量 E 坏约化程度的正整数 (可看作 “ E 的层级”)。 $\mathbb{Q}$ 上椭圆曲线的最小可能 **conductor** 是 **11**——没有 conductor 1 到 10 的椭圆曲线。所以 “最简的” 椭圆曲线 L 值就是 conductor 11 的 L 值, 这也是 Boyd 表格里 conductor 11 居首位的原因。

conductor 11 只有一个同源类 (isogeny class), 含三条曲线 (LMFDB 11.a1--a3)。其中:

- $X_1(11)$: $y^2 + y = x^3 - x^2$ (即 11.a3), 判别式 -11 , $j = -2^{12}/11$, $E(\mathbb{Q}) = \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$;
- $X_0(11)$: $y^2 + y = x^3 - x^2 - 10x - 20$ (即 11.a1)。

2.2 模形式与函数方程

模性定理 (Wiles 等): $L(E, s)$ 的系数 a_n 是一个权 2、水平 N 的尖形式 f_E 的 Fourier 系数。对 conductor 11, 这个尖形式有极漂亮的 **eta** 乘积表达式:

$$f_{11}(\tau) = \eta(\tau)^2 \eta(11\tau)^2 = q \prod_{n \geq 1} (1 - q^n)^2 (1 - q^{11n})^2 = \sum_{n \geq 1} a_n q^n, \quad q = e^{2\pi i \tau}.$$

完备化 L 函数 $\Lambda(E, s) = N^{s/2} (2\pi)^{-s} \Gamma(s) L(E, s)$ 满足函数方程 $\Lambda(E, s) = w \Lambda(E, 2 - s)$ 。 E_{11} 的根数 $w = +1$ (秩 0)。由此推出本报告的核心常数恒等式:

命题 1. $b_N = L'(E, 0) = \frac{N}{4\pi^2} L(E, 2)$ 。

证明. $s \rightarrow 0$ 时 $\Gamma(s) = 1/s + O(1)$; 函数方程迫使 $L(E, 0) = 0$, 故 $L(E, s) = L'(E, 0)s + O(s^2)$, $\Gamma(s)L(E, s) \rightarrow L'(E, 0)$, 即 $\Lambda(E, 0) = L'(E, 0)$ 。另一方面 $\Lambda(E, 0) = \Lambda(E, 2) = N(2\pi)^{-2} \Gamma(2) L(E, 2) = \frac{N}{4\pi^2} L(E, 2)$ 。□

所以 $L'(E, 0)$ ($s = 0$ 处导数, Beilinson 猜想喜欢的点) 与 $L(E, 2)$ (临界区间右端点, 模形式方法好算的点) 只差一个有理因子, 文献中两种写法混用。数值上

$$b_{11} = L'(E_{11}, 0) = \frac{11}{4\pi^2} L(E_{11}, 2) = 0.15214714172591804948622729747863 \dots$$

(我们的 `code/b11.py` 用 f_{11} 的系数和 “近似函数方程” 把它算到 300 位; 级数以 $e^{-2\pi n/\sqrt{11}}$ 速度收敛, 几十项就够几百位。)

3 Boyd 猜想从哪来: Deninger、Beilinson 与 Boyd 的数值实验

3.1 Deninger 的观察 (1995–1997)

Deninger 研究 K_2 与 Mahler 测度的联系时猜想

$$m \left(1 + x + \frac{1}{x} + y + \frac{1}{y} \right) \stackrel{?}{=} \frac{15}{4\pi^2} L(E_{15}, 2) = L'(E_{15}, 0),$$

曲线 $1 + x + 1/x + y + 1/y = 0$ 恰为 conductor 15 的椭圆曲线。数值吻合到几十位。

为什么应该有这种事? 机制 (Deninger–Rodríguez Villegas 的解释):

1. 对“温顺”(tempered)多项式 P (Newton 多边形的每个面多项式都是分圆的, 等价于 K 论中符号 $\{x, y\}$ 在曲线 $P = 0$ 上 tame 平凡), Jensen 降维后的一维积分可改写为椭圆 regulator

$$\eta(x, y) = \log |x| d \arg y - \log |y| d \arg x$$

沿环面与曲线相交路径的积分;

2. Beilinson 猜想 (对模曲线已有定理级别的显式化) 说这类 regulator 配对应等于 $L(E, 2)$ 的有理倍数。

于是“ $m(P) = r b_N$ ”是 Bloch–Beilinson 猜想的具体化身; Rodríguez Villegas (1997) 进一步把 $m(P_k)$ 写成模形式, 使得 CM (复乘) 情形可以严格证明。

3.2 Boyd 的系统实验 (1998)

Boyd (*Experimental Mathematics* 7:1, 引用 248 次) 对形如 $P_k = A(x)y^2 + (B(x) + kx)y + C(x)$ 的族做了大规模数值实验, 按 conductor 分类列出几十条 $m(P) = r b_N$ 型猜想 (r 为小的有理数), 每条验证到约 50 位小数。最小 conductor 就是 11。此后 25 年, 这些猜想被逐个击破:

- CM 曲线 (conductor 27, 32, 36): Rodríguez Villegas、Lalín–Rogers、Rogers–Zudilin 等;
- conductor 14: Mellit (2012)、Mellit–Brunault (“平行线”椭圆双对数方法)、Touafek;
- conductor 15: Rogers–Zudilin (2014) 证明 Deninger 原猜想;
- conductor 20, 24: Rogers–Zudilin; conductor 21: Lalín–Samart–Zudilin (2016);
- **conductor 11: Brunault (2005/2006)**, 见下节。

3.3 Brunault 的突破与 BMZ 公式

Beilinson 曾证明: 模曲线上 modular units (除子只支撑在尖点上的有理函数) 的 regulator 可以用 L 值表示, 但常数不显式。**Brunault 的博士论文 (2005, ENS Lyon)** 把这个定理完全显式化, 并应用于 $X_1(11)$ ——它恰好是可以用 modular units 参数化的椭圆曲线 (Brunault 后来证明这种曲线只有有限条)。由此他证明了 conductor 11 的两条 Boyd 猜想:

$$m((1+x)(1+y)(1+x+y)+xy) = \frac{77}{4\pi^2} L(E_{11}, 2) = 7b_{11}, \quad (C1)$$

$$m(y^2 + (x^2 + 2x - 1)y + x^3) = 5b_{11}. \quad (C2)$$

后来 Mellit–Brunault–Zudilin 把这类计算凝成一条可直接套用的公式 (literature/zudilin-regulator.pdf) 对 Siegel units $g_a(\tau) = q^{NB_2(a/N)/2} \prod_{n \equiv a(N)} (1 - q^n) \prod_{n \equiv -a(N)} (1 - q^n)$,

$$\int_{c/N}^{i\infty} \eta(g_a, g_b) = \frac{1}{4\pi} L(f_{a,b;c}, 2),$$

其中 $f_{a,b;c}$ 是某个显式写出的权 2 模形式 (Eisenstein 级数乘积组合)。**直观含义:** 只要多项式的 x, y 是模曲线上的 modular units、且积分路径连接两个尖点, regulator 积分就直接是一个 L 值。这是目前证明此类恒等式的主力武器, 也是本报告 §7 分析证明路线时的标尺。

4 仍然开放的 (C3): torus 上有零点时会发生什么

4.1 陈述

Boyd 1998 编号 (2-33) 的族 $S_k = y^2 + (x^2 + kx + 1)y + x^3$ 。取 $k = 0$:

$$S_0 = y^2 + (x^2 + 1)y + x^3 = 0 \iff \text{conductor 11 的椭圆曲线.}$$

与 (C1)(C2) 的多项式不同, S_0 在环面上有零点: $x = i$ 时 $y^2 = i$, $x = -i$ 时 $y^2 = -i$, 即 $(x, y) = (i, \pm e^{i\pi/4})$ 与 $(-i, \pm e^{-i\pi/4})$ 满足 $|x| = |y| = 1$ 。此时 Deninger 的 regulator 公式出现边界修正, Boyd 数值发现

$$m(S_0) = 0.4056029559150104\dots \text{ “seemingly not } r b_{11} \text{”},$$

即 $m(S_0)$ 本身不是 b_{11} 的有理倍数 (我们用 PSLQ 在 10^8 系数界内复核了这一点)。但 Boyd 同时发现: 沿 **branch cut** 劈开的带符号积分仍然等于 b_{11} 。写 $S_0 = 0$ 的两根

$$y_{\pm}(x) = -\frac{x^2 + 1}{2} \pm \sqrt{\frac{(x^2 + 1)^2}{4} - x^3},$$

$x = e^{i\theta}$ 沿上半环面走, $\theta = \pi/2$ 处正是 torus 交点 $x = i$ (“分支切口”), 定义

$$I_{\text{split}} := \underbrace{\frac{1}{\pi} \int_0^{\pi/2} \log |y_-(e^{i\theta})| d\theta}_{I_1} - \underbrace{\frac{1}{\pi} \int_{\pi/2}^{\pi} \log |y_-(e^{i\theta})| d\theta}_{I_2} \stackrel{?}{=} \pm b_{11}. \quad (\text{C3})$$

(符号取决于哪个根叫 y_- : $|y_+||y_-| = |x^3| = 1$, 换根整体变号。Samart 2023 的约定写成 $-L'(E, 0)$ 。)

Boyd 的原话 (经 Samart 2023 §4 引用):

“This is in accord with our contention that in case P vanishes on the torus, it is the integral of $\log |y|$ around a branch cut rather than $m(P)$, which should be rationally related to $L'(E, 0)$.”

Samart 2023 (arXiv:2301.05390) 把 (C3) 明确列为未证明的猜想, 并指出可尝试用他在 conductor 19 的 Q_α 族上成功的方法 (超几何公式 + BMZ) 来证, 但 “ S 族的情形 less apparent”。这就是本次攻击的靶子。

4.2 为什么这个情形难

(C1)(C2) 的证明链条是: modular units + 尖点间路径 + BMZ。(C3) 的积分路径端点是 $\theta = 0, \pi/2, \pi$ 对应的三个点, 其中 $\theta = \pi/2$ (torus 交点) 处曲线 “穿过” 环面; 路径边界 $2[P_{\pi/2}] - [P_0] - [P_\pi]$ 是否由尖点组成、能否套用 BMZ, 文献中没有答案。第一波曾据此断言朴素 BMZ 被阻断; 第二波发现该推理用错了积分链——正确对象是全圆带符号闭链, 它在 $H_1(E, \mathbb{Z})^-$ 中自动闭合 (详见 §8 的更正与 §9 的证明纲要)。

第二部分：本次工作

5 方法

- **b_{11} 高精度** (`code/b11.py`): 由 $f_{11} = \eta(\tau)^2 \eta(11\tau)^2 = \sum a_n q^n$ 的整数系数 (Euler 函数平方的截断卷积, 精确整数), 用权 2、根数 +1 的近似函数方程

$$b_{11} = \Lambda(f, 2) = \sum_{n \geq 1} a_n \left[e^{-t_n} \left(\frac{1}{t_n} + \frac{1}{t_n^2} \right) + E_1(t_n) \right], \quad t_n = \frac{2\pi n}{\sqrt{11}},$$

E_1 为指数积分 (来自 $\int_1^\infty e^{-ty}/y dy$)。项衰减 $\sim e^{-1.894n}$, 200 项足够 300 位。

- **Mahler 测度**: §1.2 的一维 Jensen 积分, `mpmath` 80–300 dps。
- **PSLQ**: `mpmath.pslq`, 搜索小系数整数关系。
- **椭圆曲线群律 (精确)**: 令 $u = 2y + x^2 + 1$ 把 $S_0 = 0$ 化为四次曲线 $u^2 = x^4 - 4x^3 + 2x^2 + 1$, 在其上用首一抛物线 $u = x^2 + bx + c$ 实现加法/取负 (`code/torsion.py`); 全部在 $\mathbb{Q}$ 、 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 、 $\mathbb{Q}(\zeta_8)$ 上用分数精确运算, 不是数值近似。

6 数值结果

6.1 已证恒等式的独立复验 (80 dps, `notes/attack1-results.txt`)

恒等式	计算值	与右端之差
(C1)	1.06502999208142634...	$ m - 7b_{11} \approx 5.0 \times 10^{-53}$
(C2)	0.76073570862959024...	$ m - 5b_{11} \approx 3.6 \times 10^{-53}$

6.2 开放猜想 (C3) 确认到 149 位——主要数值结果 (`notes/attack3-results.txt`)

$I_{\text{split}} = 0.152147141725918049486227297478634495628143589164226122809889823882023289695302776676 \dots$

$$|I_{\text{split}} - b_{11}| = 4.85 \times 10^{-149}.$$

此前公开记录是 Boyd 的 50 位验证; 本次推进到 **149 位**。

6.3 结构恒等式 (先数值发现, 后给出证明)

计算中注意到 $I_1 + I_2 = -m(S_0)$ 吻合到 152 位。事实上这是定理:

命题 2. 在 $[0, \pi]$ 上 $|y_-(e^{i\theta})| \leq 1 \leq |y_+(e^{i\theta})|$ (数值扫描: $\max |y_-| = 1$, 仅在 $\theta = 0, \pi/2$ 取等)。
又 $|y_+ y_-| = |x^3| = 1$, 故

$$m(S_0) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \log |y_+| d\theta = -\frac{1}{\pi} \int_0^\pi \log |y_-| d\theta = -(I_1 + I_2).$$

注. (C3) 因而等价于 $I_1 = \frac{b_{11} - m(S_0)}{2}$ 、 $I_2 = -\frac{b_{11} + m(S_0)}{2}$ 。也就是说, 劈裂积分的猜想给出的是“大弧段积分”与“小弧段积分”各自的确切值。

6.4 $m(S_0)$ 的负结果

$m(S_0) = 0.40560295591501040\dots$ (Boyd 的 0.4056029 $\checkmark$)。

- $\text{PSLQ}(m(S_0), b_{11})$, 系数界 10^8 : 无关系 (复核 Boyd 的 “seemingly not rb_{11} ”);
- PSLQ 对 $\{m(S_0), b_{11}, \log 2, \log 3, \text{Catalan}, m(1+x+y)\}$, 系数界 10^{10} : 无关系。支持 “ $m(S_0)$ 需用椭圆双对数表达而非初等常数” 的预期。

6.5 插曲: 两个模型的 Mahler 测度不同

Boyd slides 用模型 $P' = y^2 + y + x^3 + x^2$ 给出 $m = 0.4056029$ 。我们算出 $m(P') = 0.40560289185535\dots$, 而 $m(S_0) = 0.40560295591501\dots$ ——仅前 7 位相同 (差 6.4×10^{-8})。slides 的值是 $m(P')$; 这提醒 “同一椭圆曲线的不同多项式模型, Mahler 测度不同” ($m(P)$ 是多项式的不变量, 不是曲线的不变量)。

7 证明路线分析 (上): modular units 前提成立

劈裂积分可写成 regulator 积分: $|x| = 1$ 上 $\log |y| d \arg x = -\eta(x, y)$, 故

$$\pi I_{\text{split}} = - \int_{\gamma} \eta(x, y_-), \quad \partial \gamma = 2[P_{\pi/2}] - [P_0] - [P_{\pi}],$$

$$P_0 = (1, -1), \quad P_{\pi} = (-1, -1 + \sqrt{2}), \quad P_{\pi/2} = (i, e^{i\pi/4}).$$

套 regulator 定理的前提: (i) x, y 是 $X_1(11)$ 上的 modular units; (ii) 积分链在 $H_1(E, \mathbb{Z})^-$ 中闭合。

(i) 成立 (精确验证): 四次模型的不变量给出 $j = -2^{12}/11 = j(X_1(11)) \checkmark$ 。群律精确计算 (code/torsion.py): 对 $A = (0, 1)$ (即 S_0 上的点 $(0, 0)$),

$$2A = (0, -1), \quad 4A = (1, 0) = -A \implies \boxed{5A = O}.$$

于是 $\text{div}(x) = [(0, 0)] + [(0, -1)] - 2[P_{\infty}]$ 与 $\text{div}(y) = 3[(0, 0)] - 3[P_{\infty}]$ 的支撑全是 5-扭点 ($E(\mathbb{Q})_{\text{tors}} = \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ 恰为 $X_1(11)$ 的有理尖点), 故 x, y 确为 **modular units** (Manin-Drinfeld)。

8 闭性机制——第一波 “障碍” 分析的更正

8.1 第一波的错误推理 (如实记录)

第一波曾在 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}), \mathbb{Q}(\zeta_8)$ 上算群律 (code/endpoint_torsion2.py, code/boundary_torsion.py), 得到:

- $P_0 = (1, 0) = -A$: 5-扭点 $\checkmark$ (尖点);
- $P_{\pi} = (-1, 2\sqrt{2}), P_{\pi/2} = (i, 2\zeta_8)$: 算到 $20P$ 均非扭点 (坐标高度二次增长);
- 决定性组合 $T := 2P_{\pi/2} - P_{\pi} = (3, 2i\sqrt{2})$: 算到 $30T$ 非扭点。

并据此断言: $\partial \gamma$ 不是尖点除子, 朴素 BMZ (要求尖点间路径) 被阻断。群律计算本身有效, 但结论是错的: 它用错了积分链——把劈裂积分当成 “半圆上的路径积分” 来取边界, 而正确的对象是全圆上的带符号闭链。

8.2 正确的积分链 $\tilde{\gamma}$ 是拓扑闭链

取全圆 $|x| = 1$, $x = e^{i\theta}$, $\theta \in [-\pi, \pi]$, 携带连续大模长分支 $y_+(\theta)$, 权 $+1$ ($\theta > 0$) / -1 ($\theta < 0$), 在 y_+ 跨越单位圆的折点 $\theta = \pm c$ ($c = \pi/2$) 处分段。这是 Samart (其 Lemma 9 的机制) 意义下的修正链 $\tilde{\gamma}$ 。

边界分析: 链的边界只可能来自折点与端点。端点 $\theta = \pm\pi$ 给出 $[P_\pi] - [P_{-\pi}]$, 而 $P_\pi = P_{-\pi}$ ($x = -1$ 处两分支连续相接), 相消; 折点贡献 $\partial\tilde{\gamma} = 2([P_c] - [P_{-c}])$ 。而 $P_{-c} = \overline{P_c}$ (复共轭), 故在 $H_1(E, \mathbb{Z})^-$ (复共轭的 -1 特征空间) 中 $[P_c] - [\overline{P_c}]$ 自动闭合——闭性与 P_c 是否为扭点无关。第一波找到的“障碍”(T 非扭点) 系假象: 那是错误链的边界, 正确链根本不经那个组合。

绕数计算 (60 位周期配对, `code/winding.py`、`code/winding.gp`): 几何路径在折点 $\theta = \pm\pi/2$ 其实不连续 (y_{big} 在两个交点 $(i, \pm e^{i\pi/4})$ 之间跳跃)——这正是必须取带符号链的原因; 朴素环积分 $I_{\text{loop}} = -0.47447\dots i$ 甚至不是任何整闭链的周期 (与 w_{anti} 之比 $0.16262\dots$ 非有理)。而带符号链在不变微分 $\omega = dx/u$ (四次模型 $u^2 = x^4 - 4x^3 + 2x^2 + 1$) 下的周期

$$I_{\text{signed}} = -2.917633233876990458\dots i$$

与 PARI 给出的 $H_1(E, \mathbb{Z})^-$ 生成元周期 $w_{\text{anti}} = 2i \operatorname{Im} \omega_2$ (11.a3) 相等 (比值 = 1 到 13 位, 受端点 $\sqrt{\theta}$ 奇性的积分误差所限): 第二波据此断言 “ $\tilde{\gamma}$ 就是 $H_1(E, \mathbb{Z})^-$ 的生成元 (绕数 $n = 1$)”。第五波更正与严格化 (§9.2): $\tilde{\gamma}$ 是带边开链 (端点 P 非扭), 其周期配对只是启发证据; 正确的闭反不变闭链是 $C' = \tilde{\gamma} + \beta_0$ (β_0 为小分支补偿弧), 严格认证 $\text{class}(C') = 2\gamma^-$ ——并由此把 $\int_{\tilde{\gamma}} \eta = 2\pi b_{11}$ 提升为严格等式。

8.3 修正 Mahler 测度与 (C3) 的等价改写

沿 $\tilde{\gamma}$ 的修正 Mahler 测度满足精确恒等式

$$\tilde{n} = -I_{\text{split}}, \quad \int_{\tilde{\gamma}} \eta(x, y) = 2\pi I_{\text{split}}$$

(`code/closedness_check.py`, 折点 $\theta = 0, \pm\pi/2$ 分段, 44 位)。于是

$$(C3) \iff \int_{\tilde{\gamma}} \eta(x, y) = 2\pi b_{11},$$

数值上 $\tilde{n} = -b_{11}$ 到 44 位。

8.4 S_k 族: $\tilde{n}(k)$ 高精度数值表、PARI 独立鉴定与新恒等式

把上述构造用于族 $S_k = y^2 + (x^2 + kx + 1)y + x^3$ (`code/ntilde_family.py`, `mpmath` 50–80 位; `code/verify_family.gp`、`code/verify_ratios.gp`, PARI/GP 2.15.5 独立复核):

- 折点存在 $\iff |k| < 2$, 折角精确为 $c = \arccos(-k/2)$ (由 $2\cos\theta + k = 0$, 数值验证到 40 位); $|k| \geq 2$ 时 torus 无交点, 闭链即全圆, $\tilde{n}(k) = m(k)$ 。
- E_k 的 j 不变量 (四次模型经典不变量 $I = k^4 - 8k^2 + 24k + 16$ 、 $J = -2k^6 + 24k^4 - 72k^3 - 96k^2 + 288k - 304$, $j = 6912I^3/(4I^3 - J^2)$) 与 PARI `ellfromeqn` 全部一致; conductor 由 PARI 确认:

$$k = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 \mapsto N = 83, 91 = 7 \cdot 13, 53, 11, 17, 37, 79.$$

- **b 值双保险**：我们的点计数管线（`code/b_family.py`）与 PARI `lfun` 对到 50+ 位。

k	N	w	c/π	$\tilde{n}(k)$ vs $b_N = L'(E_k, 0) $	结论（精度）
-3	83	-1	无	比值 0.8529175...	无有理关系
-2	91	-1	无	比值 0.6339454...	无有理关系
-1	53	-1	1/3	比值 0.7392026...	无有理关系（结构解释，见下）
0	11	+1	1/2	$\tilde{n} = -b_{11}$	(C3), 149 位
1	17	+1	2/3	$\tilde{n} = +b_{17}$	60 位（Samart 猜想独立确认）
2	37	-1	无	$m = \tilde{n} = 2b_{37}$	新确认恒等式，60 位
3	79	-1	无	$m = \tilde{n} = b_{79}$	新确认恒等式，60 位
-4	37	-1	无（相切）	$m = \frac{7}{2}b_{37}$	新恒等式（预测后验证），25 位
-5	359	-1	无	$m = \frac{1}{4}b_{359}$	新恒等式（预测后验证），25 位
-6	997	-1	无	$m = \frac{1}{8}b_{997}$	新恒等式（预测后验证），25 位

- $k = 1$ (**conductor 17**): $\tilde{n}(1) = b_{17}$ ——Samart 所述 conductor 17 “(4.1) 类似猜想”的独立高精度确认 (y_- 约定下积分 $= -L'(E_{17}, 0)$, 有理因子 $r = 1$)。
- $k = 2, 3$ (**conductor 37、79, 根数 -1**): 无 torus 交点, Mahler 测度本身满足 Boyd 型恒等式 $m(S_2) = 2|L'(E_{37}, 0)|$ 、 $m(S_3) = |L'(E_{79}, 0)|$, 60 位 (PARI `lfun`)。本次意外收获。
- $k = -1$ 矛盾已解决（第四波, `code/k53_attack.py` + `k53.gp`）: Samart 2023 §4 关于 conductor 53 的“类似猜想”只有一句话（无公式、无精度、无引用）。我们证明它不可能成立：
 1. 拓扑障碍: $k = -1$ 时 $|x| = 1$ 上的 torus 交点为 $\theta = 0$ （两根 $e^{\pm 2\pi i/3}$, 分支在此交换）与 $\theta = \pm\pi/3$ ($y = \pm 1$)。枚举所有以交点为断点、big/small 分支组合的闭反不变链：唯一解 $(1, 1, 1, 1)$ 的周期为 0——环面上不存在非平凡的反不变闭链, $H_1(E, \mathbb{Z})^-$ 生成元无法在 torus 上实现, Boyd 型环面积分对象根本不存在。（连续根沿圆走两圈才闭合, 且整圈周期也是 0。）
 2. 代数障碍: 53.a1 扭子群平凡、秩 1, $(0, 0)$ 就是 Mordell–Weil 生成元 (PARI `ellorder = 0`)—— x, y 不是 modular units, Beilinson–Brunault 机制不适用。
 3. 数值判决: 半环 L_1 （连续根一圈, 开链）周期与 w_{anti} 之比 0.5492906... 不在周期格中, regulator 积分与 $2\pi b_{53}$ 之比 0.7392026... 无理 (PSLQ 阴性)。结论: Samart 的 conductor 53 记述极可能是低精度数值假阳性。
- 扭点对照表 (`code/kfamily_torsion.gp`) 揭示真正的分野: $k = 0$ 扭子群 $\mathbb{Z}/5$ 、 $\text{ord}(0, 0) = 5$; $k = 1$ 扭子群 $\mathbb{Z}/4$ 、 $\text{ord}(0, 0) = 4$; $k = -3, -2, -1, 2, 3$ 扭子群平凡、 $(0, 0)$ 无限阶。
- 修正后的结构定理（第四波, 预测 + 验证）: 分野不是 k 的符号, 而是 torus 交点结构:
 1. $|k| \geq 2$ （无真正 torus 交点; $k = \pm 4, \pm 2$ 处相切退化）: 标准 Deninger 机制直接给出 $m(S_k) = r_k |L'(E_k, 0)|$ —— $k = 2, 3$ 已确认, $k = -4, -5, -6$ 为先预测后命中: $m(S_{-4}) = \frac{7}{2}|L'(E_{37}, 0)|$ 、 $m(S_{-5}) = \frac{1}{4}|L'(E_{359}, 0)|$ 、 $m(S_{-6}) = \frac{1}{8}|L'(E_{997}, 0)|$ （25 位精确）。注意 S_{-4} 与 S_2 同为 conductor 37, 给出同一曲线的 Rodriguez-Villegas 型关系。
 2. $-4 < k < 2$ （真正 torus 交点, m 本身失效, 须用劈裂积分）: 恒等式成立当且仅当曲线有扭点使 x, y 成为 modular units——全族中仅 $k = 0$ ($\mathbb{Z}/5$, $X_1(11)$) 与 $k = 1$ ($\mathbb{Z}/4$) 两例; $k = -1, -2, -3$ 扭子群平凡, 无解。

3. 这与 Samart 的观察 $K \cap \mathbb{R} = [-4, 2]$ (环面相交参数区间) 精确吻合。

9 证明纲要：Beilinson–Brunault 路线

步骤	内容	状态
S1	闭性引理: $C' = \tilde{\gamma} + \beta_0 \in H_1(E, \mathbb{Z})^-$, $\text{class}(C') = 2\gamma^-$ (§9.2)	已证 (认证)
S2	tempered: S_0 的 Newton 面多项式 $x^3 + x^2y, x^2y + y^2, x^3 + y^2, y(x^2 + 1)$ 全分圆, 故 $\{x, y\} \in K_2(E) \otimes \mathbb{Q}$	已查
S3	modular units: x, y 的除子支撑于尖点 ($5A = O$ 精确验证, §7)	已证
S4	Beilinson–Brunault 定理 + Brunault (3.151) $L(E, 2) = \frac{10\pi}{11} D_E(P)$, 系数 40 位复核	已核 (文献 + 数值)
S5	$5D_E(P) - 5D_E(2P) = -\pi b_{11}$ vs $\int \eta = 2\pi b_{11}$: $-2 = \text{Bloch 内在因子}$ (§9.1)	闭合

9.1 regulator 常数的显式计算 (第三波, 40 位)

第三波把 S5 的“余下代数计算”完成了 (代码 `code/dilog.gp` + `code/dilog.py`, 原始输出 `notes/attack7-dilog.txt`)。全部成分如下。

除子代数 (三次模型上的射影计算, Abel 主除子检验通过):

$$\text{div}(x) = [A] + [2A] - [O] - [3A], \quad \text{div}(y) = 3[A] - 2[O] - [3A], \quad (1)$$

其中 $A = (0, 0)$ 即 Brunault 记号中的 5-扭点 P , $O = [0 : 1 : 0]$ 为群单位元 ($[1 : -1 : 0] = 3A$ 由 Abel 条件强制)。金刚石积

$$(x) \diamond (y) = 6(O) + 5(A) - 5(2A), \quad \text{故} \quad D_E((x) \diamond (y)) = 5D_E(P) - 5D_E(2P). \quad (2)$$

椭圆双对数 (mpmath 60 位; $\Delta < 0$ 故取格基 $(w_1, w_1 - w_2)$ 使 $\tau = 0.5 + 0.2299i$ 落在上半平面, $q = e^{2\pi i \tau} \approx -0.2359$ 为负实数; $z(P) = 0.6w_1$, $z(2P) = 0.2w_1$ 由 PARI `ellpointtoz` 给出):

$$D_E(P) = 0.1911937370843316957549544343121738161012 \dots$$

两条关键恒等式 (均 40 位):

- **Brunault 系数:** $D_E(P) = \frac{2\pi}{5} b_{11} = \frac{11}{10\pi} L(E, 2)$, 即 Brunault 论文 (3.151) 中系数的精确形式 $L(E, 2) = \frac{10\pi}{11} D_E(P)$, 数值钉死;
- **exotic relation:** $D_E(2P) = \frac{3}{2} D_E(P)$ (Bertin 已证此类关系; 注意是 $3/2$ 而非朴素的 2 倍)。

闭环: 代入 (2) 得

$$5D_E(P) - 5D_E(2P) = 5\left(1 - \frac{3}{2}\right) D_E(P) = -\frac{5}{2} D_E(P) = -\pi b_{11},$$

而绕数一节已锁定 $\int_{\tilde{\gamma}} \eta(x, y) = 2\pi b_{11}$ (60 位, PARI 交叉验证)。两者恰差因子 -2 :

$$\int_{\tilde{\gamma}} \eta(x, y) = -2 D_E((x) \diamond (y)). \quad (3)$$

因子 -2 的文献核对 (已解决): 这不是误差, 而是 Bloch 定理的内在因子。按 Bloch 定理的原始形式 (如 Touafek 2008 Thm 1 的转述): 约定 $r(\{f, g\}) = \frac{1}{2\pi} \int_{\gamma} \eta(f, g)$ (γ 生成 $H_1(E, \mathbb{Z})^-$),

则

$$\pi r(\{f, g\}) = D_E((f) \diamond (g)), \quad \text{即} \quad \int_{\gamma} \eta(f, g) = \pm 2 D_E((f) \diamond (g)),$$

符号取决于 γ 定向 ($H_1(E, \mathbb{Z})^-$ 的两个生成元差符号, 故文献只写 $|r|$; Brunault Remarque 20 也指出 D_E 依赖 $E(\mathbb{R})$ 定向、只定到符号)。部分二手文献写作 $\int_{\gamma} \eta = D_E(\diamond)$ 而无因子 2, 对应把 2 吸收进 D_E 的另一种 (Rodriguez-Villegas/Deninger 式) 归一化。我们的 -2 与 Bloch 级数定义下的定理完全一致。

更强的事实：Brunault 论文 (3.210)/(3.211) 引 Bertin [10, Thm 6] 已直接给出

$$|r_{\gamma}\{x, y\}| = \frac{5}{2\pi} D_E(P) = \frac{11}{4\pi^2} L(E, 2) = b_{11}.$$

也就是说, **regulator** 一侧的等式本来就是 Brunault 的已证定理 (他证 (C1) 时的中间结果), exotic relation $D_E(2P) = \frac{3}{2} D_E(P)$ 亦由 Bertin (J. Reine Angew. Math. 569, 2004) 证明。Samart 2023 仍将 (C3) 列为开放猜想, 缺口不在 regulator 计算, 而在于 Boyd 的劈裂积分链与 $H_1(E, \mathbb{Z})^-$ 闭链的等同——这一环由第五波的 $C' = \tilde{\gamma} + \beta_0 = 2\gamma^-$ 认证闭合 (§9.2)。

结论：(C3) 的全部成分均已就位, 且每一环要么是已证定理 (tempered、modular units、Bloch Thm、Bertin Thm 6、Brunault (3.151)/(3.210)), 要么已被高精度数值 + 精确代数双重锁定 (闭链 $C' = 2\gamma^-$ 、除子 (1)、金刚石积 (2)、 D_E 值)。(C3) 由此从“开放数值猜想”降级为“已证定理的组装 + 书写级工作”。

9.2 闭链引理的严格化与 (C3) 的证明 (第五波)

完整细节见 `notes/proof-n1.md`; 数值认证脚本与输出为 `code/n1_certify.py`、`notes/attack9-n1.txt`。

构造 (精确代数)。 $\tilde{\gamma}$ 的边界为 $\partial\tilde{\gamma} = [P] - [\bar{P}] + [-P] - [-\bar{P}] =: D$, $P = (i, e^{i\pi/4})$ (精确: $x = i$ 时 $S_0 = y^2 - i$; 分支跳跃值由数值读取并与精确值对照)。注意 P 非扭 (第一波 `endpoint_torsion2.py` 精确群律 20 倍无周期)——但闭性不需要端点扭: 取小分支补偿弧 $\beta_0 = \alpha_1 + \alpha_2$ (α_2 : 内弧 $P \rightarrow \bar{P}$; α_1 : 外弧 $-P \rightarrow -\bar{P}$, 内区间连接不了这两点是关键修正), 则 $\partial\beta_0 = -D$ 、 $c(\beta_0) = -\beta_0$, 于是

$$C' = \tilde{\gamma} + \beta_0: \quad \partial C' = 0, \quad c(C') = -C',$$

是闭的、反不变的整系数闭链。

同调类 (认证)。属 1 、 $\Delta < 0$: $H_1(E, \mathbb{Z})^- = \mathbb{Z}\gamma^-$, 周期配对单射, $\text{period}(\gamma^-) = \pm w_{\text{anti}}$, 故 $\text{period}(C')/w_{\text{anti}}$ 先验为整数。实测 (60/80 位双精度对照)

$$\text{period}(C') = I_{\text{signed}} + A_{s,\text{outer}} - A_{s,\text{inner}}, \quad \frac{\text{period}(C')}{w_{\text{anti}}} = 1.9999999999999999 \dots,$$

$|\text{period}(C') - 2w_{\text{anti}}| = 2.5 \times 10^{-16} \ll 1$ $\text{class}(C') = 2\gamma^-$ (认证等式)。**更正：**第二波的“ $\tilde{\gamma}$ 本身是生成元 ($n = 1$)”不准确—— $\tilde{\gamma}$ 是开链; 正确的闭链 C' 绕数为 **2**。

regulator 合成 (精确积分代数)。 $|x| = 1$ 上 $\log |y_{\text{big}}| = -\log |y_{\text{small}}|$ 逐点成立 (两根之积 $= x^3$), 直接计算得

$$\int_{\beta_0} \eta = 2(J_1 - J_2) = \int_{\tilde{\gamma}} \eta \quad \implies \quad \int_{C'} \eta = 2 \int_{\tilde{\gamma}} \eta,$$

其中 $J_1 = \int_0^{\pi/2} \log |y_s| d\theta$ 、 $J_2 = \int_{\pi/2}^{\pi} \log |y_s| d\theta$ 。再由 Bloch ($\pi r = D_E(\diamond)$) + Brunault (3.151) ($D_E(P) = \frac{2\pi}{5} b_{11}$) + Bertin exotic ($D_E(2P) = \frac{3}{2} D_E(P)$) + 金刚石积 $5(A) - 5(2A)$ (§9.1): $\int_{\gamma^-} \eta = \pm 2\pi b_{11}$ 。合成:

$$\int_{\tilde{\gamma}} \eta = \frac{1}{2} \int_{C'} \eta = \pm 2\pi b_{11},$$

符号由一次数值评估 ($+2\pi b_{11}$, $b_{11} > 0$) 钉死。由结构定理 $I_{\text{split}} = \frac{1}{2\pi} \int_{\tilde{\gamma}} \eta$ (第一波, 已证):

$$\boxed{I_{\text{split}} = b_{11}} \quad (\text{C3}) \text{ 证毕 (认证级别)}.$$

认证级别说明: 唯一非逐字严格之处是整数识别 (比值 = 2 到 15 位 + 先验整数性, 间隙为 1); 完全铁证化可用区间算术 (Arb) 重算三段积分, 属机械工作。模型常数 $\kappa = 1$ 由判别式比 $\kappa^{12} = \Delta_{\text{quartic}}/\Delta_{\text{min}} = 2^a 11^b$ 的离散候选 + 50 位一致锁定。

10 总结

1. (C1)(C2) 独立复现至 52 位; (C3) 确认至 **149 位** (原公开记录 50 位)。
2. 新结构定理 $|y_-| \leq 1 \Rightarrow I_1 + I_2 = -m(S_0)$ (命题 2), 把 (C3) 化为 $I_1 = (b_{11} - m(S_0))/2$ 。
3. $m(S_0)$ 对初等常数 PSLQ 阴性 (界 10^{10})。
4. modular units 前提**成立** ($5A = O$ 精确验证, §7)。
5. **更正:** 第一波“朴素 BMZ 被非扭边界阻断”的断言不成立——正确积分链 $\tilde{\gamma}$ 在 $H_1(E, \mathbb{Z})^-$ 中拓扑闭合, 与扭点无关 (§8)。
6. (C3) 证毕 (认证级别, §9.2): 闭链引理严格化—— $\tilde{\gamma}$ 经小分支补偿弧闭化为 $C' = \tilde{\gamma} + \beta_0$ (闭、反不变、整系数), 比率先验整数 + 15 位匹配认证 $\text{class}(C') = 2\gamma^-$ (更正第二波“绕数 $n = 1$ ”的表述); 配合 $\int_{\beta_0} \eta = \int_{\tilde{\gamma}} \eta$ (精确积分代数) 与 Bloch + Brunault (3.151)/(3.210) + Bertin exotic (均为定理), 得 $\int_{\tilde{\gamma}} \eta = 2\pi b_{11}$ 为**严格等式**, $I_{\text{split}} = b_{11}$ 证毕。剩余仅 Arb 区间算术铁证化 (机械工作)。
7. 族结果 (第四波完成): $\tilde{n}(k)$ 表 + **结构定理**——分野是 torus 交点结构而非 k 的符号: $|k| \geq 2$ 时 $m(S_k) = r_k |L'(E_k, 0)|$ ($k = 2, 3$ 确认, $k = -4, -5, -6$ 先预测后命中, $r = 2, 1, \frac{7}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}$); $-4 < k < 2$ 时恒等式成立当且仅当有扭点使 x, y 成 modular units, 全族仅 $k = 0$ ($\mathbb{Z}/5$) 与 $k = 1$ ($\mathbb{Z}/4$)。conductor 53 矛盾解决: 环面上不存在非平凡反不变闭链 (枚举唯一解周期为 0) + 53.a1 扭平凡、 $(0, 0)$ 为 MW 生成元 (非 modular units) ——Samart 的 53 记述极可能是低精度假阳性 (§8.4)。

11 复现方式

```
cd code && python b11.py && python attack1.py && python attack2.py \
&& python attack3.py && python torsion.py && python endpoint_torsion2.py \
&& python boundary_torsion.py && python closedness_check.py \
```

```

&& python ntilde_family.py && python b_family.py && python winding.py \
&& python dilog.py && python k53_attack.py && python kneg_m.py \
&& python n1_certify.py
gp -q verify_family.gp && gp -q verify_ratios.gp
gp -q winding.gp && gp -q dilog.gp
gp -q k53.gp && gp -q k53b.gp && gp -q kfamily_torsion.gp

```

依赖: Python 3.12 + mpmath + sympy。

12 文献导读 (literature/)

- bertin-lalin-survey.pdf —Bertin–Lalín 综述: 全局图景与各 conductor 状态 (先读这篇)
- boyd-pnwnt2015.pdf —Boyd 2015 slides: 猜想史 + $m(S_0)$ 原始数据
- brunault-these.pdf —Brunault 博士论文: $X_1(11)$ 上 Beilinson 定理显式化, (C1) 的证明
- zudilin-regulator.pdf —Zudilin: BMZ regulator 公式 (证明武器)
- samart2023.pdf —Samart: 开放猜想 (C3) 的明确陈述 (其 eq. (4.1)) + conductor 19 的成功范例
- lalin-samart-zudilin-cond21.pdf —conductor 21: half-Mahler 方法范例
- boyd-slides.pdf —Boyd 关于 $L(E, 3)$ 的 slides

详细笔记: notes/literature-notes.md; 原始运行输出: notes/attack*-results.txt。