URI Online Judge I 1784

Jacutingas vs Jaburus

Por Gustavo Stor, UFPE S Brazil

Timelimit: 1

Há N jacutingas em uma floresta, cada um em sua respectiva árvore. Há N jaburus cansados voando nesta floresta, e eles desejam pousar em árvores diferentes o mais cedo possível (jaburus são muito briguentos e não conseguem dividir uma mesma árvore). A cada P_i minutos, a jacutinga i sai da árvore para voar um pouco, e pode-se considerar que ela volta instantaneamente. A cada C_i minutos, o jaburu i pode tentar pousar em uma árvore em que a jacutinga não se encontre, e caso não consiga, volta instantaneamente a voar. Pode-se considerar que jaburus voam mais rápido que jacutingas e conseguem ocupar as árvores mais rápido do que elas. Dado uma estratégia ótima entre os jaburus, qual o menor tempo em que todos os jaburus estarão relaxando, cada um em uma árvore diferente?

Entrada

A primeira linha da entrada contém T (1 $\leq T \leq$ 100), o número de casos de teste. Cada caso de teste começa com um inteiro N (1 $\leq N \leq$ 9), o número de jacutingas e de jaburus. A segunda linha do caso de teste contém N inteiros P_i (1 $\leq P_i \leq$ 10 4), como descrito na questão. A terceira e última linha do caso de teste contém mais N inteiros C_i (1 $\leq C_i \leq$ 10 4), como também descrito na questão.

Saída

Para cada caso imprima "Caso #X: Y", onde X é o número do caso atual, começando em 1, e Y é a resposta da questão.

Exemplo de Entrada	Exemplo de Saída
2	Caso #1: 6
2	Caso #1: 6 Caso #2: 1
1 3	
2 2	
1	
1	
1	

Final da Seletiva UFPE - 2014