

A stylized painting of a large tree with white and yellow blossoms against a blue sky and green field. The tree's branches are dark green and spread out, covered with numerous small white flowers and some yellow buds. The background is a solid blue sky, and the foreground is a green field with some yellow and red speckles. The overall style is painterly and vibrant.

线性代数

2022-2023 春季学期

代数简介

“代数” (Algebra) 的来源

Algebra \longleftarrow 拉丁文 *al-jebra*

\uparrow
<ilm al-jabr wal muqubalah>

《还原与对消的科学》

阿尔·花拉子米 (阿拉伯,
公元9世纪)

1859年，李善兰首次将Algebra译为“代数”

代数：“代数之法，无论何数，皆可以任何记号代之”

代数，就是运用文字符号来代替数字的一种数学方法。

古希腊数学家丢番图（Diophantus）引入了未知数的概念

并建立方程的思想，被称为“代数学之父”

Father of algebra

代数

```
graph TD; A[代数] --> B[算术]; A --> C[初等代数]; A --> D[高等代数]; A --> E[数论]; A --> F[抽象代数]; D --> G[线性代数]; D --> H[多项式理论];
```

算术

初等代数

高等代数

数论

抽象代数

线性代数

多项式理论

有关事宜

总评成绩=平时30%+期末70%

平时=考勤40%+作业60%

考勤：签到学习通.

假条：姓名学号请假时间，事由合理.

作业：网上作业，自备作业本期末交

机器批阅：判断题，选择题，填空题

人工批阅：简答题，证明题

要求：写出详细解答过程，拍照上传

不得相互抄袭、盗图，一经发现，该次双方0分处理！

主要内容

第一章 矩阵

第二章 方阵的行列式


第三章 线性空间与线性变换

第四章 线性方程组

第五章 矩阵的相似与相合

第一章 矩阵

“矩阵”起源 (19世纪即已出现)



A. Cayley (1821–1895)

矩阵理论的创始人

§ 1.1 矩阵的定义与运算

一. 矩阵的定义

定义 1.1 由 mn 个数排成的 m 行 n 列数表

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} = (a_{ij})_{m \times n} \text{ 称为矩阵}$$

a_{ij} : 位于第 i 行第 j 列的元素

i : 称为 a_{ij} 的行标 j : 称为 a_{ij} 的列标

本课程中一般 $a_{ij} \in R$ (实数域)

二. 一些特殊的矩阵

1) $m = n$: n 阶方阵

2) $n = 1$: m 维列向量

$$\vec{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

特别地:

标准单位列向量

$$\vec{e}_i = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \leftarrow i$$

3) $m = 1$: n 维行向量

$$(a_1, a_2, \dots, a_n)$$

特别地: $(0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$

称为标准单位行向量

4) 零矩阵: $O = (0)_{m \times n}$

5) 上三角阵

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \mathbf{0} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

6) 下三角阵

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & \mathbf{0} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

7) 对角阵

$$\begin{pmatrix} d_1 & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & d_2 & \cdots & \mathbf{0} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & d_n \end{pmatrix} = \mathit{diag}\{d_1, d_2, \cdots, d_n\} = \Lambda$$

特别若 $d_1 = d_2 = \cdots = d_n = 1$:

$$I = \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & 1 & \cdots & \mathbf{0} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

称为 n 阶单位阵
类似于“1”
也记为 E

三. 矩阵的运算

定义 1.2 矩阵的相等

设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $B = (b_{ij})_{m \times n}$

若 $a_{ij} = b_{ij} (i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n)$ 则称 $A = B$

定义 1.3 矩阵的加法

设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $B = (b_{ij})_{m \times n}$

定义 $A + B = (a_{ij} + b_{ij})_{m \times n}$

定义1.4 设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$,

则称 $-A = (-a_{ij})_{m \times n}$ 为 A 的负矩阵

从而定义减法为: $A - B = A + (-B)$

定义1.5 设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, k 为数,

则称 $kA = (ka_{ij})_{m \times n}$ 为 A 与 k 的数乘

易证对以上定义的线性运算, 成立:

$$(1) A + B = B + A$$

$$(2) (A + B) + C = A + (B + C)$$

$$(3) A + 0 = 0 + A = A$$

$$(4) A - A = 0$$

$$(5) (\lambda\mu)A = \lambda(\mu A)$$

$$(6) (\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A, \lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$$

$$(7) 1 \cdot A = A \quad (8) 0 \cdot A = 0$$

定义 1.6 设 $A = (a_{ij})_{m \times s}$ $B = (b_{ij})_{s \times n}$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1s} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \underline{a_{i1}} & \underline{a_{i2}} & \cdots & \underline{a_{is}} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{ms} \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & \underline{b_{1j}} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & \cdots & \underline{b_{2j}} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ b_{s1} & \cdots & \underline{b_{sj}} & \cdots & b_{sn} \end{pmatrix}$$

令 $c_{ij} = \underline{a_{i1}b_{1j}} + \underline{a_{i2}b_{2j}} + \cdots + \underline{a_{is}b_{sj}}$

$i = 1, 2, \cdots, m; \quad j = 1, 2, \cdots, n$

则 $C = (c_{ij})_{m \times n}$ 称为 A 与 B 的乘积

记为 $C = AB$ 读 “ A 左乘 B ”

注：只有矩阵A列数与矩阵B行数相等，
AB才有意义，否则无意义！

$$A_{m \times s} B_{s \times n} = (C)_{m \times n}$$

$$c_{ij} = (a_{i1}, \cdots, a_{is}) \begin{pmatrix} b_{1j} \\ \vdots \\ b_{sj} \end{pmatrix}$$

例： $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}_{2 \times 2}$ $B = (1, 1)_{1 \times 2}$

则 AB 有意义吗？

但 BA 有意义 $= (1, 2)_{1 \times 2}$

例1: 设 $AC = CB$ 且 C 为 $m \times n$ 阵

求 A, B 的行数与列数

矩阵乘法的运算规律

$$(1) (AB)C = A(BC)$$

$$(2) A(B+C) = AB + AC, (B+C)A = BA + CA$$

$$(3) \lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B)$$

$$(4) AI = IA = A$$

$$(5) A_{m \times s} 0_{s \times n} = 0_{m \times n}, 0_{k \times m} A_{m \times s} = 0_{k \times s}$$

注1 AB与BA未必相等

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

则

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad BA = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

注2 $AB = 0, A \neq 0 \overset{?}{\not\Rightarrow} B = 0$

注3 $AB = AC, A \neq 0 \overset{?}{\not\Rightarrow} B = C$

定义1.7 若 $AB=BA$ ，称 A 与 B 可交换

习题：证明若 $AB=BA$,

则 A, B 为同阶方阵。

例如： $A=I_n$, $B_{n \times n}$ ，则 $IB=BI$

单位阵与任一方阵可交换

乘法的应用 (线性方程组的表示)

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots a_{2n}x_n \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots a_{mn}x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

方程组的矩阵形式

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

A \vec{x} \vec{b}

$$\Leftrightarrow A\vec{x} = \vec{b}$$

$\vec{b} = \vec{0}$: 齐次

$\vec{b} \neq \vec{0}$: 非齐次

A : 方程组的系数矩阵

例2: 求
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 1 \\ 3x_1 - x_2 + 4x_4 = 3 \end{cases}$$

矩阵形式 $Ax = \vec{b}$ 中的 A

定义1.8 设A为方阵

定义 $A^0 = I$, $A^k = \overbrace{AA \cdots A}^k$

A^k 称为A的k次幂

显然 $A^k A^l = A^{k+l}$

注： $(AB)^k$ 未必等于 $A^k B^k$

$$\begin{aligned} k=2: \quad (AB)^2 &= (AB)(AB) \\ &= A(BA)B \stackrel{AB=BA}{=} A^2 B^2 \end{aligned}$$

例3: $\Lambda = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n)$ 求 Λ^k

解:

$$\Lambda^2 = \begin{pmatrix} d_1 & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & d_2 & \cdots & \mathbf{0} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & d_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d_1 & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & d_2 & \cdots & \mathbf{0} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & d_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1^2 & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & d_2^2 & \cdots & \mathbf{0} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & d_n^2 \end{pmatrix}$$

$$= \text{diag}(d_1^2, d_2^2, \dots, d_n^2)$$

.....

$$\Lambda^k = \text{diag}(d_1^k, d_2^k, \dots, d_n^k)$$

类似可得

$$\begin{pmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & b_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & b_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 b_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 b_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_n b_n \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{即 } & \text{diag}(a_1, a_2, \cdots, a_n) \text{diag}(b_1, b_2, \cdots, b_n) \\ &= \text{diag}(a_1 b_1, a_2 b_2, \cdots, a_n b_n) \end{aligned}$$

同阶对角阵的乘积仍为对角阵，且其对角元为两个对角阵相应位置对角元的乘积。

例4. $A, B: n \times n$ 判断正误

$$(1) (A+B)(A-B) = A^2 - B^2$$

$$(2) (A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$$

若 A, B 可交换

$$\text{则 } (A+B)^n = \sum_{i=0}^n C_n^i A^i B^{n-i}$$

$$\text{特别有 } (I+A)^n = \sum_{i=0}^n C_n^i A^i$$

例5. $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 求 C^n .

例6: $A = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}_{3 \times 1}$, $B = (1, -1, 2)_{1 \times 3}$, 令 $C = AB$

求 C^2, C^n .