a


TCGA−GBM (training)
HR = 1.78 (95% CI 1.21−2.62)
Strata Low (n=72) High (n=72)
OS
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
p = 0.0028
0 20 40 60 80
Months

b


Number at risk
Low (n=72) 72 17 6 2 1
High (n=72) 72 10 1 0 0

c


CGGA−693
HR = 2.48 (95% CI 2.02−3.05)
Strata Low (n=329) High (n=328)
OS
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
p < 0.0001
0 40 80 120 160
Months

d


Number at risk
Low (n=329) 329 173 73 7 0
High (n=328) 328 87 28 4 1

e


CGGA−325
HR = 3.23 (95% CI 2.44−4.28)
Strata Low (n=157) High (n=156)
OS
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
p < 0.0001
0 40 80 120 160
Months

f


Number at risk
Low (n=157) 157 93 68 40 0
High (n=156) 156 23 16 7 0

g


GLASS primary
HR = 2.38 (95% CI 1.56−3.65)
Strata Low (n=54) High (n=53)
OS
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
p < 0.0001
0 50 100 150 200
Months

h

Number at risk
Low (n=54) 54 14 4 1 1
High (n=53) 53 3 2 0 0

i


GLASS: recurrence interval (exploratory)
one record/patient (n = 173); rho = 0.31
Months to first recurrence
150
100
50
0
−1 0 1 2
Primary tumor WEBS

j


GLASS pairs (n = 179 pairs / 148 patients)
WEBS
2
1
0
−1
Primary
Recurrence
Primary
Recurrence