حسام صلاح | هل يمكن أن تصبح المرحلة pT2؟

ملخص عربي من صفحة واحدة | مراجعة الأدلة حتى 9 أكتوبر 2026

ما تثبته خزعتك الآن

خزعة معهد وارث بتاريخ 15 سبتمبر 2026: سرطان حليمي ظهاري بولي منخفض الدرجة، pT1؛ غزو النسيج الضام تحت البطانة، مع وجود عضلة المثانة وخلوها من الورم في العينة. لا يثبت التقرير pT2، ولا يمكن الجزم بالوصول إليها. pT2 تعني غزو عضلة المثانة بالفحص النسيجي. [4] التقرير يسبق إعادة الاستئصال في 6 أكتوبر، ونتيجتها غير متاحة.

فرق مهم: اكتشاف مرحلة أعلى أم تطور لاحق؟

قد تكشف العينة الثانية غزوا لم يظهر بالعينة الأولى؛ وهذا لا يثبت وحده أن الورم تطور خلال الأسابيع بين العمليتين. أما التطور لاحقا إلى غزو العضلة فيقيم خلال المتابعة. وجود عضلة سليمة بالعينة معلومة إيجابية، لكنه لا يجعل الاحتمال صفرا. [5]

الدراسة	النتائج وحدود تطبيقها على حالتك
Garg وآخرون [1] 2021	من 126 مريضا بـT1 منخفض الدرجة، حدث تطور إلى غزو العضلة لدى 6 (4.8%) خلال متابعة متفاوتة المدة. هذه ليست نسبة خمس سنوات أو احتمالا شخصيا لك. الدراسة رصدية وتشمل مرضى بعلاجات وخصائص مختلفة.
Epsteinو Toll [2] جونز هوبكنز، 2012	درست 41 حالة منخفضة الدرجة تغزو النسيج تحت البطانة؛ توفرت متابعة لـ29. عاد الورم لدى 10 (34%)، وارتفعت الدرجة والمرحلة لدى 3. عودة الورم لا تعني pT2، والملخص لا يحدد المرحلة الجديدة للثلاثة. الدراسة صغيرة.
Yanagisawa [3] وآخرون مراجعة 81 دراسة، 2024	في مجموعات T1 المعالجة خلال العقد 2010، بلغ اكتشاف غزو العضلة عند إعادة الاستئصال 2.8% (فاصل الثقة 2.0% إلى 3.8%). المجموعات مختلفة الدرجات؛ النسبة ليست خاصة بالدرجة المنخفضة، ولا تقيس احتمال التطور مستقبلا.

الخطوة العملية في حالتك

في موعد 13 أكتوبر المذكور بأوراق الخروج، بعد تأكيده، اطلب خزعة عملية 6 أكتوبر وتقرير الجراح: هل توجد بقايا ورم؟ وما مرحلتها ودرجتها؟ وهل العضلة موجودة وسليمة؟ راجع حجم الورم وعدده ووجود ورم مسطح عالي الدرجة (CIS) والعلاج السابق. هذه البيانات تحدد الخطر والعلاج؛ إعادة الاستئصال موصى بها في T1 حتى مع وجود عضلة بالعينة الأولى. [5]

النسب أعلاه تخص مجموعات بحثية وتختلف أعمار المرضى وعلاجاتهم ومدة المتابعة. لا يمكن استخراج نسبة شخصية دقيقة من الخزعة الأولى وحدها، ولا يعني تشابه الوصف النسيجي تطابق جميع تفاصيل الحالة.

المصادر المختصرة (روابط قابلة للنقر)

منخفض الدرجة T1 نتائج :Garg 2021 [1]
دراسة 41 حالة :Epsteinو Toll 2012 [2]
إعادة الاستئصال :Yanagisawa 2024 [3]
T2و T1 تعريف مرحلتي :EAU [4]
إعادة الاستئصال :EAU 2026 [5]