



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

ÇEŞİT KATALOĞU

2025



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

TARM

**TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA**

ÇEŞİT KATALOĞU 2025

ÖNSÖZ

Bir tohum yaşamın canlılığını ve sürekliliğini temsil eder. Nesilden nesile yenilenen ve çok farklı koşullara uyum sağlayarak devamlılığı ve canlılığı temsil eden tohum, gıdanın ana hammaddesini oluşturmaktadır.

Tohumun gıdaya ve tekrar tohuma dönüşümü bir taraftan mucizevi bir yaşam döngüsünü gözlerimizin önüne sererken, diğer taraftan, gıdaya dönüşen hali ile tüm canlıların beslenme ihtiyacına cevap vermesiyle özel bir öneme sahiptir. Bu dönüşümün, bitkilerde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik bitki çeşidi geliştirme aşamalarının bilimsel veriler ışığında uzman ellerce gerçekleştirilmesi, insanların beslenme ihtiyaçlarına katkıyı artırmaktadır.



İnsanların beslenmelerinin ve gıdaya ulaşımının gittikçe zorlaştığı dönemlerde, sınırlı kaynaklarla daha fazla verim elde etmenin yolları ancak AR-GE çalışmaları ile aşılabilmektedir. Ayrıca tüketicinin istek ve ihtiyaçlarına uygun ürünler üretmek, yine bu alanda yapılacak Tarımsal AR-GE çalışmaları ile mümkün olmaktadır.

Ülkemiz tarımına, kurulduğu günden bu yana önemli hizmetler veren Enstitümüz, Tarımsal AR-GE çalışmalarında, bilimsel ve teknolojik imkanları kullanarak çalışma alanını, kapasitesini ve üretimdeki ürün sayısını her geçen gün artırmaktadır.

Enstitümüz, yüksek AR-GE kapasitesiyle, öncelikle tarla bitkileri alanında; serin iklim tahılları, baklagiller, yağlı tohumlu bitkiler, çayır mera ve yem

bitkileri ve tıbbi aromatik bitkilerde yüksek verimli, kalite değeri yüksek, hastalıklara dayanıklı çeşit geliştirme çalışmaları yürütmektedir.

Enstitümüz, kuruluşundan bu yana tarla bitkilerinde 27 türde toplam 159 adet çeşit geliştirerek ülke tarımına önemli katkılar sağlamıştır. Bu çeşitlerin Türkiye'deki toplam sertifikalı tohumluk miktarı içerisindeki payı oldukça yüksektir. Milli çeşit listesinde bulunan üretim izinli 113 çeşidimiz hali hazırda Türk tarımının hizmetindedir.

Enstitümüze ait olan ekmeklik buğday çeşitlerinin sertifikalı tohumculuk sektörü içerisindeki payı Türkiye genelinde %8,5 civarındadır. Enstitümüze ait olan makarnalık buğday çeşitlerinin sertifikalı tohumculuk sektörü içindeki toplam payı Türkiye genelinde %38 civarındadır. Enstitümüze ait olan arpa çeşitlerinin sertifikalı tohumculuk sektörü içindeki toplam payı Türkiye genelinde %35,8 civarındadır. Yem bitkileri alanında yonca çeşitlerimiz Türkiye genelinde %51,7'lik, korunga çeşitlerimiz ise %25,7'lik bir paya sahiptir.

Enstitümüzün geliştirdiği çeşitlerin Orijinal kademede tohumlukların üretimi, kuruma ait üretme çiftliğimizde gerçekleştirilmektedir. Orijinal kademe tohumlukların, kamu ve özel sektör tohumculuk kuruluşlarına satışı sözleşme ile yapılmaktadır.

AR-GE çalışmalarında bilinen ve uygulanan ıslah yöntemlerinin yanında biyoteknolojik yöntemleri de ıslaha entegre eden Enstitümüz, ıslah edilen ve üretilen çeşitlerle çiftçimize ve üreticimize önemli katkı sağlamanın yanında, bu çeşitlerden yeni ürün modelleri geliştirme çalışmalarını da Bitkisel Gıda Araştırma Merkezi bünyesinde yürütmektedir.

Enstitümüzün çeşitlerini tanıtım amaçlı hazırlanan bu çeşit kataloğunun çiftçilere, tohum üreticilerine, tarım sektöründe çalışanlara faydalı olmasını temenni ederim. Bu vesile ile Enstitümüzün güzide personellerine ve bu çalışmalarda bizleri destekleyen Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne teşekkürlerimi sunarım.

Dr. Hümeysra YAMAN
Enstitü Müdürü

AYDANHANIM

İKİ SIRALI - MALTLIK ARPA

TESCİL YILI : 2002



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



AYDANHANIM

İKİ SIRALI - MALTLIK ARPA

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: 2 sıralı, kılçıklı, düzgün ve uzun başaklı, ince kavuzlu beyaz iri daneli, geniş-uzun yapraklı, 95-115 cm boyundadır.
Tarımsal Özellikleri	: Kışlık gelişme tabiatında, yatmaya dayanıklı, kardeşlenmesi yüksek, suya ve azota tepkisi iyi, eş zamanlı oluma sahip, orta-geççi, başak kırıcılığı yok ve kolay harmanlanabilir özelliktedir.
Verim Özellikleri	: Destek sulu koşullarda 450-550 kg/da'dır.
Teknolojik Özellikleri	: 1000 dane ağırlığı 45-50 g; Protein oranı % 9,5-11,5 ; Elek üstü (2,5 mm) % 95-98 (destek sulu şartlarda)'dır.
Hastalık Durumu	: Arpa yaprak lekesi ve arpa çizgili yaprak lekesi hastalıklarına orta dayanıklıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: İç Anadolu ve Geçit bölgelerinin yarı taban/tabana ve destek sulama yapılan alanlarına önerilir.
Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:	
Tohumluk miktarı	: 20-22 kg/da sertifikalı tohum
Ekim zamanı	: 1-15 Ekim tarihleri arası
Ekim derinliği	: 4-5 cm
Gübreleme	: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar kullanılmalıdır.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

ZEYNEL AĞA

İKİ SIRALI - MALLIK ARPA

TESCİL YILI : 2003



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



ZEYNEL AĞA

İKİ SIRALI - MALTLIK ARPA

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Saplar 80-100 cm, yatmaya dayanıklı, açık yeşil ve yarı dik. 2 sıralı, uzun, sık, yarı dik, kılıçları paralel ve dişlidir.
Tarımsal Özellikleri	: Alternatif gelişme tabiatlıdır. Kışa ve yatmaya dayanıklı, orta erkenci, suya ve gübreye reaksiyonu iyi ve yüksek verimli bir çeşittir.
Verim Özellikleri	: Destek sulu koşullarda 400-800 kg/da civarında
Teknolojik Özellikleri	: Maltlık kalitesi çok yüksektir. 1000 dane ağırlığı 34,5-42,5 gram; protein oranı 11,4-12,7; elek üstü (2,5 mm) % 87,8-96,8, ince kavuzlu dolgun iri danelidir.
Hastalık Durumu	: Arpa yaprak lekesi ve arpa çizgili yaprak lekesi hastalıklarına orta dayanıklıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: İç Anadolu ve Geçit bölgelerinin yarı taban/tabana ve destek sulama yapılan alanlarına önerilir.
Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:	
Tohumluk miktarı	: 20-22 kg/da sertifikalı tohum
Ekim zamanı	: 1-15 Ekim tarihleri arası
Ekim derinliği	: 4-5 cm
Gübreleme	: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar kullanılmalıdır.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

YALIN

2 SIRALI - KAVUZSUZ ARPA

TESCİL YILI : 2014



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



YALIN

2 SIRALI - KAVUZSUZ ARPA

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: 2 sıralı, kavuzsuz (çıplak), kılçıklı, orta uzun başaklı, beyaz-kehribar tane rengine sahip, orta-uzun boylu bir çeşittir.
Tarımsal Özellikleri	: Alternatif gelişme tabiatında, sağlam saplı yatmaya dayanıklı, kardeşlenme kapasitesi yüksek, suya ve azota tepkisi iyi, orta-geççi, eş zamanlı olgunlaşmaya sahip, başak kırıcılığı olmayan ve harmandan sonra kavuzu taneden ayrılan, yüksek verimli bir çeşittir.
Verim Özellikleri	: Destek sulu koşullarda 450-600 kg/da'dır.
Teknolojik Özellikleri	: 1000 tane ağırlığı 35.3-45.1 g, protein oranı % 12.9-17.9, hektolitre ağırlığı 76.5-80.0 kg/hl, 2.8-2.5 mm elek üstü değeri % 17.9-63.3 arasında değişmektedir.
Hastalık Durumu	: Arpa yaprak lekesi ve arpa çizgili yaprak lekesi hastalıklarına karşı orta dayanıklıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: İç Anadolu ve Geçit bölgelerinin yarı taban/tabana ve destek sulama yapılan alanlarına önerilir.
Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:	
Tohumluk miktarı	: 24-26 kg/da sertifikalı tohum
Ekim zamanı	: 1-15 Ekim (Kışlık) ve 1-15 Mart (Yazlık)
Ekim derinliği	: Kışlık ekimlerde 5 cm, yazlık ekimlerde 3 cm
Gübreleme	: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar kullanılmalıdır.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

TARM-92

İKİ SIRALI - YEMLİK ARPA

TESCİL YILI : 1992



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



TARM-92

İKİ SIRALI - YEMLİK ARPA

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: 2 sıralı, kılıçkılı, uzun başaklı, kavuzlu, beyaz daneli, ince uzun yapraklı, bitki boyu 90-100 cm'dir.
Tarımsal Özellikleri	: Alternatif gelişme tabiatında, yatmaya dayanıklı, kurak ve mikro element (Çinko ve Bor) toksisitesine toleranslı, kardeşlenme kapasitesi yüksek, ekim nöbetinde en istikrarlı, orta-erkenci, başak kırıcılığı yok ve kolay harmanlanabilir bir çeşittir.
Verim Özellikleri	: Kuru koşullarda 350-450 kg/da'dır.
Teknolojik Özellikleri	: 1000 dane ağırlığı 40-45 g; Protein oranı % 10-12; Elek üstü (2,5 mm <) % 85 ve biyolojik değeri orta (% 74,9)'dur.
Hastalık Durumu	: Arpa yaprak lekesi ve arpa çizgili yaprak lekesi hastalıklarına orta dayanıklıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: İç Anadolu ve Geçit Bölgelerinin yarı taban ve kıraç alanlarına tavsiye edilir.
Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:	
Tohumluk miktarı	: 20-22 kg/da sertifikalı tohum
Ekim zamanı	: 1-15 Ekim tarihleri arası
Ekim derinliği	: 4-5 cm
Gübreleme	: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar kullanılmalıdır.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

AKAR

İKİ SIRALI - YEMLİK ARPA

TESCİL YILI : 2012



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



AKAR

İKİ SIRALI - YEMLİK ARPA

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: 2 sıralı, kılıçkılı, uzun ve düzgün başaklı, beyaz ve iri taneli, geniş uzun yapraklı ve uzun boylu bir çeşittir.
Tarımsal Özellikleri	: Kışlık gelişme tabiatında, sağlam saplı yatmaya dayanıklı, kardeşlenme kapasitesi yüksek, suya ve azota tepkisi iyi, eş zamanlı olgunlaşmaya sahip, başaklanma zamanı orta, başak kırılıcılığı olmayan ve kolay harmanlanabilen, yüksek verimli bir çeşittir.
Verim Özellikleri	: Destek sulu koşullarda 450-650 kg/da'dır.
Teknolojik Özellikleri	: 1000 tane ağırlığı 35-56 g, protein oranı % 9-15.5, hektolitreye ağırlığı 65.2-71 kg/hl, 2.8-2.5 mm elek üstü değeri % 60.8-96.2 arasında değişmektedir.
Hastalık Durumu	: Arpa yaprak lekesi ve arpa çizgili yaprak lekesi hastalıklarına karşı orta dayanıklıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: İç Anadolu ve Geçit bölgelerinin yarı taban/tabana ve destek sulama yapılan alanlarına önerilir.
Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:	
Tohumluk miktarı	: 20-22 kg/da sertifikalı tohum
Ekim zamanı	: 1-15 Ekim tarihleri arası
Ekim derinliği	: 4-5 cm
Gübreleme	: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar kullanılmalıdır.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

BURAKBEY

İKİ SIRALI - YEMLİK ARPA

TESCİL YILI : 2013



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



BURAKBEY

İKİ SIRALI - YEMLİK ARPA

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: 2 sıralı, kılıçkılı, uzun ve düzgün başaklı, beyaz ve iri taneli, geniş uzun yapraklı ve uzun boylu bir çeşittir.
Tarımsal Özellikleri	: Kışlık gelişme tabiatında, sağlam saplı yatmaya dayanıklı, kardeşlenme kapasitesi yüksek, suya ve azota tepkisi iyi, eş zamanlı olgunlaşmaya sahip, başaklanma zamanı orta, başak kırıcılığı olmayan ve kolay harmanlanabilen, yüksek verimli bir çeşittir.
Verim Özellikleri	: Kuru koşullarda 350-550 kg/da, destek sulu koşullarda 450-820 kg/da'dır.
Teknolojik Özellikleri	: 1000 tane ağırlığı 33.4 - 48.0g, protein oranı % 9.9-15.9, hektolitreye ağırlığı 63.0-70.5 kg/hl, 2.8-2.5 mm elek üstü değeri % 49.5-93.4 arasında değişmektedir.
Hastalık Durumu	: Arpa yaprak lekesi ve arpa çizgili yaprak lekesi hastalıklarına karşı orta dayanıklıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: İç Anadolu ve Geçit bölgelerinin yarı taban/tabana ve destek sulama yapılan alanlarına önerilir.
Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:	
Tohumluk miktarı	: 20-22 kg/da sertifikalı tohum
Ekim zamanı	: 1-15 Ekim tarihleri arası
Ekim derinliği	: 4-5 cm
Gübreleme	: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar kullanılmalıdır.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

TOSUNPAŞA

İKİ SIRALI - YEMLİK ARPA

TESCİL YILI : 2016



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



TOSUNPAŞA

İKİ SIRALI - YEMLİK ARPA

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Morfolojik Özellikleri	: 2 sıralı, kılıçkılı, uzun ve düzgün başaklı, beyaz ve iri taneli, geniş uzun yapraklı ve uzun boylu bir çeşittir.
Tarımsal Özellikleri	: Kışlık gelişme tabiatında, sağlam saplı yatmaya dayanıklı, kardeşlenme kapasitesi yüksek, suya ve azota tepkisi iyi, eş zamanlı olgunlaşmaya sahip, başaklanma zamanı orta- geçici, başak kırıcılığı olmayan ve kolay harmanlanabilen, yüksek verimli bir çeşittir.
Verim Özellikleri	: Kuru koşullarda 340-680 kg/da'dır.
Teknolojik Özellikleri	: 1000 tane ağırlığı 42.3 - 50.9 g, protein oranı %11.2-15.3, hektolitreye ağırlığı 65.9-70.3 kg/hl, 2.8-2.5 mm elek üstü değeri % 84.5-97.7 arasında değişmektedir.
Hastalık Durumu	: Tahıl Kist Nematoduna dayanıklıdır. Arpa yaprak lekesi ve arpa çizgili yaprak lekesi hastalıklarına karşı orta dayanıklıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: İç Anadolu ve Geçit Bölgelerinin yarı taban ve kırak alanlarına tavsiye edilir.
Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:	
Tohumluk miktarı	: 20-22 kg/da sertifikalı tohum
Ekim zamanı	: 1-15 Ekim tarihleri arası
Ekim derinliği	: 4-5 cm
Gübreleme	: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar kullanılmalıdır.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

BOZLAK

İKİ SIRALI - YEMLİK ARPA

TESCİL YILI : 2018



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



BOZLAK

İKİ SIRALI - YEMLİK ARPA

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: 2 sıralı, kılçıklı, uzun ve düzgün başaklı, beyaz ve iri taneli, geniş uzun yapraklı ve uzun boylu bir çeşittir.
Tarımsal Özellikleri	: Kışlık gelişme tabiatında, sağlam saplı yatmaya dayanıklı, kardeşlenme kapasitesi yüksek, suya ve azota tepkisi iyi, eş zamanlı olgunlaşmaya sahip, başaklanma zamanı orta- geçci, başak kırılıcılığı olmayan ve kolay harmanlanabilen, yüksek verimli bir çeşittir.
Verim Özellikleri	: Kuru koşullarda 265-790 kg/da'dır.
Teknolojik Özellikleri	: 1000 tane ağırlığı 36,9 - 47,8 g, protein oranı %12.4-17.3, hektolitreye ağırlığı 61.4-70.8 kg/hl, 2.8-2.5 mm elek üstü değeri % 63.9-95.8 arasında değişmektedir.
Hastalık Durumu	: Tahıl Kist Nematoduna dayanıklıdır. Arpa yaprak lekesi ve arpa çizgili yaprak lekesi hastalıklarına karşı orta dayanıklıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: İç Anadolu ve Geçit Bölgelerinin yarı taban ve kıraç alanlarına tavsiye edilir.
Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:	
Tohumluk miktarı	: 20-22 kg/da sertifikalı tohum
Ekim zamanı	: 1-15 Ekim tarihleri arası
Ekim derinliği	: 4-5 cm
Gübreleme	: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar kullanılmalıdır.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

ANKA 06

İKİ SIRALI - YEMLİK ARPA

TESCİL YILI : 2019



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



ANKA 06

İKİ SIRALI - YEMLİK ARPA

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: 2 sıralı, kılıçkılı, uzun ve düzgün başaklı, beyaz taneli, geniş uzun yapraklı ve orta-uzun boylu bir çeşittir.
Tarımsal Özellikleri	: Kışlık gelişme tabiatında, sağlam saplı ve yatmaya dayanıklı, kardeşlenme kapasitesi yüksek, suya ve azota tepkisi iyi, eş zamanlı olgunlaşmaya sahip, başaklanma zamanı orta, başak kırılıcılığı olmayan ve kolay harmanlanabilen, yüksek verimli bir çeşittir.
Verim Özellikleri	: Kuru koşullarda 350-670 kg/da'dır.
Teknolojik Özellikleri	: 1000 tane ağırlığı 39.8-49.1 g, protein oranı %13.4-16.8, hektolitre ağırlığı 63.4-67.8 kg/hl, 2.8-2.5 mm elek üstü değeri % 64.9-96.7 arasında değişmektedir.
Hastalık Durumu	: Arpa yaprak lekesi ve arpa çizgili yaprak lekesi hastalıklarına karşı orta dayanıklıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: İç Anadolu ve Geçit Bölgelerinin yarı taban ve kıraç alanlarına tavsiye edilir.
Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:	
Tohumluk miktarı	: 20-22 kg/da sertifikalı tohum
Ekim zamanı	: 1-15 Ekim tarihleri arası
Ekim derinliği	: 4-5 cm
Gübreleme	: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar kullanılmalıdır.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

ASİL

İKİ SIRALI - YEMLİK ARPA

TESCİL YILI : 2019



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



ASİL

İKİ SIRALI - YEMLİK ARPA

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: 2 sıralı, kılıçkılı, uzun ve düzgün başaklı, beyaz taneli, geniş uzun yapraklı ve orta boylu bir çeşittir.
Tarımsal Özellikleri	: Kışlık gelişme tabiatında, sağlam saplı ve yatmaya dayanıklı, kardeşlenme kapasitesi yüksek, suya ve azota tepkisi iyi, eş zamanlı olgunlaşmaya sahip, başaklanma zamanı orta, başak kırılıcılığı olmayan ve kolay harmanlanabilen, yüksek verimli bir çeşittir.
Verim Özellikleri	: Kuru koşullarda 340-705 kg/da'dır.
Teknolojik Özellikleri	: 1000 tane ağırlığı 33.7 - 47.3 g, protein oranı %12.8-16.1, hektolitreye ağırlığı 64.1-73.1 kg/hl, 2.8-2.5 mm elek üstü değeri % 54.1-91.7 arasında değişmektedir.
Hastalık Durumu	: Arpa yaprak lekesi ve arpa çizgili yaprak lekesi hastalıklarına karşı orta dayanıklıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: İç Anadolu ve Geçit Bölgelerinin yarı taban ve kıraç alanlarına tavsiye edilir.
Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:	
Tohumluk miktarı	: 20-22 kg/da sertifikalı tohum
Ekim zamanı	: 1-15 Ekim tarihleri arası
Ekim derinliği	: 4-5 cm
Gübreleme	: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar kullanılmalıdır.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

CACABEY

İKİ SIRALI - YEMLİK ARPA

TESCİL YILI : 2019



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



CACABEY

İKİ SIRALI - YEMLİK ARPA

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: 2 sıralı, kılıçkılı, uzun başaklı, beyaz taneli, geniş uzun yapraklı ve orta boylu bir çeşittir.
Tarımsal Özellikleri	: Kışlık gelişme tabiatında, sağlam saplı ve yatmaya dayanıklı, kardeşlenme kapasitesi yüksek, suya ve azota tepkisi iyi, eş zamanlı olgunlaşmaya sahip, başaklanma zamanı orta, başak kırıcılığı olmayan ve kolay harmanlanabilen, yüksek verimli ve geniş adaptasyon kabiliyetine sahip bir çeşittir.
Verim Özellikleri	: Kuru koşullarda 350-590 kg/da'dır.
Teknolojik Özellikleri	: 1000 tane ağırlığı 34.0-51.9 g, protein oranı %13.1-16.9, hektolitreye ağırlığı 62.6-69.2kg/hl, 2.8-2.5 mm elek üstü değeri % 61.1-96.7 arasında değişmektedir.
Hastalık Durumu	: Arpa yaprak lekesi ve arpa çizgili yaprak lekesi hastalıklarına karşı orta dayanıklıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: İç Anadolu ve Geçit Bölgelerinin yarı taban ve kıraç alanlarına tavsiye edilir.
Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:	
Tohumluk miktarı	: 20-22 kg/da sertifikalı tohum
Ekim zamanı	: 1-15 Ekim tarihleri arası
Ekim derinliği	: 4-5 cm
Gübreleme	: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar kullanılmalıdır.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

MİSKET

İKİ SIRALI - YEMLİK ARPA

TESCİL YILI : 2020



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



MİSKET

İKİ SIRALI - YEMLİK ARPA

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: 2 sıralı, kılıçkılı, uzun başaklı, beyaz taneli, geniş uzun yapraklı ve orta boylu bir çeşittir.
Tarımsal Özellikleri	: Kışlık gelişme tabiatında, sağlam saplı ve yatmaya dayanıklı, kardeşlenme kapasitesi yüksek, suya ve azota tepkisi iyi, eş zamanlı olgunlaşmaya sahip, başaklanma zamanı orta, başak kırıcılığı olmayan ve kolay harmanlanabilen, yüksek verimli ve geniş adaptasyon kabiliyetine sahip bir çeşittir.
Verim Özellikleri	: Kuru koşullarda 410-540 kg/da'dır.
Teknolojik Özellikleri	: 1000 tane ağırlığı 33.8-42.7 g , protein oranı %11.4-16.2, hektolitreye ağırlığı 61.0-62.5 kg/hl, 2.8-2.5 mm elek üstü değeri % 49.5-72.1 arasında değişmektedir.
Hastalık Durumu	: Arpa yaprak lekesi ve arpa çizgili yaprak lekesi hastalıklarına karşı orta dayanıklıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: İç Anadolu ve Geçit Bölgelerinin yarı taban ve kıraç alanlarına tavsiye edilir.
Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:	
Tohumluk miktarı	: 20-22 kg/da sertifikalı tohum
Ekim zamanı	: 1-15 Ekim tarihleri arası
Ekim derinliği	: 4-5 cm
Gübreleme	: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar kullanılmalıdır.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

CİRİT

İKİ SIRALI - YEMLİK ARPA

TESCİL YILI : 2021



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



CİRİT

İKİ SIRALI - YEMLİK ARPA

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: 2 sıralı, kılçıklı, uzun başaklı, beyaz taneli ve orta-uzun boylu bir çeşittir.
Tarımsal Özellikleri	: Kışlık gelişme tabiatında, sağlam saplı ve yatmaya dayanıklı, kardeşlenmesi iyi, suya ve azota tepkisi iyi, eş zamanlı olgunlaşmaya sahip, başaklanma zamanı orta-geç, başak kırıcılığı olmayan ve kolay harmanlanabilen, yüksek verimli ve geniş adaptasyon kabiliyetine sahip bir çeşittir.
Verim Özellikleri	: Kuru koşullarda 404-621 kg/da'dır.
Teknolojik Özellikleri	: 1000 tane ağırlığı 37.2-40.1 g , protein oranı % 13.3-14.4, hektolitreye ağırlığı 57.1-67.9 kg/hl, 2.8-2.5 mm elek üstü değeri % 41.0-77.8 arasında değişmektedir.
Hastalık Durumu	: Arpa yaprak lekesi ve arpa çizgili yaprak lekesi hastalıklarına karşı orta dayanıklıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: İç Anadolu ve Geçit Bölgelerinin yarı taban ve kıraç alanlarına tavsiye edilir.

Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:

Tohumluk miktarı	: 20-22 kg/da sertifikalı tohum
Ekim zamanı	: 1-15 Ekim tarihleri arası
Ekim derinliği	: 4-5 cm
Gübreleme	: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar kullanılmalıdır.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

SAYIM 40

İKİ SIRALI - YEMLİK ARPA

TESCİL YILI : 2021



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



SAYIM 40

İKİ SIRALI - YEMLİK ARPA

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: 2 sıralı, kılıçkılı, orta-uzun başaklı, beyaz taneli ve orta boylu bir çeşittir.
Tarımsal Özellikleri	: Kışlık gelişme tabiatında, sağlam saplı ve yatmaya dayanıklı, çok yüksek kardeşlenme kapasitesine sahip, suya ve azota tepkisi iyi, eş zamanlı olgunlaşmaya sahip, başaklanma zamanı orta, başak kırılıcılığı olmayan ve kolay harmanlanabilen, çok yüksek verimli ve geniş adaptasyon kabiliyetine sahip bir çeşittir.
Verim Özellikleri	: Kuru koşullarda 488-741 kg/da'dır.
Teknolojik Özellikleri	: 1000 tane ağırlığı 39.0-42.3 g, protein oranı % 13.4-14.2, hektolitreye ağırlığı 63.4-70.8 kg/hl, 2.8-2.5 mm elek üstü değeri % 48.2-69.0 arasında değişmektedir.
Hastalık Durumu	: Arpa yaprak lekesi ve arpa çizgili yaprak lekesi hastalıklarına karşı orta dayanıklıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: İç Anadolu ve Geçit Bölgelerinin yarı taban ve kıraç alanlarına tavsiye edilir.
Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:	
Tohumluk miktarı	: 20-22 kg/da sertifikalı tohum
Ekim zamanı	: 1-15 Ekim tarihleri arası
Ekim derinliği	: 4-5 cm
Gübreleme	: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar kullanılmalıdır.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

SİNANBEY

İKİ SIRALI - YEMLİK ARPA

TESCİL YILI : 2021



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



SİNANBEY

İKİ SIRALI - YEMLİK ARPA

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: 2 sıralı, kılıçkılı, uzun başaklı, beyaz taneli ve orta-uzun boylu bir çeşittir.
Tarımsal Özellikleri	: Kışlık gelişme tabiatında, sağlam saplı ve yatmaya dayanıklı, kardeşlenmesi iyi, suya ve azota tepkisi iyi, eş zamanlı olgunlaşmaya sahip, başaklanma zamanı orta, başak kırıcılığı olmayan ve kolay harmanlanabilen, yüksek verimli ve geniş adaptasyon kabiliyetine sahip bir çeşittir.
Verim Özellikleri	: Kuru koşullarda 377-680 kg/da'dır.
Teknolojik Özellikleri	: 1000 tane ağırlığı 40.7-47.9 g , protein oranı % 13.0-14.6, hektolitreye ağırlığı 62.4-70.8 kg/hl, 2.8-2.5 mm elek üstü değeri % 37.4-77.6 arasında değişmektedir.
Hastalık Durumu	: Arpa yaprak lekesi ve arpa çizgili yaprak lekesi hastalıklarına karşı orta dayanıklıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: İç Anadolu ve Geçit Bölgelerinin yarı taban ve kıraç alanlarına tavsiye edilir.
Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:	
Tohumluk miktarı	: 20-22 kg/da sertifikalı tohum
Ekim zamanı	: 1-15 Ekim tarihleri arası
Ekim derinliği	: 4-5 cm
Gübreleme	: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar kullanılmalıdır.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

KAŞMİR

İKİ SIRALI - YEMLİK ARPA

TESCİL YILI : 2025

“Suluya güç, tarlaya bereket.”



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



KAŞMİR

İKİ SIRALI - YEMLİK ARPA

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: 2 sıralı, kılıçkılı, uzun başaklı, beyaz taneli ve kısa-orta boylu bir çeşittir.
Tarımsal Özellikleri	: Kışlık gelişme tabiatında, sağlam saplı ve yatmaya dayanıklı, kardeşlenmesi iyi, suya ve azota tepkisi iyi, eş zamanlı olgunlaşmaya sahip, başaklanma zamanı orta geç, başak kırılıcılığı olmayan ve kolay harmanlanabilen, yüksek verimli ve geniş adaptasyon kabiliyetine sahip bir çeşittir.
Verim Özellikleri	: Destek sulu koşullarda 620-830 kg/da' dır.
Teknolojik Özellikleri	: 1000 tane ağırlığı 33.1-43.6 g, protein oranı % 14.5-16.1, hektolitreye ağırlığı 61.3-69.7 kg/hl, 2.8-2.5 mm elek üstü değeri % 24.1-92.0 arasında değişmektedir.
Hastalık Durumu	: Arpa yaprak lekesi ve arpa çizgili yaprak lekesi hastalıklarına karşı orta dayanıklıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: İç Anadolu ve Geçit Bölgelerinin sulanan ekim alanlarına tavsiye edilir.
Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:	
Tohumluk miktarı	: 20-22 kg/da sertifikalı tohum
Ekim zamanı	: 1-15 Mart tarihleri arası (Türkiye),
Ekim derinliği	: 4-5 cm
Gübreleme	: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar kullanılmalıdır.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

AVCI-2002

ALTI SIRALI - YEMLİK ARPA

TESCİL YILI : 2002



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



AVCI-2002

ALTI SIRALI - YEMLİK ARPA

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: 6 sıralı, kılçıklı, orta ve uzun başaklı, beyaz homojen daneli, geniş koyu yapraklı, 95-105 cm bitki boyundadır.
Tarımsal Özellikleri	: Kışlık, yatmaya dayanıklı, suya ve azota tepkisi çok iyi, yüksek kardeşlenme ve biyolojik verime sahip, orta-geççi, başak kırılıcılığı olmayan ve kolay harmanlanabilir bir çeşittir.
Verim Özellikleri	: Destek sulu koşullarda 450-600 kg/da'dır.
Teknolojik Özellikleri	: 1000 dane ağırlığı 38-40 g; Protein oranı % 9-11; Elek üstü (2,5 mm <) % 80-85 (sulu şartlarda)'dır.
Hastalık Durumu	: Arpa yaprak lekesi, arpa çizgili yaprak lekesi ve kar küfü hastalıklarına dayanıklıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: İç Anadolu, Geçit ve Doğu Anadolu Bölgesinin yüksek alanlarının taban/yarı taban ve destek sulama yapılan alanlarına yalın ve fiğ ile karışımlarda tavsiye edilir.

Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:

Tohumluk miktarı	: 20-22 kg/da sertifikalı tohum
Ekim zamanı	: 1-15 Ekim tarihleri arası
Ekim derinliği	: 4-5 cm
Gübreleme	: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar kullanılmalıdır.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

BEŞPARMAK

ALTI SIRALI - YAZLIK YEMLİK ARPA

TESCİL YILI : 2021

“Verimde Zirvenin Adı”



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



BEŞPARMAK

ALTI SIRALI - YAZLIK YEMLİK ARPA

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: 6 sıralı, kılıçkılı, orta-uzun başaklı, beyaz taneli, geniş uzun yapraklı ve kısa-orta boylu
Tarımsal Özellikleri	: Yazlık gelişme tabiatında, sağlam saplı ve yatmaya dayanıklı, kardeşlenme kapasitesi yüksek, suya ve azota tepkisi iyi, eş zamanlı olgunlaşmaya sahip, başaklanma zamanı erkenci, başak kırıcılığı olmayan ve kolay harmanlanabilen, yüksek verimli ve geniş adaptasyon kabiliyetine sahip bir çeşittir.
Verim Özellikleri	: Sulu koşullarda 350-710 kg/da'dır (Türkiye- İç Anadolu). Kuru koşullarda 250-500 (KKTC)
Teknolojik Özellikleri	: 1000 tane ağırlığı 33.8-42.7 g , protein oranı %11.4-16.2, hektolitreye ağırlığı 61.0-62.5 kg/hl, 2.8-2.5 mm elek üstü değeri % 49.5-72.1 arasında değişmektedir.
Hastalık Durumu	: Arpa yaprak lekesi ve arpa çizgili yaprak lekesi hastalıklarına karşı orta dayanıklıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: İç Anadolu ve Geçit Bölgelerinin sulama yapılan alanlarında yazlık ekiliş için tavsiye edilir.
Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:	
Tohumluk miktarı	: 20-22 kg/da sertifikalı tohum
Ekim zamanı	: 1-15 Mart tarihleri arası (Türkiye), 10-30 Kasım tarihleri arası (KKTC)
Ekim derinliği	: 3-4 cm
Gübreleme	: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar kullanılmalıdır.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

REŞATBEY

ALTI SIRALI - YAZLIK YEMLİK ARPA

TESCİL YILI : 2022

“Kıbrıs’ın yeni değeri”



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



REŞATBEY

ALTI SIRALI - YAZLIK YEMLİK ARPA

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: 6 sıralı, düz kılçıklı, uzun başaklı, beyaz taneli, geniş uzun yapraklı ve uzun boylu
Tarımsal Özellikleri	: Yazlık gelişme tabiatında, sağlam saplı ve yatmaya dayanıklı, kardeşlenme kapasitesi yüksek, suya ve azota tepkisi iyi, eş zamanlı olgunlaşmaya sahip, başaklanma zamanı erkenci, başak kırılıcılığı olmayan ve kolay harmanlanabilen, yüksek verimli ve geniş adaptasyon kabiliyetine sahip bir çeşittir.
Verim Özellikleri	: Sulu koşullarda 450-730 kg/da'dır (Türkiye - İç Anadolu). Kuru koşullarda 200-450 (KKTC)
Teknolojik Özellikleri	: 1000 tane ağırlığı 40.5-57.3 g, protein oranı %11.9-15.1, hektolitreye ağırlığı 64.0-65.8 kg/hl, 2.8-2.5 mm elek üstü değeri % 80.7-90.4 arasında değişmektedir.
Hastalık Durumu	: Arpa yaprak lekesi ve ağ benek hastalıklarına karşı orta dayanıklıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: İç Anadolu ve Geçit Bölgelerinin sulama yapılan alanlarında yazlık ekiliş için tavsiye edilir.
Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:	
Tohumluk miktarı	: 20-22 kg/da sertifikalı tohum
Ekim zamanı	: 1-15 Mart tarihleri arası (Türkiye), 10-30 Kasım tarihleri arası (KKTC)
Ekim derinliği	: 3-4 cm
Gübreleme	: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar kullanılmalıdır.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

ATASIYEZ

KAPLICA BUĞDAYI (SİYEZ)

TESCİL YILI : 2021

TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



ATASIYEZ

KAPLICA BUĞDAYI (ŞİYEZ)

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Beyaz başaklı, başakları orta-uzun, kılçıklı ve uzun boyludur.
Tarımsal Özellikleri	: Alternatif gelişme tabiatlı ve geçci, kardeşlenmesi yüksek, yatmaya orta dayanıklı, sulanması ve aşırı gübrelenmesi önerilmez. Tane dökmeyen ve kavuzlu taneye sahip ince saplıdır.
Verim Özellikleri	: Kuru şartlarda 100-350 kg/da
Teknolojik Özellikleri	: Bin tane ağırlığı 21.8-27.2 g, hektolitreye ağırlığı 75.7-78.1 kg/hl, protein oranı %17.5-20.0, zeleni sedimentasyon 16-20 ml, alveograf enerji değeri 42, su absorpsiyonu %57.1, un verimi %57.1-63.1
Hastalık Durumu	: Sarı pasa toleranslıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: Orta Anadolu ve Geçit Kuşağı Bölgelerinin yazı serin geçen kışa ve marjinal alanlarına önerilmektedir.
Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:	
Tohumluk miktarı	: 15-16 kg/da
Ekim zamanı	: 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arası
Ekim derinliği	: 4-5 cm
Gübreleme	: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar kullanılmalıdır.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

MERGÜZE

KAPLICA BUĞDAYI (SİYEZ)

TESCİL YILI : 2021



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



MERGÜZE

KAPLICA BUĞDAYI (ŞİYEZ)

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Beyaz başaklı, başakları orta-uzun, kılıçkılı, kavuzlu ve uzun boyludur.
Tarımsal Özellikleri	: Alternatif gelişme tabiatlı ve geçci, kardeşlenmesi yüksek, yatmaya dayanıklı. Tane dökmeyen ve kavuzlu taneye sahip ince saplıdır.
Verim Özellikleri	: Kuru şartlarda 100-350 kg/da
Teknolojik Özellikleri	: Bin tane ağırlığı 22.2-29.5 g, hektolitre ağırlığı 76.5-78.3 kg/hl, protein oranı %16.7-17.4, zeleny sedimentasyon 16-26 ml, alveograf enerji değeri 60, su absorpsiyonu %56.9, un verimi %61.7-66.7, yaş gluten %40.6, kuru gluten %14, gluten indeksi %41.8
Hastalık Durumu	: Sarı pasa toleranslıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: Orta Anadolu ve Geçit Kuşağı Bölgelerinin yazı serin geçen kıraç ve marjinal alanlarına önerilmektedir.
Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:	
Tohumluk miktarı	: 15-16 kg/da
Ekim zamanı	: 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arası
Ekim derinliği	: 4-5 cm
Gübreleme	: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar kullanılmalıdır.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

YENİ KAFKAS

KAVILCA BUĞDAYI

TESCİL YILI : 2021



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



YENİ KAFKAS

KAVILCA BUĞDAYI

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Beyaz başaklı, başakları orta uzun, kılçıklı, kavuzlu ve orta boyludur.
Tarımsal Özellikleri	: Alternatif gelişme tabiatlı ve orta erkenci, soğuğa ve kurağa orta-dayanıklı, kardeşlenmesi yüksek, yatmaya orta dayanıklı, aşırı gübrelenmesi önerilmez. Tane dökmeyen ve kavuzlu taneye sahiptir.
Verim Özellikleri	: Kuru şartlarda 200-350 kg/da
Teknolojik Özellikleri	: Bin tane ağırlığı 30.1-31.2 g, hektolitreye ağırlığı 72.3-76.3 kg/hl, protein oranı %16.1-18.8, camsılık %96-98, SDS sedimentasyon 9-13 ml, irmik B sarılık değeri 18.9-19.92, irmik verimi %64.3-65.4
Hastalık Durumu	: Sarı pasa toleranslıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: Orta Anadolu ve Geçit Kuşağı Bölgelerinin kıraç ve marjinal alanlarına önerilmektedir.

Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:

Tohumluk miktarı	: 15-16 kg/da
Ekim zamanı	: 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arası
Ekim derinliği	: 4-5 cm
Gübreleme	: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar kullanılmalıdır.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

BAYRAKTAR-2000

EKMEKLİK BUĞDAY

TESCİL YILI : 2000



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



BAYRAKTAR-2000

EKMEKLİK BUĞDAY

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Beyaz başaklı, kılıçkılı, beyaz ve yarı sert taneli, orta boyludur.
Tarımsal Özellikleri	: Kışlık gelişme tabiatlı ve erkencidir, erkenciliği nedeniyle ilkbaharda gelen kuraklardan az etkilenmektedir. Yatmaya dayanıklı, gübreye tepkisi yüksek, tane dökmeyen ve harman olma kabiliyeti iyi bir çeşittir. İç Anadolu ve Geçit bölgelerinin tamamına adapte olabilmektedir.
Verim Özellikleri	: Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit Bölgelerinde 350-400 kg/da verim potansiyeline sahiptir.
Teknolojik Özellikleri	: Bin tane ağırlığı 26,1-39,7 g, Protein oranı % 10- % 14,5, hektolitreye ağırlığı 70,4-81,8 kg, alveograf değeri 89-180 J, zeleny sedimantasyon değeri 26 ml-45 ml, un verimi % 60- % 73,3 ve absorpsiyon değeri % 48,7- % 68,4 arasındadır. Ekmeklik kalitesi ortadır.
Hastalık Durumu	: Sarı pasa toleranslı, sürme ve rastık için tohum ilaçlaması yapılmalıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: İç Anadolu ve Geçit bölgelerinin buğday tarımı yapılan marjinal, kıraç ve yarı taban alanlarına önerilmektedir.
Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:	
Tohumluk miktarı	: 18-20 kg/da
Ekim zamanı	: 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arası
Ekim derinliği	: 4-5 cm
Gübreleme	: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar kullanılmalıdır.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

DEMİR-2000

EKMEKLİK BUĞDAY

TESCİL YILI : 2000



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



DEMİR-2000

EKMEKLİK BUĞDAY

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Beyaz başaklı, kılıçkılı, kırmızı sert taneli, orta-uzun boylu bir çeşittir.
Tarımsal Özellikleri	: Alternatif gelişme tabiatlı ve orta geçcidir. Soğuğa, kurağa ve yatmaya mukavemeti yüksek, tane dökmeyen ve harman olma kabiliyeti iyi olan bir çeşittir. Gübreye tepkisi yüksektir. Destek sulu şartlarda yüksek tane ve sap verimine sahiptir.
Verim Özellikleri	: Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit Bölgelerinde kuru şartlarda 350-400 kg/da, destek sulu şartlarda 500 – 600 kg/da verim potansiyeline sahiptir.
Teknolojik Özellikleri	: Bin tane ağırlığı 30-40,6 g, Protein oranı % 10- % 17,5, Hektolitreye ağırlığı 73,4-81,8 kg, Alveograf değeri 149-255 J, Zeleny sedimentasyon değeri 26-54 ml, un verimi % 62-% 70,8 ve Absorbsiyon değeri % 51,7-% 63,4 arasındadır.
Hastalık Durumu	: Sarı pasa orta hassas, sürme ve rastık için tohum ilaçlaması yapılmalıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: İç Anadolu ve Geçit bölgelerinin buğday tarımı yapılan yarı taban ve taban alanlarına önerilmektedir.

Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:

Tohumluk miktarı	: 18-20 kg/da
Ekim zamanı	: 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arası
Ekim derinliği	: 4-5 cm
Gübreleme	: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar kullanılmalıdır.



TOSUNBEY

EKMEKLİK BUĞDAY

TESCİL YILI : 2004



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



TOSUNBEY

EKMEKLİK BUĞDAY

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Kılçıklı ve beyaz başaklı, beyaz tanelidir. Başaktaki tane sayısı oldukça yüksek, sağlam saplı ve orta boyludur.
Tarımsal Özellikleri	: Alternatif gelişme tabiatlı, soğuğa, kurağa ve yatmaya dayanıklı, gübreye tepkisi iyi olan bir çeşittir.
Verim Özellikleri	: Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit Bölgelerinde kuru şartlarda 300-400 kg/da, destek sulu şartlarda 450 - 600 kg/da verim potansiyeline sahiptir.
Teknolojik Özellikleri	: Bin tane ağırlığı 28-40,4 g, protein oranı % 12-16,5, hektolitreye ağırlığı 70,9-81 kg alveograf değeri 150-369 j, zeleniy sedimentasyon değeri 32-68 ml, un verimi % 62-79,8 ve absorpsiyon değeri % 53,9-68 arasındadır. 1. Sınıf ekmeklik kalitesine sahiptir.
Hastalık Durumu	: Sarı pasa orta hassas, sürme ve rastık için tohum ilaçlaması yapılmalıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: İç Anadolu ve Geçit bölgeleri ile benzeri yörelerin yarı taban ve taban alanlarına önerilmektedir.
Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:	
Tohumluk miktarı	: 18-20 kg/da
Ekim zamanı	: 25 Ekim-25 Kasım tarihleri arası
Ekim derinliği	: 4-5 cm
Gübreleme	: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar kullanılmalıdır.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

ŞANLI

EKMEKLİK BUĞDAY

TESCİL YILI : 2016



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



ŞANLI

EKMEKLİK BUĞDAY

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Beyaz başaklı, kılıksız, kırmızı sert taneli, orta boylu bir çeşittir.
Tarımsal Özellikleri	: Alternatif gelişme tabiatlı ve başaklanması orta erkencidir. Soğuğa, kurağa ve yatmaya mukavemeti yüksek, tane dökmeyen ve harman olma kabiliyeti iyi olan bir çeşittir. Gübreye tepkisi yüksektir. Destek sulu şartlarda yüksek tane verimine ve sap verimine sahiptir.
Verim Özellikleri	: Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit Bölgelerinin kuru şartlarında 400 - 540 kg/da, destek sulu şartlarında 600 - 750 kg/da verime sahiptir.
Teknolojik Özellikleri	: Bin tane ağırlığı 32,7-42,6 g, protein oranı %12,4 - % 16,8, hektolitre 77,4-82,2 kg/hl, Alveograf enerji değeri (W) 120 J- 252 J, Zeleny sedimantasyon değeri 35-57 ml, un verimi % 68,3-% 71,9 ve Farinograf Absorbsiyon değeri % 58,3-% 64,1 arasındadır.
Hastalık Durumu	: Sarı pasa orta dayanıklı, sürme ve rastık için tohum ilaçlaması yapılmalıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: İç Anadolu ve Geçit bölgelerinin buğday tarımı yapılan taban ve yarı taban alanlarına ve destek sulama yapılan alanlara önerilmektedir.
Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:	
Tohumluk miktarı	: 18-20 kg/da
Ekim zamanı	: 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arası
Ekim derinliği	: 4-5 cm
Gübreleme	: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar kullanılmalıdır.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

AYTEN ABLA

EKMEKLİK BUĞDAY

TESCİL YILI : 2019



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



AYTEN ABLA

EKMEKLİK BUĞDAY

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Beyaz başaklı, başakları orta-uzun, kılçıklı, kırmızı taneli, orta boyludur.
Tarımsal Özellikleri	: Orta erkenci, soğuğa ve kurağa dayanıklı, kardeşlenmesi yüksek, yatmaya dayanıklı, tane dökme ve harman olma kabiliyeti iyi.
Verim Özellikleri	: Kuru şartlarda 300-450 kg/da, destek sulu şartlarda 600-750 kg/da verim potansiyeline sahiptir.
Teknolojik Özellikleri	: Bin tane ağırlığı 32-35.3 g, hektolitreye ağırlığı 76.1-80.7 kg/hl, protein oranı %12.3-16.4, zeleni sedimentasyon 32-61 ml, alveograf enerji değeri 167-280, su absorpsiyonu %58.2-60.8, un verimi %63.0-72.4, yaş gluten %34.5-42.9, kuru gluten %11.4-14.1, gluten indeksi %58.5-66.7 arasında olup orta kalitededir.
Hastalık Durumu	: Sarı pasa orta dayanıklı, sürme için ilaçlanmalıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit Kuşağı Bölgelerinin kıraç, yarı taban ve taban alanlarına önerilmektedir.
Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:	
Tohumluk miktarı	: 18-20 kg/da
Ekim zamanı	: 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arası
Ekim derinliği	: 4-5 cm
Gübreleme	: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar kullanılmalıdır.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

ÇAVUŞ

EKMEKLİK BUĞDAY

TESCİL YILI : 2019



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



ÇAVUŞ

EKMEKLİK BUĞDAY

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Beyaz başaklı, başakları orta-uzun, kılçıksız, kırmızı taneli, orta boyludur.
Tarımsal Özellikleri	: Soğuğa ve kurağa dayanıklı, kardeşlenmesi yüksek, yatmaya dayanıklı, harman olma kabiliyeti iyi, sağlam saplıdır.
Verim Özellikleri	: Kuru şartlarda 280-450 kg/da, destek sulu şartlarda 450-650 kg/da verim potansiyeline sahiptir.
Teknolojik Özellikleri	: Bin tane ağırlığı 31.2-39.5 g, hektolitreye ağırlığı 75.8-79.6 kg/hl, protein oranı %14.0-16.8, zeleni sedimentasyon 47-68 ml, alveograf enerji değeri 300-538, su absorpsiyonu %59.7-62.0, un verimi %59.6-70.5, yaş gluten %35.3-39.7, kuru gluten %12.2-13.3, gluten indeksi %93.6-94.2 arasında olup 1. sınıf sert kaliteli gruptadır.
Hastalık Durumu	: Sarı pasa toleranslı, sürme için ilaçlanmalıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit Kuşağı Bölgelerinin kıraç, yarı taban ve taban alanlarına önerilmektedir.
Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:	
Tohumluk miktarı	: 18-20 kg/da
Ekim zamanı	: 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arası
Ekim derinliği	: 4-5 cm
Gübreleme	: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar kullanılmalıdır.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

DEMİRHAN

EKMEKLİK BUĞDAY

TESCİL YILI : 2019



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



DEMİRHAN

EKMEKLİK BUĞDAY

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Beyaz başaklı, başakları orta-uzun, kılçıksız, kırmızı taneli, orta boyludur.
Tarımsal Özellikleri	: Alternatif gelişme tabiatlı ve orta erkenci, soğuğa ve kurağa dayanıklı, kardeşlenmesi yüksek, su kullanım etkinliği ve gübreye tepkisi yüksek, yatmaya dayanıklı, tane dökmeyen ve harman olma kabiliyeti iyi, sağlam saplıdır.
Verim Özellikleri	: Kuru şartlarda 250-380 kg/da, destek sulu şartlarda 400-500 kg/da
Teknolojik Özellikleri	: Bin tane ağırlığı 29.0-38.3 g, hektolitre ağırlığı 75.6-79.5 kg/hl, protein oranı %14.3-15.8, zeleni sedimentasyon 38-62 ml, alveograf enerji değeri 178-337, su absorpsiyonu %57.0-59.7, un verimi %61.2-70.5, yaş gluten %37.3-38.0, kuru gluten %12.4-12.5, gluten indeksi %73.2-78.9.
Hastalık Durumu	: Sarı pasa dayanıklı, sürme için ilaçlanmalıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: Orta Anadolu ve Geçit Kuşağı Bölgelerinin kıraç, yarı taban ve taban alanlarına önerilmektedir.

Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:

Tohumluk miktarı	: 18-20 kg/da
Ekim zamanı	: 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arası
Ekim derinliği	: 4-5 cm
Gübreleme	: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar kullanılmalıdır.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

AYAZ

EKMEKLİK BUĞDAY

TESCİL YILI : 2020



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



AYAZ

EKMEKLİK BUĞDAY

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Beyaz başaklı, başakları orta-uzun, kılıksız, kırmızı taneli, orta boyludur.
Tarımsal Özellikleri	: Orta geçci, soğuğa ve kurağa dayanıklı, kardeşlenmesi yüksek, yatmaya dayanıklı, tane dökmeyen ve harman olma kabiliyeti iyi.
Verim Özellikleri	: Kuru şartlarda 300-400 kg/da, destek sulu şartlarda 450-550 kg/da verim potansiyeline sahiptir.
Teknolojik Özellikleri	: Bin tane ağırlığı 33.3-35.8 g, hektolitre ağırlığı 69.9-76.1 kg/hl, protein oranı %15-16.2, zeleny sedimentasyon 52-65 ml, alveograf enerji değeri 222-330, su absorpsiyonu %58.2-65.2, un verimi %59.6-69.5, yaş gluten %35.3-38.9, kuru gluten %11.8-12.9, gluten indeksi %62.7-73.4 arasında değişmektedir.
Hastalık Durumu	: Sarı pasa toleranslıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit Kuşağı Bölgelerinin kıraç, yarı taban ve taban alanlarına önerilmektedir.
Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:	
Tohumluk miktarı	: 18-20 kg/da
Ekim zamanı	: 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arası
Ekim derinliği	: 4-5 cm
Gübreleme	: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar kullanılmalıdır.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

BAYRAM

EKMEKLİK BUĞDAY

TESCİL YILI : 2020



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



BAYRAM

EKMEKLİK BUĞDAY

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Beyaz başaklı, başakları orta-uzun, kılçıklı, beyaz taneli, orta boyludur.
Tarımsal Özellikleri	: Soğuğa ve kurağa dayanıklı, kardeşlenmesi yüksek, yatmaya dayanıklı, tane dökmeyen ve harman olma kabiliyeti iyi.
Verim Özellikleri	: Kuru şartlarda 450-550 kg/da, destek sulu şartlarda 600-750 kg/da verim potansiyeline sahiptir.
Teknolojik Özellikleri	: Bin tane ağırlığı 41-47.7 g, hektolitreye ağırlığı 69.6-75.4 kg/hl, protein oranı %14.5-17.6, zeleny sedimentasyon 58-70 ml, alveograf enerji değeri 247-333, su absorpsiyonu %58-58.7, un verimi %62-73.9, yaş gluten %34.4-44.9 kuru gluten %11.6-14.6, gluten indeksi %70.1-89.6 arasında değişmektedir. 1. sınıf sert kaliteli gruptadır.
Hastalık Durumu	: Sarı pasa toleranslıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit Kuşağı Bölgelerinin kıraç, yarı taban ve taban alanlarına önerilmektedir.
Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:	
Tohumluk miktarı	: 18-20 kg/da
Ekim zamanı	: 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arası
Ekim derinliği	: 4-5 cm
Gübreleme	: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar kullanılmalıdır.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

FAZILBEY

EKMEKLİK BUĞDAY

TESCİL YILI : 2020



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



FAZILBEY

EKMEKLİK BUĞDAY

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Beyaz başaklı, başakları orta-uzun, kılıçıklı, beyaz taneli, orta-uzun boyludur.
Tarımsal Özellikleri	: Alternatif gelişme tabiatlı ve orta erkenci, soğuğa ve kurağa dayanıklı, kardeşlenmesi yüksek, su kullanım etkinliği ve gübreye tepkisi yüksek, yatmaya dayanıklı, tane dökmeyen ve harman olma kabiliyeti iyi, sağlam saplıdır.
Verim Özellikleri	: Kuru şartlarda 375-450 kg/da, destek sulu şartlarda 500-600 kg/da
Teknolojik Özellikleri	: Bin tane ağırlığı 33.7-44.9 g, hektolitreye ağırlığı 71.0-76.3 kg/hl, protein oranı %10-12, zeleni sedimentasyon 33-37 ml, alveograf enerji değeri 70-184, su absorpsiyonu %55.6-57.7, un verimi %53.7-66.0, yaş gluten %32.0-37.2, kuru gluten %10.4-12.2, gluten indeksi %44.9-52.6.
Hastalık Durumu	: Sarı pasa toleranslıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: Orta Anadolu ve Geçit Kuşağı Bölgelerinin kıraç, yarı taban ve taban alanlarına önerilmektedir.
Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:	
Tohumluk miktarı	: 18-20 kg/da
Ekim zamanı	: 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arası
Ekim derinliği	: 4-5 cm
Gübreleme	: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar kullanılmalıdır.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

KÜRŞAD

EKMEKLİK BUĞDAY

TESCİL YILI : 2020



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



KÜRŞAD

EKMEKLİK BUĞDAY

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Beyaz başaklı, başakları orta-uzun, kılçıklı, kırmızı taneli, orta boyludur.
Tarımsal Özellikleri	: Alternatif gelişme tabiatlı ve başaklanma zamanı geçtir, soğuğa ve kurağa dayanıklı, kardeşlenmesi yüksek, su kullanım etkinliği ve gübreye tepkisi yüksek, yatmaya dayanıklı, tane dökmeyen ve harman olma kabiliyeti iyi, sağlam saplıdır.e harman olma kabiliyeti iyi, sağlam saplıdır.
Verim Özellikleri	: Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit bölgelerinde kuru şartlarda (yağışa dayalı alanlarda) 350-450 kg/da, destek sulu şartlarda 450-550 kg/da verim potansiyeline sahiptir.
Teknolojik Özellikleri	: Bin tane ağırlığı 27.2-36.8 g, hektolitre ağırlığı 69.9-78.9 kg/hl, protein oranı %15.3-16.0, zeleny sedimentasyon 68-72 ml, alveograf enerji değeri 301-456, su absorpsiyonu %58.8-60.1, un verimi %62.5-68, yaş gluten %32.1-33.1, kuru gluten %11.3-11.8, gluten indeksi %97.6-99.2 arasında değişmektedir.
Hastalık Durumu	: Sarı pasa orta dayanıklı, sürme için ilaçlanmalıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit Kuşağı Bölgelerinin kıraç, yarı taban ve taban alanlarına önerilmektedir.
Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:	
Tohumluk miktarı	: 18-20 kg/da
Ekim zamanı	: 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arası
Ekim derinliği	: 4-5 cm
Gübreleme	: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar önerilir.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

SELAMİBEY

EKMEKLİK BUĞDAY

TESCİL YILI : 2020



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



SELAMİBEY

EKMEKLİK BUĞDAY

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Kılıçkılı ve renkli başaklı, başakları orta-uzun, beyaz taneli, orta-uzun boyludur.
Tarımsal Özellikleri	: Alternatif gelişme tabiatlı ve başaklanma zamanı orta-geçici, soğuğa ve kurağa dayanıklı, kardeşlenmesi yüksek, su kullanım etkinliği ve gübreye tepkisi yüksek, yatmaya dayanıklı, tane dökmeyen ve harman olma kabiliyeti iyi, sağlam saplıdır.
Verim Özellikleri	: Kuru şartlarda 450-550 kg/da, destek sulu şartlarda 600-725 kg/da
Teknolojik Özellikleri	: Bin tane ağırlığı 28.7-40.7 g, hektolitreye ağırlığı 67.2-77.8 kg/hl, protein oranı %12.9-14.7, zeleniy sedimentasyon 41-52 ml, alveograf enerji değeri 294-344, su absorpsiyonu %56.8-60.0, un verimi %61-70.3, yaş gluten %27.1-32, kuru gluten %9-11.1, gluten indeksi %96.1-98.3.
Hastalık Durumu	: Sarı pasa orta dayanıklıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: Orta Anadolu ve Geçit Kuşağı Bölgelerinin kıraç, yarı taban ve taban alanlarına önerilmektedir.
Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:	
Tohumluk miktarı	: 18-20 kg/da
Ekim zamanı	: 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arası
Ekim derinliği	: 4-5 cm
Gübreleme	: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar kullanılmalıdır.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

ERBAŞ

EKMEKLİK BUĞDAY

TESCİL YILI : 2021

TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



ERBAŞ

EKMEKLİK BUĞDAY

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Renkli başaklı, başakları orta-uzun, kılçıklı, kırmızı taneli, orta boyludur
Tarımsal Özellikleri	: Alternatif gelişme tabiatlı ve erkenci, soğuğa ve kurağa dayanıklı, kardeşlenmesi yüksek, su kullanım etkinliği ve gübreye tepkisi yüksek, yatmaya dayanıklı, tane dökmeyen ve harman olma kabiliyeti iyi, sağlam saplıdır.
Verim Özellikleri	: Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit bölgelerinde kuru şartlarda (yağışa dayalı alanlarda) 250-450 kg/da, destek sulu şartlarda 500-700 kg/da verim potansiyeline sahiptir.
Teknolojik Özellikleri	: Kırmızı taneli olan çeşidin bin tane ağırlığı 29.2-31.7 g, hektolitreye ağırlığı 72.1-80.3 kg/hl, protein oranı %15.4-16.6, zeleniy sedimentasyon 34-69 ml, alveograf enerji değeri 127-240, su absorpsiyonu %58.3-58.5, un verimi %65.8-71.0, yaş gluten %34.0-35.7, kuru gluten %10.9-11.6, gluten indeksi %75.5-78.1 arasında değişmekte olup orta kalitededir.
Hastalık Durumu	: Sarı pasa orta hassas, sürme için ilaçlanmalıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit Kuşağı Bölgelerinin kırıç, yarı taban ve taban alanlarına önerilmektedir.
Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:	
Tohumluk miktarı	: 18-20 kg/da
Ekim zamanı	: 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arası
Ekim derinliği	: 4-5 cm
Gübreleme	: Toprak Analizine göre tavsiye edilen miktar önerilir



BALKIR

EKMEKLİK BUĞDAY

TESCİL YILI : 2022



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



BALKIR

EKMEKLİK BUĞDAY

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Beyaz başaklı, başakları orta uzunlukta, kılçıklı, kırmızı taneli, orta-uzun boyludur.
Tarımsal Özellikleri	: Alternatif gelişme tabiatlı ve orta erkenci, soğuğa ve kurağa dayanıklı, kardeşlenmesi yüksek, su kullanım etkinliği ve gübreye tepkisi yüksek, yatmaya dayanıklı, tane dökmeyen ve harman olma kabiliyeti iyi, sağlam saplıdır.
Verim Özellikleri	: Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit bölgelerinde kuru şartlarda (yağışa dayalı alanlarda) 250-450 kg/da destek sulu şartlarda 500-600 kg/da verim potansiyeline sahiptir.
Teknolojik Özellikleri	: Bin tane ağırlığı 34,3 – 38,2 g, hektolitreye ağırlığı 76,4 – 77,5 kg/hl, protein oranı %14,6-14,7, zeleni sedimentasyon 39-52 ml, alveograf enerji değeri 263- 278, un verimi %69,2 – 71,6, yaş gluten %35,0, kuru gluten %11,3, gluten indeksi %55,8- 59,4 arasında değişmekte olup orta kalitelidir.
Hastalık Durumu	: Sarı pasa orta dayanıklı, sürme için ilaçlanmalıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: Orta Anadolu ve Geçit Kuşağı Bölgelerinin kıraç, yarı taban ve taban alanlarına önerilmektedir.
Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:	
Tohumluk miktarı	: 18-20 kg/da
Ekim zamanı	: 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arası
Ekim derinliği	: 4-5 cm
Gübreleme	: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar önerilir.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

KARACAKURT

EKMEKLİK BUĞDAY

TESCİL YILI : 2022



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



KARACAKURT

EKMEKLİK BUĞDAY

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Beyaz başaklı, başakları orta uzunlukta, kılçıksız, kırmızı taneli, orta-uzun boyludur.
Tarımsal Özellikleri	: Alternatif gelişme tabiatlı ve orta erkenci, soğuğa ve kurağa dayanıklı, kardeşlenmesi yüksek, su kullanımı etkinliği ve gübreye tepkisi yüksek, yatmaya dayanıklı, tane dökmeyen ve harman olma kabiliyeti iyi, sağlam saplıdır.
Verim Özellikleri	: Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit bölgelerinde kuru şartlarda (yağışa dayalı alanlarda) 300-450 kg/da, destek sulu şartlarda 500-700 kg/da verim potansiyeline sahiptir.
Teknolojik Özellikleri	: Bin tane ağırlığı 35.5 - 39.1 g, hektolitreye ağırlığı 80.1 - 82.0 kg/hl, protein oranı % 15.0 - 15.9, zeleniy sedimentasyon 40 - 52 ml, alveograf enerji değeri 221 - 259, un verimi % 71.7 - 74.8, yaş gluten % 36.8, kuru gluten % 11.9, gluten indeksi % 45.5 - 57.4 arasında değişmekte olup orta kalitelidir.
Hastalık Durumu	: Sarı pasa orta dayanıklı, sürme için ilaçlanmalıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: Orta Anadolu ve Geçit Kuşağı Bölgelerinin kıraç, yarı taban ve taban alanlarına önerilmektedir.
Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:	
Tohumluk miktarı	: 18-20 kg/da
Ekim zamanı	: 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arası
Ekim derinliği	: 4-5 cm
Gübreleme	: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar önerilir.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

METE 06

EKMEKLİK BUĞDAY

TESCİL YILI : 2022



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



METE 06

EKMEKLİK BUĞDAY

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Beyaz başaklı, başakları orta uzunlukta, kılçıklı, kırmızı taneli, kısa-orta boyludur.
Tarımsal Özellikleri	: Kışlık gelişme tabiatlı ve orta erkenci, soğuğa ve kurağa dayanıklı, kardeşlenmesi yüksek, su kullanım etkinliği ve gübreye tepkisi yüksek, yatmaya dayanıklı, tane dökmeyen ve harman olma kabiliyeti iyi, sağlam saplıdır.
Verim Özellikleri	: Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit bölgelerinde destek sulu şartlarda (sulanabilir alanlarda) 500-800 kg/da verim potansiyeline sahiptir.
Teknolojik Özellikleri	: Kırmızı tanelidir ve bin tane ağırlığı 31.0 - 37.0 g, hektolitreye ağırlığı 76.1 - 77.5 kg/hl, protein oranı %14.9 - 16.4, zeleni sedimentasyon 55 - 69 ml, alveograf enerji değeri 376 - 380, su absorpsiyonu %13, un verimi %69.2 - 72.7, yaş gluten %31.6, kuru gluten %11, gluten indeksi %971 - 97.9 arasında değişmekte olup birinci sınıf kalitelidir.
Hastalık Durumu	: Sarı pasa orta dayanıklı, sürme için ilaçlanmalıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit Kuşağı Bölgelerinin yarı taban ve taban alanlarında destek sulu koşullarda önerilmektedir.
Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:	
Tohumluk miktarı	: 18-20 kg/da
Ekim zamanı	: 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arası
Ekim derinliği	: 4-5 cm
Gübreleme	: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar kullanılmalıdır.



GÜLFER

EKMEKLİK BUĞDAY

TESCİL YILI : 2023



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



GÜLFER

EKMEKLİK BUĞDAY

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Renkli ve uzun başaklı, kılçıklı, beyaz taneli, uzun boyludur.
Tarımsal Özellikleri	: Kışlık gelişme tabiatlı ve geççi, soğuğa ve kurağa dayanıklı, kardeşlenmesi yüksek, su kullanım etkinliği ve gübreye tepkisi yüksek, yatmaya dayanıklı, tane dökmeyen ve harman olma kabiliyeti iyi, sağlam saplıdır.
Verim Özellikleri	: Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit bölgelerinde kuru şartlarda (yağışa dayalı alanlarda) 300-450 kg/da, destek sulu şartlarda 500-600 kg/da verim potansiyeline sahiptir.
Teknolojik Özellikleri	: Bin tane ağırlığı 33.8-34.2 g, hektolitreye ağırlığı 75.9-77.0 kg/hl, protein oranı %14,5-14.6, zeleniy sedimentasyon 35-44 ml, alveograf enerji değeri 151-161 arasında değişmektedir.
Hastalık Durumu	: Sarı pasa orta dayanıklı, sürme için ilaçlanmalıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit Kuşağı Bölgelerinin kıraç, yarı taban ve taban alanlarına önerilmektedir.
Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:	
Tohumluk miktarı	: 18-20 kg/da
Ekim zamanı	: 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arası
Ekim derinliği	: 4-5 cm
Gübreleme	: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar önerilir.



AYBARS

EKMEKLİK BUĞDAY

TESCİL YILI : 2024



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



AYBARS

EKMEKLİK BUĞDAY

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Başakları beyaz renkli, orta uzunlukta ve kılıçlı, kırmızı taneli, orta-uzun boyludur.
Tarımsal Özellikleri	: Kışlık gelişme tabiatlı ve orta-erkenci, soğuğa ve kurağa dayanıklı, kardeşlenmesi yüksek, su kullanımı etkinliği ve gübreye tepkisi yüksek, yatmaya dayanıklı, tane dökmeyen ve harman olma kabiliyeti iyi, sağlam saplıdır.
Verim Özellikleri	: Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit bölgelerinde kuru şartlarda (yağışa dayalı alanlarda) 300-450 kg/da, destek sulu şartlarda 500-650 kg/da verim potansiyeline sahiptir.
Teknolojik Özellikleri	: Bin tane ağırlığı 35.2-35.4 g, hektolitreye ağırlığı 79.4-81.6 kg/hl, protein oranı %13.0-14.9, zeleni sedimentasyon 36-37 ml, alveograf enerji değeri 156-264 arasında değişmektedir.
Hastalık Durumu	: Sarı pasa orta dayanıklı, sürme için ilaçlanmalıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit Kuşağı Bölgelerinin kıraç, yarı taban ve taban alanlarına önerilmektedir.
Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:	
Tohumluk miktarı	: 18-20 kg/da
Ekim zamanı	: 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arası
Ekim derinliği	: 4-5 cm
Gübreleme	: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar kullanılmalıdır.




TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

BEYDİLİ

EKMEKLİK BUĞDAY

TESCİL YILI : 2024



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



BEYDİLİ

EKMEKLİK BUĞDAY

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Başakları renkli, kısa-orta uzunlukta ve kılçıksız, kırmızı taneli, orta boyludur.
Tarımsal Özellikleri	: Alternatif gelişme tabiatlı ve başaklanma zamanı orta, soğuğa ve kurağa dayanıklı, kardeşlenmesi yüksek, su kullanım etkinliği ve gübreye tepkisi yüksek, yatmaya dayanıklı, tane dökmeyen ve harman olma kabiliyeti iyi, sağlam saplıdır.
Verim Özellikleri	: Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit bölgelerinde destek sulu şartlarda 500-800 kg/da verim potansiyeline sahiptir.
Teknolojik Özellikleri	: Bin tane ağırlığı 36.8-41.7 g, hektolitre ağırlığı 76.9-78.6 kg/hl, protein oranı %12.6-14.0, zeleni sedimentasyon 35-40 ml, alveograf enerji değeri 203-247 arasında değişmektedir.
Hastalık Durumu	: Sarı pasa orta dayanıklı, sürme için ilaçlanmalıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit Kuşağı Bölgelerinin yarı taban, taban ve destek sulama yapılan alanlarına önerilmektedir.
Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:	
Tohumluk miktarı	: 18-20 kg/da
Ekim zamanı	: 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arası
Ekim derinliği	: 4-5 cm
Gübreleme	: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar önerilir.



KUTAY

EKMEKLİK BUĞDAY

TESCİL YILI : 2024



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



KUTAY

EKMEKLİK BUĞDAY

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Başakları renkli, kısa-orta uzunlukta ve kılçıklı, kırmızı taneli, orta boyludur.
Tarımsal Özellikleri	: Alternatif gelişme tabiatlı ve başaklanma zamanı orta, soğuğa ve kurağa dayanıklı, kardeşlenmesi yüksek, su kullanım etkinliği ve gübreye tepkisi yüksek, yatmaya dayanıklı, tane dökmeyen ve harman olma kabiliyeti iyi, sağlam saplıdır.
Verim Özellikleri	: Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit bölgelerinde destek sulu şartlarda 470-800 kg/da verim potansiyeline sahiptir.
Teknolojik Özellikleri	: Bin tane ağırlığı 34.4-35.5 g, hektolitre ağırlığı 79.0-79.7 kg/hl, protein oranı %12.1-14.4, zeleniy sedimentasyon 32-38 ml, alveograf enerji değeri 146-258 arasında değişmektedir
Hastalık Durumu	: Sarı pasa orta dayanıklı, sürme için ilaçlanmalıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit Kuşağı Bölgelerinin yarı taban, taban ve destek sulama yapılan alanlarına önerilmektedir.
Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:	
Tohumluk miktarı	: 18-20 kg/da
Ekim zamanı	: 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arası
Ekim derinliği	: 4-5 cm
Gübreleme	: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar önerilir.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

MUHSİN

EKMEKLİK BUĞDAY

TESCİL YILI : 2025



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



MUHSİN

EKMEKLİK BUĞDAY

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Başakları beyaz renkli, orta uzunlukta ve kılçıklı, kırmızı taneli, orta-uzun boyludur
Tarımsal Özellikleri	: Kışlık gelişme tabiatlı ve orta geçci, soğuğa ve kurağa dayanıklı, kardeşlenmesi yüksek, su kullanım etkinliği ve gübreye tepkisi yüksek, yatmaya dayanıklı, tane dökmeyen ve harman olma kabiliyeti iyi, sağlam saplıdır.
Verim Özellikleri	: Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit bölgelerinde kuru şartlarda (yağışa dayalı alanlarda) 340-500 kg/da, destek sulu şartlarda 550-650 kg/da verim potansiyeline sahiptir.
Teknolojik Özellikleri	: Bin tane ağırlığı 34.7-35.6 g, hektolitre ağırlığı 81.8-83.1 kg/hl, protein oranı % 12.8-15.0, zeleni sedimentasyon 40-41 ml, alveograf enerji değeri 261-271 arasında değişmektedir.
Hastalık Durumu	: Sarı pasa orta dayanıklıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit Kuşağı Bölgelerinin kıraç, yarı taban ve taban alanlarına önerilmektedir.
Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:	
Tohumluk miktarı	: 18-20 kg/da
Ekim zamanı	: 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arası
Ekim derinliği	: 4-5 cm
Gübreleme	: Toprak Analizine göre tavsiye edilen miktar önerilir



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

KIZILTAN 91

MAKARNALIK BUĐDAY

TESCİL YILI : 1991



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



KIZILTAN 91

MAKARNALIK BUĞDAY

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Kılıçlıklı ve kahverengi kavuzlu, başakları orta-uzun, orta-sık ve dik, orta boylu ve sağlam saplıdır.
Tarımsal Özellikleri	: Alternatif gelişme tabiatına sahiptir. İç Anadolu ve Geçit bölgelerinde kurağa, kışa ve soğuğa dayanıklı sağlam saplı, tane dökmeyen ve harman olma kabiliyeti iyi olan bir çeşittir.
Verim Özellikleri	: Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit Bölgelerinde kuru şartlarda 300-350 kg/da verim potansiyeline sahiptir.
Teknolojik Özellikleri	: Bin tane ağırlığı 34 – 50 gr, protein oranı % 10 - % 16,8, hektolitreye ağırlığı 76,1 - 80,5 kg, ırmık verimi % 50,8-% 62,5, camısı tane oranı % 80 -% 100, SDS sedimentasyon 12 ml - 29 ml ve B renk değeri 20 - 26,2 arasındadır. Makarnalık kalitesi iyi olup ayrıca ülkemizde bilinen en iyi bulgurluk çeşittir.
Hastalık Durumu	: Sarı pasa orta hassas, sürme ve rastık için tohum ilaçlaması yapılmalıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: İç Anadolu ve Geçit Bölgelerinin kırıç, yarı taban ve taban alanlarına önerilmektedir.
Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:	
Tohumluk miktarı	: 20-22 kg/da
Ekim zamanı	: 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arası
Ekim derinliği	: 4-5 cm
Gübreleme	: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar kullanılmalıdır.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

ÇEŞİT – 1252

MAKARNALIK BUĞDAY

TESCİL YILI : 1999



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



ÇEŞİT - 1252

MAKARNALIK BUĞDAY

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Kahverengi kavuzlu ve beyaz kılçıklı, başakları uzun, orta sık ve eğik, orta-kısa boylu ve sağlam saplı bir çeşittir.
Tarımsal Özellikleri	: Alternatif gelişme tabiatlı, yatmaya dayanıklı, soğuğa, kışa ve kurağa dayanıklılığı iyi, gübreye tepkisi oldukça iyi ve kardeşlenmesi uygun şartlarda yüksektir. Uygun gübreleme yapıldığında dönme görülmeyen ve camsılık oranı artan, tane dökmeyen ve harman olma kabiliyeti iyi olan bir çeşittir.
Verim Özellikleri	: Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit Bölgelerinde kuru şartlarda 300-350 kg/da verim potansiyeline sahiptir.
Teknolojik Özellikleri	: Bin tane ağırlığı 32-48,6 g, protein oranı % 10-% 16,9, hektolitre ağırlığı 72-80,5 kg, irmik verimi değeri % 50- % 59,5, camsı tane oranı % 72-% 100, SDS sedimantasyon 10-30 ml ve B renk değeri 15-22 arasındadır.
Hastalık Durumu	: Sarı pasa orta hassas, sürme ve rastık için tohum ilaçlaması yapılmalıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: İç Anadolu ve Geçit bölgeleri ile Batı geçitte Afyon, Uşak yörelerinde kurağın ve soğuğun kısıtlayıcı faktör olduğu yarı taban ve taban alanlara önerilmektedir.
Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:	
Tohumluk miktarı	: 20-22 kg/da
Ekim zamanı	: 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arası
Ekim derinliği	: 4-5 cm
Gübreleme	: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar kullanılmalıdır.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

MİRZABEY-2000

MAKARNALIK BUĞDAY

TESCİL YILI : 2000



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



MİRZABEY-2000

MAKARNALIK BUĞDAY

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Kahverengi kavuzlu ve beyaz kılçıklı, başakları uzun, orta sık ve eğik, orta-kısa boylu ve sağlam saplı bir çeşittir.
Tarımsal Özellikleri	: Yatmaya dayanıklı, soğuğa, kışa ve kurağa dayanıklılığı iyi, gübreye tepkisi oldukça iyi ve kardeşlenmesi uygun şartlarda yüksektir. Uygun gübreleme yapıldığında dönme görülmeyen ve camsılık oranı artan, tane dökmeyen ve harman olma kabiliyeti iyi olan bir çeşittir.
Verim Özellikleri	: Kuru şartlarda 300-350 kg/da
Teknolojik Özellikleri	: Bin tane ağırlığı 32-48,6 g, protein oranı % 10-16,9, hektolitreye ağırlığı 72-80,5 kg, irmik verimi değeri % 50-59,5, camsı tane oranı % 72-100, SDS sedimantasyon 10-30 ml, B renk değeri 15-22 arasındadır.
Hastalık Durumu	: Sarı pasa orta hassas, sürme ve rastık için tohum ilaçlaması yapılmalıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: İç Anadolu ve Geçit bölgeleri ile Batı geçitte Afyon, Uşak yörelerinde kurağın ve soğuğun kısıtlayıcı faktör olduğu yarı taban ve taban alanlara önerilmektedir.
Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:	
Tohumluk miktarı	: 20-22 kg/da
Ekim zamanı	: 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arası
Ekim derinliği	: 4-5 cm
Gübreleme	: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar kullanılmalıdır.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

EMİNBİY

MAKARNALIK BUĞDAY

TESCİL YILI : 2009



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



EMİNBEY

MAKARNALIK BUĞDAY

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Kılıçkılı ve beyaz başaklı, başakları orta uzun, orta sık ve dik, orta boylu ve sağlam saplı, tane şekli uzamış yumurta biçimindedir.
Tarımsal Özellikleri	: Kışlık gelişme tabiatlı, yatmaya dayanıklı, soğuğa, kışa ve kurağa dayanıklılığı iyi, gübreye tepkisi oldukça iyi ve kardeşlenmesi uygun şartlarda yüksektir. Gübreye tepkisi yüksek, dönmeye dayanıklı, tane dökmeyen ve harman olma kabiliyeti iyi olan bir çeşittir.
Verim Özellikleri	: Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit Bölgelerinde kuru şartlarda 300-350 kg/da, destek sulu şartlarda 450-500 kg/da verim potansiyeline sahiptir.
Teknolojik Özellikleri	: Bin tane ağırlığı 35-50,2 g, protein oranı % 11-% 16,8, hektolitreye ağırlığı 76,3-80,8 kg, ırmık verimi değeri % 50,2-% 59,8, camısı tane oranı % 85-% 100, SDS sedimantasyon 16-43,5 ml ve B renk değeri 20,9-25,1 arasındadır. Protein kalitesi ve ırmık rengiyle makarnalık kalitesi çok iyi bir çeşittir.
Hastalık Durumu	: Sarı pasa orta hassas, sürme ve rastık için tohum ilaçlaması yapılmalıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: İç Anadolu, Geçit bölgeleri ve benzer yörelerin yarı taban ve taban alanlarına önerilmektedir.
Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:	
Tohumluk miktarı	: 20-22 kg/da
Ekim zamanı	: 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arası
Ekim derinliği	: 4-5 cm
Gübreleme	: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar kullanılmalıdır.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

İMREN

MAKARNALIK BUĞDAY

TESCİL YILI : 2009



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



İMREN

MAKARNALIK BUĞDAY

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Kılıçıklı ve renkli başaklı, başakları orta uzun, orta sık ve dik, orta boylu ve sağlam saplıdır.
Tarımsal Özellikleri	: Alternatif gelişme tabiatlı, yatmaya dayanıklı, soğuğa, kışa dayanıklılığı iyi, gübreyle tepkisi oldukça iyi ve kardeşlenmesi uygun şartlarda yüksektir. Uygun gübreleme yapıldığında dönme görülmeyen ve camsılık oranı artan, tane dökmeyen ve harman olma kabiliyeti iyi olan bir çeşittir.
Verim Özellikleri	: Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit Bölgelerinde kuru şartlarda 350-400 kg/da, destek sulu şartlarda 550 – 850 kg/da verim potansiyeline sahiptir.
Teknolojik Özellikleri	: Bin tane ağırlığı 35-40 g, protein oranı % 10- % 16,4, hektolitreye ağırlığı 76 - 79,5 kg, irmik verimi değeri % 53,4 - % 58,2, camsı tane oranı % 76- % 96, SDS sedimantasyon 10-42 ml ve B renk değeri 12,4-25,1 arasındadır.
Hastalık Durumu	: Sarı pasa orta hassas, sürme ve rastık için tohum ilaçlaması yapılmalıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: İç Anadolu ve Geçit Bölgelerin yarı taban ve taban alanlarına önerilmektedir.
Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:	
Tohumluk miktarı	: 20-22 kg/da
Ekim zamanı	: 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arası
Ekim derinliği	: 4-5 cm
Gübreleme	: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar kullanılmalıdır.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

VEHBİBEY

MAKARNALIK BUĞDAY

TESCİL YILI : 2019



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



VEHBİBEY

MAKARNALIK BUĞDAY

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Beyaz başaklı, başakları orta-uzun, orta sık ve dik, orta boylu ve sağlam saplıdır.
Tarımsal Özellikleri	: Kışlık gelişme tabiatlı ve orta geçci, soğuğa ve kurağa dayanıklı, kardeşlenmesi yüksek, su kullanımı etkinliği ve gübreye tepkisi yüksek, yatmaya dayanıklıdır. Uygun gübrelemede dönme görülmeyen, çamsılık oranı artan ve harman olma kabiliyeti iyi, sağlam saplı olan bir çeşittir.
Verim Özellikleri	: Kuru şartlarda 300-400 kg/da, destek sulu şartlarda 450-700 kg/da
Teknolojik Özellikleri	: Bin tane ağırlığı 33.6-46.5 g, hektolitre ağırlığı 70.4-80.4 kg/hl, protein oranı %13.0-16.4, çamsılık %84-100, SDS sedimentasyon 30-49 ml, ırmık B sarılık değeri 24.9-26.4, ırmık verimi %60.4-67.0
Hastalık Durumu	: Sarı pasa orta dayanıklı, sürme için ilaçlanmalıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: Orta Anadolu ve Geçit Kuşağı Bölgelerinin kıraç, yarı taban ve taban alanlarına önerilmektedir.
Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:	
Tohumluk miktarı	: 20-22 kg/da
Ekim zamanı	: 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arası
Ekim derinliği	: 4-5 cm
Gübreleme	: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar kullanılmalıdır.



KUBİLAY

MAKARNALIK BUĞDAY

TESCİL YILI : 2022



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



KUBİLAY

MAKARNALIK BUĞDAY

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Renkli başaklı, başakları orta uzunlukta, uzun boyludur.
Tarımsal Özellikleri	: Alternatif gelişme tabiatlı ve geçci, soğuğa ve kurağa dayanıklı, kardeşlenmesi yüksek, su kullanım etkinliği ve gübreye tepkisi yüksek, yatmaya dayanıklıdır. Uygun gübreleme yapıldığında dönme görülmeyen ve camsılık oranı artan ve harman olma kabiliyeti iyi, sağlam saplı olan bir çeşittir.
Verim Özellikleri	: Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit bölgelerinde kuru şartlarda (yağışa dayalı alanlarda) 300-400 kg/da, destek sulu şartlarda 450-700 kg/da verim potansiyeline sahiptir.
Teknolojik Özellikleri	: Bin tane ağırlığı 30.5 – 37.8 g, hektolitre ağırlığı 76.3 – 77.3 kg/hl, protein oranı %13,2- 15.3, camsılık %96-100, SDS sedimentasyon 17- 32 ml, ırmik B sarılık değeri 26.7- 27.8, ırmik verimi %62,4 - 63,2 arasında olup kaliteli gruptadır.
Hastalık Durumu	: Sarı pasa orta dayanıklı, sürme için ilaçlanmalıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit Kuşağı Bölgelerinin kıraç, yarı taban ve taban alanlarına önerilmektedir.
Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:	
Tohumluk miktarı	: 20-22 kg/da
Ekim zamanı	: 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arası
Ekim derinliği	: 4-5 cm
Gübreleme	: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar önerilir.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

ALİYE

MAKARNALIK BUĞDAY

TESCİL YILI : 2025



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



ALİYE

MAKARNALIK BUĞDAY

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Kılıçkılı ve beyaz başaklı, başakları orta uzun, orta sık ve dik, orta boylu ve sağlam saplı ve uzun tanelidir.
Tarımsal Özellikleri	: Alternatif gelişme tabiatlı ve orta erkenci, soğuğa ve kurağa dayanıklı, kardeşlenmesi yüksek, su kullanım etkinliği ve gübreye tepkisi yüksek, yatmaya dayanıklı, tane dökme ve harman olma kabiliyeti iyi, sağlam saplıdır.
Verim Özellikleri	: Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit bölgelerinde kuru şartlarda (yağışa dayalı alanlarda) 400-600 kg/da, destek sulu şartlarda 550-700 kg/da verim potansiyeline sahiptir.
Teknolojik Özellikleri	: Bin tane ağırlığı 42.2-43.4g, hektolitreye ağırlığı 78.2-79.8 kg/hl, protein oranı % 11.9-13.5, camsılık % 78-82, SDS sedimentasyon 9-13 m, irmik B sarılık değeri 22.8-26.8, irmik verimi % 61.2-62.0 arasında değişmektedir.
Hastalık Durumu	: Sarı pasa orta dayanıklıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit Kuşağı Bölgelerinin kırıç, yarı taban ve taban alanlarına önerilmektedir.
Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:	
Tohumluk miktarı	: 20-22 kg/da
Ekim zamanı	: 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arası
Ekim derinliği	: 4-5 cm
Gübreleme	: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar önerilir.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

ALTUNİ

MAKARNALIK BUĞDAY

TESCİL YILI : 2025



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



ALTUNİ

MAKARNALIK BUĞDAY

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Kılçıklı ve beyaz başaklı, başakları orta uzun, orta sık ve dik, orta boylu ve sağlam saplı ve uzun tanelidir.
Tarımsal Özellikleri	: Alternatif gelişme tabiatlı ve orta erkenci, soğuğa ve kurağa dayanıklı, kardeşlenmesi yüksek, su kullanım etkinliği ve gübreye tepkisi yüksek, yatmaya dayanıklı, tane dökmeyen ve harman olma kabiliyeti iyi, sağlam saplıdır.
Verim Özellikleri	: Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit bölgelerinde kuru şartlarda (yağışa dayalı alanlarda) 330-500 kg/da, destek sulu şartlarda 500-600 kg/da verim potansiyeline sahiptir.
Teknolojik Özellikleri	: Bin tane ağırlığı 40.3-43.5 g, hektolitreye ağırlığı 81.1-83.8 kg/hl, protein oranı %14.1-15.2, camsılık % 96-100, SDS sedimentasyon 25-38 m, irmik B sarılık değeri 21.5-24.8, irmik verimi % 60.9-61.9 arasında değişmektedir.
Hastalık Durumu	: Sarı pasa orta dayanıklıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit Kuşağı Bölgelerinin kıraç, yarı taban ve taban alanlarına önerilmektedir.
Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:	
Tohumluk miktarı	: 20-22 kg/da
Ekim zamanı	: 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arası
Ekim derinliği	: 4-5 cm
Gübreleme	: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar önerilir.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

MANAS

MAKARNALIK BUĐDAY

TESCİL YILI : 2025



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



MANAS

MAKARNALIK BUĞDAY

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Kılçıklı ve renkli başaklı, başakları orta uzun, orta sık ve dik, orta boylu ve sağlam saplı ve uzun tanelidir.
Tarımsal Özellikleri	: Alternatif gelişme tabiatlı ve orta erkenci, soğuğa ve kurağa dayanıklı, kardeşlenmesi yüksek, su kullanım etkinliği ve gübreye tepkisi yüksek, yatmaya dayanıklı, tane dökmeyen ve harman olma kabiliyeti iyi, sağlam saplıdır.
Verim Özellikleri	: Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit bölgelerinde kuru şartlarda (yağışa dayalı alanlarda) 350-550 kg/da, destek sulu şartlarda 550-650 kg/da verim potansiyeline sahiptir.
Teknolojik Özellikleri	: Bin tane ağırlığı 39.1-44.0 g, hektolitreye ağırlığı 79.1-80.4 kg/hl, protein oranı % 13.0-14.8, camsılık % 92-100, SDS sedimentasyon 17-48 m, irmik B sarılık değeri 22.3-26.6, irmik verimi % 62.2-62.3 arasında değişmektedir.
Hastalık Durumu	: Sarı pasa orta dayanıklı, sürme için ilaçlanmalıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: Orta Anadolu ve Geçit Kuşağı Bölgelerinin kıraç, yarı taban ve taban alanlarına önerilmektedir.
Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:	
Tohumluk miktarı	: 20-22 kg/da
Ekim zamanı	: 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arası
Ekim derinliği	: 4-5 cm
Gübreleme	: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar kullanılmalıdır.



ZERDE

MAKARNALIK BUĐDAY

TESCİL YILI : 2025

TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



ZERDE

MAKARNALIK BUĞDAY

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Kılıçlıklı ve renkli başaklı, başakları orta uzun, orta sık ve dik, orta boylu ve sağlam saplı ve uzun tanelidir.
Tarımsal Özellikleri	: Alternatif gelişme tabiatlı ve orta erkenci, soğuğa ve kurağa dayanıklı, kardeşlenmesi yüksek, su kullanım etkinliği ve gübreye tepkisi yüksek, yatmaya dayanıklı, tane dökmeyen ve harman olma kabiliyeti iyi, sağlam saplıdır.
Verim Özellikleri	: Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit bölgelerinde kuru şartlarda (yağışa dayalı alanlarda) 350-550 kg/da, destek sulu şartlarda 500-700 kg/da verim potansiyeline sahiptir.
Teknolojik Özellikleri	: Bin tane ağırlığı 42.5-49.2g, hektolitreye ağırlığı 78.2-78.3 kg/hl, protein oranı % 13.2-15.8, camsılık % 92-96, SDS sedimentasyon 25-46 m, irmik B sarılık değeri 23.9-26.2, irmik verimi % 63.4-64.9 arasında değişmektedir.
Hastalık Durumu	: Sarı pasa orta dayanıklı, sürme için ilaçlanmalıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: Orta Anadolu ve Geçit Kuşağı Bölgelerinin kıraç, yarı taban ve taban alanlarına önerilmektedir.
Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:	
Tohumluk miktarı	: 20-22 kg/da
Ekim zamanı	: 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arası
Ekim derinliği	: 4-5 cm
Gübreleme	: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar kullanılmalıdır.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

BERRAK

KURU FASULYE

TESCİL YILI : 2012



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



BERRAK

KURU FASULYE

Çeşit Sahibi Kuruluş : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara

Morfolojik Özellikleri : Bitki boyu 34-87 cm,
ilk bakla yüksekliği 9-17 cm

Tarımsal Özellikleri : Ekimden itibaren % 50 çiçeklenme gün sayısı
45-60 gün, olgunlaşma gün sayısı 86-106 gün,
erkenci, yarı sarılcı bitki tipindedir.

Verim Özellikleri : Ortalama verim 182-255 kg/da

Teknolojik Özellikleri : Tane tipi çalı, tane rengi beyaz, 100 tane ağırlığı
25.7-33,7 g, Protein oranı %19.2-25.5, pişme süresi
36-42 dak.

Hastalık Durumu : Adi yaprak yanıklığına orta hassas, kök çürüklüğü
ve adi mozaik virüsüne orta toleranslıdır.

Tavsiye Edilen Bölgeler : Orta Anadolu ve Geçit Bölgeleri



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

ÇİFTÇİ

KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK

TESCİL YILI : 2001



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



ÇİFTÇİ

KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK

Çeşit Sahibi Kuruluş : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara

Morfolojik Özellikleri : Bitki boyu 22-30 cm, ilk bakla yüksekliği 11-15 cm,
dik gelişme tabiatlı, bakla dökmeyen bir çeşittir.
Soğuğa dayanıklı ve güzlük ekime uygundur.

Verim Özellikleri : Ortalama verim 150-195 kg/da

Teknolojik Özellikleri : 1000 tane ağırlığı 36,7 g, 4,5 mm elekte % 56,2,
4 mm elekte % 34,7, 3,5 mm elekte % 9,1

Hastalık Durumu : Solgunluğa toleranslı

Tavsiye Edilen Bölgeler : Orta Anadolu ve Geçit Bölgeleri ile Güney
Doğu Anadolu'nun Yüksek alanları



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

ANKARAYEŐİLİ

KIŐLİK YEŐİL MERCİMEK

TESCİL YILI : 2012



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŐTIRMA
ENSTİTÜŐÜ MÜDÜRLÜĐÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



ANKARAYEŞİLİ

KIŞLIK YEŞİL MERCİMEK

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Hasat esnasında bitki boyu 28-44 cm, dik gelişen, ilk bakla yüksekliği 11-21 cm
Tarımsal Özellikleri	: Kışa ve soğuğa dayanıklı, günlük ekime uygun, % 50 çiçeklenme gün sayısı 217-220 gün, olgunlaşma gün sayısı 260-263 gün.
Verim Özellikleri	: Ortalama verim 165-200 kg/da
Teknolojik Özellikleri	: 1000 tane ağırlığı 53,2-70,1 g, elek analizinde % 58,6'sı 6 mm, % 38'i 5 mm elek üzerinde kalmıştır.Fe içeriği 115 mg/kg, Zn içeriği 12,6 mg/kg, Se içeriği 0,200 mg/kg dir.
Hastalık Durumu	: Verimi kısıtlayan hastalığı yoktur.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: Orta Anadolu ve Geçit Bölgeleri ile benzer ekolojilere önerilmektedir.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

CEREN

KIŞLIK YEŞİL MERCİMEK

TESCİL YILI : 2012



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



CEREN

KIŞLIK YEŞİL MERCİMEK

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Hasat esnasında 30-54 cm bitki boyunda, yarı dik gelişen mercimek çeşitidir. Tane kabuk rengi yeşildir.
Tarımsal Özellikleri	: Kışa ve soğuğa dayanıklıdır. Güzlük ekime uygundur. Çiçeklenme gün sayısı 199-206 gün, olgunlaşma gün sayısı 248-255 gündür.
Verim Özellikleri	: 191-267 kg/da
Teknolojik Özellikleri	: 1000 tane ağırlığı 28,8-32,9 g. Elek analizinde % 1,6-60 5 mm; % 18,8-88,8 4 mm elek üzerinde kalmıştır. Fe içeriği 114 mg/kg, Zn içeriği 12,6 mg/kg, Se içeriği 0,211 mg/kg dır.
Hastalık Durumu	: Verimi kısıtlayan hastalığı yoktur.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: Orta Anadolu ve Geçit Bölgeleri ile benzer ekolojilere önerilmektedir.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

YUSUFHAN

KIŞLIK YEŞİL MERCİMEK

TESCİL YILI : 2012



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



YUSUFHAN

KIŞLIK YEŞİL MERCİMEK

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Dik gelişme tabiatlı, bitki boyu 29-44 cm, ilk bakla yüksekliği 11-20 cm, bakla dökme görülmez.
Tarımsal Özellikleri	: Kışa ve soğuğa dayanıklı, güzlük ekime uygun, çiçeklenme gün sayısı 217-220 gün, olgunlaşma gün sayısı 260-265 gündür.
Verim Özellikleri	: Ortalama verim 191-237 kg/da
Teknolojik Özellikleri	: 1000 tane ağırlığı 53.2-70.1 g, protein oranı % 24.04-26.1'dir. Elek analizinde % 16.9 u 4 mm, % 70.4'ü 5 mm elek üzerinde kalmıştır. Fe içeriği 110 mg/kg, Zn içeriği 12,3 mg/kg, Se içeriği 0,210 mg/kg dir.
Hastalık Durumu	: Verimi kısıtlayan hastalığı yoktur.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: Orta Anadolu ve Geçit Bölgeleri ile benzer ekolojilere önerilmektedir.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

MEYVECİ 2001

YAZLIK YEŞİL MERCİMEK

TESCİL YILI : 2001



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



MEYVECİ 2001

YAZLIK YEŞİL MERCİMEK

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Hafif tüylü, yaprakçıklar orta büyüklükte, ilk büyüme şekli dik, bakla dökme görülmez, bitki boyu 25-30 cm, ilk bakla yüksekliği 14-18 cm'dir.
Tarımsal Özellikleri	: Yazlık, orta erkenci, kurağa toleranslı ve yatmaya dayanıklı, çiçeklenme gün sayısı 60-70 gün, olgunlaşma gün sayısı 93-95 gündür. Makineli hasada uygundur.
Verim Özellikleri	: Ortalama verimi 130-160 kg
Teknolojik Özellikleri	: 1000 tane ağırlığı 72,0 g, tohum kabuğu rengi yeşil, tohum yüzeyi desensiz, kotiledon rengi sarı, iri taneli ve elek analizinde tanelerin % 74'ü 6 mm elekte kalmaktadır. Protein oranı % 26.1 dir.
Hastalık Durumu	: Verimi kısıtlayan hastalığı yoktur.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: İç Anadolu Bölgesi ve Geçit Bölgeleri ile benzer ekolojilere önerilmektedir.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

BOZOK

YAZLIK YEŞİL MERCİMEK

TESCİL YILI : 2013



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



BOZOK

YAZLIK YEŞİL MERCİMEK

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Dik gelişme tabiatlı, bitki boyu 29-43 cm, ilk bakla yüksekliği 19-29 cm, tohum kabuk rengi yeşil, kotiledon rengi sarı
Tarımsal Özellikleri	: Yazlık, kuraklığa toleranslıdır. Ekimden itibaren % 50 çiçeklenme gün sayısı 67-72 gün, olgunlaşma gün sayısı 93-110 gündür.
Verim Özellikleri	: Ortalama verim 130-187 kg/da
Teknolojik Özellikleri	: 1000 tane ağırlığı 61.4-66.3 g, 7 mm elekte % 1.04, 6 mm elekte % 78.9, 5 mm elekte 18.25
Hastalık Durumu	: Verimi kısıtlayan hastalığı yoktur.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: Orta Anadolu ve Geçit Bölgeleri ile benzer ekolojilere önerilmektedir.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

GÜMRAH

YAZLIK YEŞİL MERCİMEK

TESCİL YILI : 2013



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



GÜMRAH

YAZLIK YEŞİL MERCİMEK

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Dik gelişme tabiatındadır. Bitki boyu 26-41 cm, ilk bakla yüksekliği 16-25 cm
Tarımsal Özellikleri	: Yazlık, kuraklığa toleranslıdır. Ekimden itibaren % 50 çiçeklenme gün sayısı 68-72 gün, olgunlaşma gün sayısı 91-109 gündür. Makinalı hasada uygun bir çeşittir.
Verim Özellikleri	: Ortalama verim 140-173 kg/da
Teknolojik Özellikleri	: 1000 tane ağırlığı 55,8-69,0, elek analizinde % 14,8 6 mm % 55,1'i 5 mm % 4,5 i 4 mm elek üzerinde kalmıştır.
Hastalık Durumu	: Verimi kısıtlayan hastalığı yoktur.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: Orta Anadolu ve Geçit Bölgeleri ile benzer ekolojilere önerilmektedir.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

KARAGÜL

YAZLIK YEŞİL MERCİMEK

TESCİL YILI : 2013



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



KARAGÜL

YAZLIK YEŞİL MERCİMEK

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Dik gelişme tabiatlı, bitki boyu 28-41 cm, ilk bakla yüksekliği 17-28 cm, tohum kabuk rengi yeşil, kotiledon rengi sarı
Tarımsal Özellikleri	: Yazlık, kuraklığa toleranslıdır. Ekimden itibaren % 50 çiçeklenme gün sayısı 67-72 gün, olgunlaşma gün sayısı 92-110 gündür.
Verim Özellikleri	: Ortalama verim 138-176 kg/da
Teknolojik Özellikleri	: 1000 tane ağırlığı 65.0-72.2 g, 7 mm elekte % 3.05, 6 mm elekte % 77.7 , 5 mm elekte 16.51, Protein oranı % 24,5
Hastalık Durumu	: Verimi kısıtlayan hastalığı yoktur.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: Orta Anadolu ve Geçit Bölgeleri ile benzer ekolojilere önerilmektedir.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

ATABAY

NOHUT

TESCİL YILI : 2019



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



ATABAY

NOHUT

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Dik gelişme tabiatında olup, bitki boyu 43-58 cm, ilk bakla yüksekliği 21-33 cm arasındadır.
Tarımsal Özellikleri	: Yazlık, kuraklığa toleranslıdır. Ekimden itibaren % 50 çiçeklenme gün sayısı 80 gün, olgunlaşma gün sayısı 155 gündür. Makinalı hasada uygun bir çeşittir.
Verim Özellikleri	: Ortalama verim 124-200 kg/da
Teknolojik Özellikleri	: Tane rengi krem, koçbaşı tipindedir. 100 tane ağırlığı 40-52 g, elek analizinde % 45-72 si 9 mm, % 26-46'sı 8 mm, % 2-9'u 7 mm olarak elek üzerinde kalmıştır.
Hastalık Durumu	: Antraknoz ve Yanıklık hastalığına karşı toleranslıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: Orta Anadolu ve Geçit Bölgeleri ile benzer ekolojilere önerilmektedir.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

GÖKTÜRK

NOHUT

TESCİL YILI : 2019



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



GÖKTÜRK

NOHUT

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Dik gelişme tabiatında olup, bitki boyu 40-63 cm, ilk bakla yüksekliği 18-36 cm arasındadır.
Tarımsal Özellikleri	: Yazlık, kuraklığa toleranslıdır. Ekimden itibaren % 50 çiçeklenme gün sayısı 52 gün, olgunlaşma gün sayısı 110-115 gündür. Makinalı hasada uygun bir çeşittir.
Verim Özellikleri	: Ortalama verim 110-190 kg/da
Teknolojik Özellikleri	: Tane rengi krem, koçbaşı tipindedir. 100 tane ağırlığı 36-53 g, elek analizinde % 17-24'ü 9 mm, % 59-60'i 8 mm, % 15-24'ü 7 mm olarak elek üzerinde kalmıştır. Protein oranı %23
Hastalık Durumu	: Antraknoz - Yanıklık hastalığına karşı orta derecede toleranslıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: Orta Anadolu ve Geçit Bölgeleri ile benzer ekolojilere önerilmektedir.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

TUNÇ

NOHUT

TESCİL YILI : 2019



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



TUNÇ

NOHUT

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Dik gelişme tabiatında olup, bitki boyu 41-69 cm, ilk bakla yüksekliği 22-34 cm arasındadır.
Tarımsal Özellikleri	: Yazlık, kuraklığa toleranslıdır. Ekimden itibaren % 50 çiçeklenme gün sayısı 85 gün, olgunlaşma gün sayısı 155 gündür. Makinalı hasada uygun bir çeşittir.
Verim Özellikleri	: Ortalama verim 110-190 kg/da
Teknolojik Özellikleri	: Tane rengi bej, koçbaşı tipindedir. 100 tane ağırlığı 38-52 g, elek analizinde % 18-34'ü 9 mm, % 53'ü 8 mm, % 14-29'u 7 mm olarak elek üzerinde kalmıştır.
Hastalık Durumu	: Antraknoz - Yanıklık hastalığına karşı orta derecede toleranslıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: Orta Anadolu ve Geçit Bölgeleri ile benzer ekolojilere önerilmektedir.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

AYDOĞAN

NOHUT

TESCİL YILI : 2021



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



AYDOĞAN

NOHUT

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Dik gelişme tabiatında olup, bitki boyu 45-55 cm, ilk bakla yüksekliği 30 cm
Tarımsal Özellikleri	: Yazlık, kuraklığa toleranslıdır. Ekimden itibaren % 50 çiçeklenme gün sayısı 68-82 gün, olgunlaşma gün sayısı 117-118 dir. Makinalı hasada uygun bir çeşittir.
Verim Özellikleri	: Ortalama verim 150-230 kg/da
Teknolojik Özellikleri	: Koçbaşı tipindedir. 100 tane ağırlığı 41-53 g, elek analizinde % 8'i 9 mm, % 54'ü 8 mm, % 37'si 7 mm olarak elek üzerinde kalmıştır.
Hastalık Durumu	: Antraknoz - Yanıklık hastalığına karşı orta derecede toleranslıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: Orta Anadolu ve Geçit Bölgeleri ile benzer ekolojilere önerilmektedir.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

KARLI

NOHUT

TESCİL YILI : 2021



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



KARLI

NOHUT

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Dik gelişme tabiatında olup, bitki boyu 45-55 cm, ilk bakla yüksekliği 30 cm dir.
Tarımsal Özellikleri	: Yazlık, kuraklığa toleranslıdır. Ekimden itibaren % 50 çiçeklenme gün sayısı 85 gün, olgunlaşma gün sayısı 96-117 gündür. Makinalı hasada uygun bir çeşittir.
Verim Özellikleri	: Ortalama verim 140-220 kg/da
Teknolojik Özellikleri	: Koçbaşı tipindedir. 100 tane ağırlığı 38-44 g, elek analizinde % 11'i 9 mm, % 51'i 8 mm % 36'sı 7 mm olarak elek üzerinde kalmıştır. Protein oranı %24
Hastalık Durumu	: Antraknoz - Yanıklık hastalığına karşı orta derecede toleranslıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler	: Orta Anadolu ve Geçit Bölgeleri ile benzer ekolojilere önerilmektedir.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

BEYHEKİM

TIBBİ ADAÇAYI

TESCİL YILI : 2022



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



BEYHEKİM

TIBBİ ADAÇAYI

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Bitki boyu 54-60 cm, yaprak rengi açık yeşil ve yaprak dokusu ince, oranı %75.71
Tarımsal Özellikleri	: Soğuğa ve kurağa dayanıklı olup, alkali toprakları yüksek olmayan killi-tınlı topraklarda yetiştirilebilmektedir.
Verim Özellikleri	: Yeşil herba verimi: 1539 kg/da, Yeşil yaprak verimi: 1151 kg/da, 672 kg/da Drog Herba ve 351 kg/da Drog Yaprak verimi elde edilmektedir.
Teknolojik Özellikleri	: Uçucu yağ oranı :%2-3.0 olup, Alfa ve beta thujone oranını düşük olması
Hastalık Durumu	: Fusarium türlerine dayanıklıdır. Büyük ölçüde verim kaybına neden olan bir zararlısı yoktur.
Tavsiye Edilen Bilgiler	: İlk plantasyon yılında biçim tavsiye edilmez veya hafif bir biçim tavsiye edilir. Sonraki yıllarda biçim sonrası rejenerasyonu sağlamak açısından sulama tavsiye edilmektedir.

Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:

Tohumluk miktarı	: Klon tescilli bir çeşittir.
Dikim zamanı	: Dikim zamanı Orta Anadolu Bölgesi için son don tehlikesinin kalktığı Mayısın ikinci haftası yapılabilir.
Dikim mesafesi	: Normal şartlarda 60x40 cm dikim aralığı tavsiye edilmektedir.
Gübreleme	: Dekara saf 6 kg gübreleme yapılabilir.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

SANCAR BEY

KİŞNİŞ

TESCİL YILI : 2022



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



SANCAR BEY

KİŞNİŞ

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: İri taneli
Tarımsal Özellikleri	: Soğuğa ve kurağa dayanıklı olup, alkali taban suyu yüksek olmayan killi-tınlı topraklarda yetiştirilebilmektedir.
Verim Özellikleri	: Orta Anadolu koşullarında tohum verimi ortalama 80-150 kg/da'dır.
Teknolojik Özellikleri	: Uçucu yağ oranı :% 0.5 civarında olup, uçucu yağın bileşiminde %88 linalool bulunmaktadır.
Hastalık Durumu	: Büyük ölçüde verim kaybına neden olan bir hastalık ve zararlısı bulunmamaktadır.
Tavsiye Edilen Bilgiler	: Kışlık ekimi tohum ve kalite özelliklerini (uçucu yağ oranı ve verimi) arttırdığı için tavsiye edilir.

Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:

Tohumluk miktarı	: Dekara 2-2.5 kg tohum tavsiye edilmektedir.
Ekim Zamanı	: Kışlık ekimlerde, Ekim ayının 2. Haftası, ilkbahar ekimlerinde mart başı ortası ekimi tavsiye edilir.
Ekim mesafesi	: Yabancı ot kontrol metoduna göre değişmekle birlikte 25 cm sıra arası uygundur.
Gübreleme	: Dekara saf 6 kg gübreleme yapılabilir.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

ULUĞ BEY

İSTANBUL KEKİĞİ

TESCİL YILI : 2023



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



ULUĞ BEY

İSTANBUL KEKİĞİ

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Tür oldukça dik gelişen bir yapıya sahip olup üçüncü yıl plantasyonunda bitki boyu ort. 82.8 cm'ye kadar çıkmaktadır. Diğer kekik türlerine göre oldukça geç çiçeklenmekte, vejetasyon ilerledikçe otsu yapısını korumaktadır.
Tarımsal Özellikleri	: Soğuğa dayanıklı olup, taban suyu yüksek olmayan killi-tınlı topraklar yetiştiriciliği için idealdir.
Verim Özellikleri	: Bir yetiştirme sezonunda üç yıllık plantasyondan, tek biçimde 1695 kg/da yeşil herba, 678 kg/da drog herba ve 272 kg/da drog yaprak verimi elde edilmektedir.
Teknolojik Özellikleri	: Üç yıllık plantasyondan ortalama % 6.2 uçucu yağ elde edilmekte olup, %76.53-82.1 carvacrol içermektedir.
Hastalık Durumu	: Sıcaklık ve nem koşullarına bağlı olarak Boeremia exigua var. exigua ve Alternaria spp. türleri görülebilmektedir.
Tavsiye Edilen Bilgiler	: Hastalıkların kontrolü açısından damla sulama sistemi tavsiye edilmektedir.

Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:

Tohumluk miktarı	: Klon tescilli bir çeşittir.
Ekim Zamanı	: Dikim zamanı Orta Anadolu Bölgesi'nde ilkbahar son don riskinin ortadan kalktığı Mayıs ayının 2. haftası olarak tavsiye edilmektedir.
Ekim mesafesi	: Yabancı ot kontrol yöntemine göre değişmekle birlikte, 40x30 cm bitki sıklığı tavsiye edilmektedir.
Gübreleme	: Dekara saf 6 kg gübre tavsiye edilmektedir.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

YUSUF1941

ÇÖREK OTU

TESCİL YILI : 2024



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



YUSUF1941

ÇÖREK OTU

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Kapsül çatlatmayan, dik gelişme tabiatlı, çiçek rengi beyaz, orta-iri kapsül büyüklüğüne sahip, bitki boyu 50-90 cm.
Tarımsal Özellikleri	: Hafif killi, kumlu-tınlı, süzek, alüvyal, drenajı iyi topraklarda iyi tohum verir. Taban suyu yüzeye yakın ağır topraklardan hoşlanmaz. Besin maddesince zengin topraklarda verim artışı görülür.
Verim Özellikleri	: Ortalama 150 kg.
Teknolojik Özellikleri	: Sabit yağ oranı %39-40 olup, ana yağın bileşenleri, linoleik asit (C18:2n6c) %58-61, oleik asit (C18:1n9c) %23-26, palmitik asit (C16:0) %9.6-12.6, stearik asit (C18:0) % 2.7-4.1'tir.
Hastalık Durumu	: Bitkinin verim kaybına neden olan önemli hastalık ve zararlısı bulunmamakla birlikte, taban suyu yüksek ve toprak yapısı ağır olmayan yerlerde üretim yapılarak kök çürüklüğü sorunları ortadan kaldırılmalıdır.
Tavsiye Edilen Bilgiler	: Çiçeklenme dönemine kadar (özellikle sapa kalkma öncesinde) ve çiçeklenmenin hemen öncesinde birer kere su ihtiyacı karşılanmalıdır. Ekimden sonra merdane (silindir) çekilmelidir.
Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:	
Tohumluk miktarı	: Dekara 1.5-2 kg tohum tavsiye edilmektedir.
Ekim Zamanı	: Kışlık ekimlerde, Ekim ayı sonundan, Kasım ayının ilk yarısına kadar; ilkbahar ekimlerinde Şubat ayının 2. yarısından Nisan ayı başına kadar yapılmalıdır.
Ekim mesafesi	: Mibzerle ekimde sıra arası 15-20 cm olarak önerilmektedir.
Gübreleme	: Sadece taban gübresi olarak dekara 15-20 kg, 15-15-15 NPK, 20-20-0 NP, DAP yada saf 6 kg N ve saf 6 kg P. Fosforlu gübrenin tamamı ve azotun yarısı ekimle, azotun geriye kalanı ise dallanma başlangıcında verilmelidir.



DEFNE

YONCA

TESCİL YILI : 2020



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



DEFNE

YONCA

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Bitki boyu ortalama 68.8 cm'dir. Salkım şeklindeki çiçekleri mor renktedir. Meyve 2-3 bazende 4 kıvrımlıdır.
Tarımsal Özellikleri	: 6851 kg/da yeşil ot verimi ile standart ortalama veriminden (5939 kg/da) % 15.4 daha fazla, 1717 kg/da kuru ot verimiyle de standart ortalama veriminden (1496 kg/da) % 14.8 daha fazla verim vermektedir.
Teknolojik Özellikleri	: %10 çiçeklenme devresinde biçildiğinde kuru otunda, ham protein % 19.63, ham selüloz % 28.99, kuru madde % 93.55, ham yağ % 2.24, NDF % 40.87, ADF % 31.17, ADL % 8.50 ve NYD 147
Tavsiye Edilen Bölgeler	: Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit Bölgeleri
Çeşidin Yetiştirilmesi ile İlgili Bazı Öneriler :	
Tohumluk Miktarı	: Sıraya ekim için 1-2 kg/da, serpmeye ekimde 3-4 kg/da tohum kullanılır.
Ekim Zamanı	: İlkbahar ve sonbaharda ekilebilir.
Ekim Derinliği	: Tohumlar 1-2 cm derinliğinde atılmalıdır.
Gübreleme	: Toprak analiz sonuçlarına göre gübreleme yapılması tavsiye edilmektedir.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

ZÜMRÜT

YONCA

TESCİL YILI : 2020



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



ZÜMRÜT

YONCA

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Bitki boyu ortalama 65.8 cm'dir. Salkım şeklindeki çiçekleri mor renktedir. Tohum rengi koyu ve açık taba ile koyu ve açık sarıdır.
Tarımsal Özellikleri	: 6317 kg/da yeşil ot verimi ile standart ortalama veriminden % 6.4 daha fazla, 1593 kg/da kuru ot verimiyle de standart ortalama veriminden % 6.5 daha fazla verim vermektedir.
Teknolojik Özellikleri	: Ham protein % 19.61, ham selüloz % 33.54, kuru madde % 93.19, ham yağ % 2.29, NDF % 42.54, ADF % 34.10, ADL % 9.84 ve NYD 136'dır.
Çeşide Has Özellikler	: Dormansi seviyesi 4'dür.

Çeşidin Yetiştirilmesi ile İlgili Bazı Öneriler :

Tohumluk Miktarı	: Sıraya ekimde 1-2 kg/da, serpmeye ekimde 3-4 kg/da
Ekim Zamanı	: İlkbahar ve sonbaharda ekilebilir.
Ekim Derinliği	: Tohumlar 1-2 cm derinliğinde atılmalıdır.
Gübreleme	: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktarlar önerilir.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

ÖZERBEY-03

KORUNGA

TESCİL YILI : 2003



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



ÖZERBEY-03

KORUNGA

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Ana sap uzunluğu 50-105cm olup dik gelişir. 1000 tane ağırlığı 14-18 g'dır.
Tarımsal Özellikleri	: Bölgemizde ilkbaharda ekilir ve dekara 5-6 kg tohum atılır. Kışa ve kurağa dayanımı iyidir. Çiçeklenme gün sayısı 141 ile 158 gün arasındadır. Yatmaya dayanıklıdır.
Teknolojik Özellikleri	: Kuru otunda ham protein oranı %13-15 arasındadır.
Verim Özellikleri	: İç Anadolu şartlarında ortalama 335 kg/da kuru ot, 1215 kg/da yeşil ot alınır. Yılda bir biçim yapılır. Tohum verimi 30-60 kg/da'dır.
Hastalık Durumu	: Küllemeye dayanımı orta düzeydedir.
Çeşidin Yetiştirilmesi ile İlgili Bazı Öneriler :	
Tohumluk Miktarı	: Dekara 5-6 kg tohum kullanılır.
Ekim Zamanı	: İlkbaharda Mart, sonbaharda Ekim ayıdır.
Ekim Derinliği	: Tohumlar 1.5-2.0 cm derinliğinde ekilmelidir.
Gübreleme	: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktarlar önerilir.



TARM BEYAZI-98

MACAR FİĞİ

TESCİL YILI : 1998



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



TARM BEYAZI-98

MACAR FİĞİ

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Ana sap uzunluğu 40-80cm'dir. Çiçek rengi beyaz olup, 13-17 mm uzunluğunda salkım şeklindedir. Tohum rengi siyah benekli ve noktalı, elipsoid yuvarlak şeklindedir. 1000 dane ağırlığı 35-50g dır.
Tarımsal Özellikleri	: Kışa dayanıklılığı çok iyi, kurağa dayanıklılığı iyi bir çeşittir. Tahıllar (özellikle Arpa) ile karışım halinde kuru ot ve silaj üretmek amacıyla yetiştirilmektedir.
Teknolojik Özellikleri	: Kuru ve yaş ot kalitesi iyidir.
Verim Özellikleri	: Kuru ot verimi 200-400 kg/da, tane verimi 75-150 kg/da'dır.
Hastalık Durumu	: Külleme ve yaprak lekesine dayanıklılığı iyidir.
Çeşidin Yetiştirilmesi ile İlgili Bazı Öneriler :	
Tohumluk Miktarı	: Ekimde 7-8 kg/da tohum kullanılır.
Ekim Zamanı	: Sonbaharda Ekim ayıdır.
Ekim Derinliği	: Tohumlar 3-4 cm derinliğinde ekilmelidir.
Gübreleme	: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktarlar önerilir.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

ANADOLU PEMBESİ-2002

MACAR FİĞİ

TESCİL YILI : 2002



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



ANADOLU PEMBESİ-2002

MACAR FİĞİ

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Ana sap uzunluğu 24.6 - 61.8 cm olup yarı yatık gelişir. 1000 tane ağırlığı 47.8 - 59.9 g'dır.
Tarımsal Özellikleri	: Kışa dayanıklılığı çok iyi ve kurağa dayanıklılığı iyi olan bir çeşittir. Çiçek rengi pembedir. Çiçeklenme gün sayısı 157 ile 239 gün arasındadır. Fizyolojik olum gün sayısı 201 ile 272 gün arasında değişir. Ekimde 8-10 kg/da tohum kullanılır. Tahıllar (özellikle Arpa) ile karışım halinde kuru ot ve silaj üretmek amacıyla yetiştirilebilir. Beyaz çiçekli Macar fiğine göre (örnek, Tarm Beyazı-98) 7 gün daha erkencidir.
Verim Özellikleri	: Kuru ot verimi 52.5 ile 846.8 kg/da olup tane verimi 68.0 ile 207.1 kg/da'dır. Ortalama kuru ot ve tane verimi sırayla 337.8 ve 107.9 kg/da'dır.
Teknolojik Özellikleri	: Kuru otundaki ham protein oranı % 14.8'dir.
Hastalık Durumu	: Külleme ve yaprak lekesine dayanıklılığı iyidir.
Tavsiye Edilen Bilgiler	: Orta Anadolu Bölgesi ve benzer şartlara sahip bölgelerde kışlık olarak yetiştirilir.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

KANSUR

MACAR FİĞİ

TESCİL YILI : 2013



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



KANSUR

MACAR FİĞİ

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Bitki boyu 74.2 cm olup doğal bitki boyu 43.0 cm ile 58.7 cm arasındadır. Ana sap kalınlığı 2.3- 2.8 mm'dir. Bitkideki ana sap sayısı 2-4'dür. Beyaz çiçeklidir. 1000 tane ağırlığı 32.9 g'dır. Yatma durumu yarı yatık özelliktedir.
Tarımsal Özellikleri	: Kışa dayanması çok iyi, kurağa dayanması iyidir. Çiçeklenme gün ve fizyolojik olum gün sayısı sırayla 176-204 ve 222-241'dür. Yeşil ot verimi 1773.7 kg/da, kuru ot verimi 489.6 kg/da'dır.
Teknolojik Özellikleri	: Kuru otunda ham protein, ham lif, kuru madde, NDF, ADF ve ham yağ oranları sırayla % 12.6, % 22.2, % 91.8, % 49.7, % 36.1 ve % 0.6'dır. Tanede ham protein, kuru madde ve ham yağ oranları sırayla % 24.8, % 92.6 ve % 1.8
Çeşide Has Özellikler	: Kışlık bir çeşittir.
Çeşidin Yetiştirilmesi ile İlgili Bazı Öneriler :	
Tohumluk Miktarı	: Ekimde 7-8 kg/da tohum kullanılır.
Ekim Zamanı	: Sonbaharda Ekim ayıdır.
Ekim Derinliği	: Tohumlar 3-4 cm derinliğinde ekilmelidir.
Gübreleme	: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktarlar önerilir.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

AYAZ08

YAYGIN FIĞ

TESCİL YILI : 2008



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



AYAZO8

YAYGIN FİĞ

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Ana sap uzunluğu 26.0-31.7 cm, ana dal sayısı 1 adettir. 1000 tane ağırlığı 68.1 g
Tarımsal Özellikleri	: Çiçeklenme gün sayısı 174-213, Fizyolojik olum gün sayısı 215-253 arasında değişir. Soğuğa toleranslı, kurağa dayanıklıdır. Tanesi için yetiştirilir. Kar örtüsü olmadan -15 °C'ye kadar soğuklardan zarar görmemektedir.
Verim Özellikleri	: Biyolojik verimi 342.6 kg/da, tane verimi 107.7 kg/da
Teknolojik Özellikleri	: Tanesinde ham protein oranı % 27.7, ham selüloz oranı % 4.6
Tavsiye Edilen Bölgeler	: Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit Bölgelerinde kış sert geçmeyen yerler için tavsiye edilir.

Çeşidin Yetiştirilmesi ile İlgili Bazı Öneriler :

Ekim Normu	: Dekara 8-10 kg/da tohumluk kullanılmalıdır.
Ekim Zamanı	: İlkbahar ve sonbaharda ekilebilir.
Ekim Derinliği	: Ağır topraklarda 3-4 cm, hafif topraklarda 6-7 cm
Gübreleme	: Toprak analiz sonuçlarına göre gübreleme yapılması tavsiye edilmektedir.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

ÜNAL 17

KILÇIKSIZ BROM

TESCİL YILI : 2017



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



ÜNAL 17

KILÇIKSIZ BROM

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Bitki boyu 84.4 cm, başak yapısı salkım şeklindedir. Başaklanma döneminde çiçekler sarı renktedir. 1000 tane ağırlığı 3-4 g kadardır.
Tarımsal Özellikleri	: Uzun ömürlü çok yıllık köksaplı gelişen bir yem bitkisidir. Tohum verimi kırıç şartlarda 10-20 kg/da, sulu koşullarda 30-60 kg/da arasındadır.
Teknolojik Özellikleri	: Kuru otunda protein oranı %8.79, NDF değeri % 66.06, ADF değeri %38.93, nispi yem değeri ise 82.5'dir.
Çeşide Has Özellikler	: Kırıç şartlar için geliştirilmiştir. Hayvan otlatmak ve kaliteli kaba yem üretmek için yalnız ve karışım halinde yetiştirilebilir.

Çeşidin Yetiştirilmesi ile İlgili Bazı Öneriler :

Tohumluk Miktarı	: Dekara 1-2 kg tohum kullanılır.
Ekim Zamanı	: İlkbahar ve sonbaharda ekilebilir.
Ekim Derinliği	: Tohumlar 1-2 cm derinliğinde atılmalıdır.
Gübreleme	: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktarlar önerilir.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

KIRAÇ

OTLAK AYRIĞI

TESCİL YILI : 2021

TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



KIRAÇ

OTLAK AYRIĞI

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Bitki boyu 60.5 cm, çiçek durumu sık başaktır. Bir başakcıkta 4-10 adet çiçek bulunur. Tohumlar kılçıksız, bin tane ağırlığı 2-3 g kadardır.
Tarımsal Özellikleri	: Otlak ayrığı kurağa ve soğuğa çok dayanıklı, uzun ömürlü bir yem bitkisidir. Yıllık yağışı 250-300 mm olan yerlerde başarı ile yetiştirilir. Otlatmaya çok iyi dayanır. Otunun besleyici ve kaliteli olması nedeniyle iyi bir otlatma bitkisi olarak kabul edilir.
Teknolojik Özellikleri	: Kuru otunda protein oranı % 11.81, NDF değeri % 44.75, ADF değeri % 35.62, ADL değeri % 6.51, nispi yem değeri ise 127'dir.
Çeşide Has Özellikler	: Kiraç şartlar için geliştirilmiştir. Çeşit, ot amaçlı ve otlatma amaçlı yalın ve karışım halinde kullanılabilir.

Çeşidin Yetiştirilmesi ile İlgili Bazı Öneriler :

Ekim Normu	: Dekara 1.0 kg tohum atılır.
Ekim Zamanı	: İlkbahar ve sonbaharda ekilebilir.
Ekim Derinliği	: Tohumlar 1-2 cm derinliğinde atılmalıdır.
Gübreleme	: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktarlar önerilir.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

ARSLANBEY

KETENCİK

TESCİL YILI : 2017



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



ARSLANBEY

KETENCİK

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Tarımsal Özellikleri	: Kışlık ve alternatif gelişme tabiatında, olgunlaşma gün sayısı 220-230 gün
Verim Özellikleri	: İklim koşullarına bağlı olarak tohum verimi 100-180 kg/da, yağ verimi 40-72 kg/da civarındadır.
Teknolojik Özellikleri	: Yağ oranı % 38-40, 1000 tane ağırlığı 1,00 – 1,30 g
Tavsiye Edilen Bölgeler	: İç Anadolu ve Geçit bölgelerinin kıraç, taban/yarı taban alanlarına tavsiye edilmektedir.
Çeşidin Yetiştirilmesi ile İlgili Bazı Öneriler :	
Tohumluk Miktarı	: 700-1000 g/da sertifikalı tohum
Ekim Zamanı	: 1 Ekim – 15 Ekim tarihleri arası
Ekim Derinliği	: 2-3 cm
Gübreleme	: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktarlar önerilir.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

KARAHAN

PELEMİR

TESCİL YILI : 2017



TARM

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA

☎ 0312 343 10 50



KARAHAN

PELEMİR

Çeşit Sahibi Kuruluş	: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara
Morfolojik Özellikleri	: Pembe çiçekli, bitki boyu 130-150 cm, yan dal sayısı 10-13 adet, olgunlaşma gün sayısı 243-275 gün
Tarımsal Özellikleri	: Alternatif gelişme tabiatlı ve orta erkenci, soğuğa ve kurağa dayanıklı
Verim Özellikleri	: İklim koşullarına bağlı olarak tohum verimi 220-260 kg/da, yağ verimi 52-65 kg/da
Teknolojik Özellikleri	: Yağ oranı % 20-24 Bin tane ağırlığı 16,5-20,1 gr
Tavsiye Edilen Bölgeler	: Orta Anadolu ve Geçit Kuşağı Bölgelerinin kıraç ve yarı taban alanlarına önerilmektedir.
Çeşidin Yetiştirilmesi ile İlgili Bazı Öneriler :	
Tohumluk Miktarı	: 2-4 kg/da
Ekim Zamanı	: 1 Ekim-15 Ekim tarihleri arası
Ekim Derinliği	: 4-5 cm
Gübreleme	: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktarlar önerilir.



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

TARM



Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Şehit Cem Ersever Cad. No.11 Yenimahalle / ANKARA

+90 312 343 10 50 arastirma.tarimorman.gov.tr/tarlabitkileri

[f](#) [@](#) tarlabitkilerimae [t](#) tarlabitkileri