

PENGARUH JARAK TANAM TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN KACANG PANJANG (*Vigna sinensis* L.)

Ketut Agus Alit Saputra¹, Faridatul Mukminah², Yuliantina Azka³
Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Tridianti, Palembang, Sumatera Selatan
Email : Ketutalit153@gmail.com

ABSTRAK

KETUT AGUS ALIT SAPUTRA. Pengaruh Jarak Tanam terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Kacang Panjang (*Vigna sinensis* L.). dibimbing oleh **Faridatul Mukminah** dan **Yuliantina Azka**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Pengaruh Jarak Tanam terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Kacang Panjang (*Vigna sinensis* L.). Penelitian dilaksanakan dari bulan Agustus 2024 hingga Oktober 2024 di Lahan Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Tridianti, yang terletak di Desa Semambu, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir dan Provinsi Sumatra Selatan. Metode percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan lima perlakuan lima ulangan. Setiap satuan percobaan terdiri dari tiga tanaman sampel. Perlakuan yang diberikan adalah sebagai berikut J1= 30 cm x 30 cm, J2= 30 cm x 35 cm, J3= 30 cm x 40 cm, J4= 30 cm x 45 cm dan J5= 30 cm x 50 cm. Parameter yang diamati meliputi tinggi tanaman (cm), jumlah polong per tanaman (buah), jumlah polong per petak (buah), berat polong per tanaman (g) dan berat polong per petak (kg). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh jarak tanam sangat nyata terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang panjang dengan perlakuan J3= 30 cm x 40 cm memberikan hasil terbaik, ditunjukkan dengan nilai tertinggi pada semua parameter dibandingkan perlakuan lainnya.

Kata kunci: Kacang Panjang, Jarak Tanam

ABSTRACT

KETUT AGUS ALIT SAPUTRA. The Effect of Plant Distance on the Growth and Yield of Long Beans (*Vigna sinensis* L.). Supervised by **Faridatul Mukminah** and **Yuliantina Azka**. This study aimed to examine the effect of plant distance on the growth and yield of long beans (*Vigna sinensis* L.). The study was conducted from August 2024 to October 2024 at the Experimental Field of the Faculty of Agriculture, Tridianti University, located in Semambu Village, North Indralaya District, Ogan Ilir Regency, South Sumatra Province. The experimental method used was a Randomized Block Design (RBD) with five treatments and five replications. Each experimental unit consisted of three sample of plants. The treatments were as follows: J1 = 30 cm x 30 cm, J2 = 30 cm x 35 cm, J3 = 30 cm x 40 cm, J4 = 30 cm x 45 cm, and J5 = 30 cm x 50 cm. The parameters observed included plant height (cm), number of pods per plant (fruit), number of pods per plot (fruit), pod weight per plant (g), and pod weight per plot (kg). The results showed that plant distance significantly affected the growth and yield of long beans, with the J3 = 30 cm x 40 cm treatment producing the best results, as indicated by the highest values for all parameters compared to other treatments.

Keywords: Long Beans, Plant distance

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kacang panjang yang memiliki nama ilmiah *Vigna sinensis*, berasal dari daerah tropis di Asia Tenggara. Penelitian yang lain menyebutkan bahwa asal mula kacang panjang adalah dari India atau Cina. Tanaman kacang panjang dikenal dengan sejumlah nama yaitu, buncis panjang. Seiring waktu kacang panjang menyebar ke seluruh dunia dan menjadi salah satu sayuran yang populer di berbagai masakan (Mulyadin, 2024).

Kacang panjang merupakan tanaman sayuran yang mudah diolah menjadi makanan dan kaya nutrisi seperti vitamin, protein, lemak nabati, karbohidrat dan mineral. Kacang panjang terutama bagian biji dan polongnya berfungsi sebagai pengatur metabolisme tubuh dan memperlancar proses pencernaan bagi tubuh manusia (Kurdianingsih *et al.*, 2015).

Biji kacang panjang terdapat sumber protein nabati yang memiliki kandungan protein (17,30%), karbohidrat (70,00%), air (12,20%) dan lemak (1,50%). Kacang panjang sebagai salah satu jenis dari sayuran dapat menjadi pilihan yang mudah bagi masyarakat Indonesia. Tanaman ini berbentuk memanjang yang tumbuhnya merambat atau menjalar. Daun kacang panjang berupa daun majemuk yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) helai. Batangnya sedikit berbulu dan liat. Kacang panjang bersifat dwi guna, yang artinya memiliki dua fungsi yaitu buahnya dapat dimanfaatkan sebagai sayuran dan akarnya dapat menyerap N bebas yang bisa digunakan sebagai penyubur tanah. Tanaman kacang panjang dikatakan sebagai penyubur tanah karena pada akarnya terdapat bintil-bintil bakteri *Rhizobium* (Anto, 2016).

Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 mencatat produksi kacang panjang di Indonesia sebanyak 360.674 ton pada tahun 2022, jumlah tersebut turun 6% dibandingkan pada tahun 2020 sebanyak 383.685 ton. Produksi kacang panjang cenderung menurun pada tahun 2012 atau dalam satu dekade terakhir, dengan produksi tertinggi pada tahun 2021 yakni 455.615 ton.

Upaya meningkatkan produksi kacang panjang adalah dengan menggunakan jarak tanam yang sesuai. Jarak tanam pada dasarnya adalah memberikan kemungkinan tanaman untuk tumbuh dengan baik tanpa mengalami persaingan dalam hal pengambilan air, unsur hara, cahaya matahari dan memudahkan pemeliharaan tanaman (Agam *et al.*, 2021).

Hasil penelitian Jali *et.al* (2020) pada tanaman kacang panjang menunjukkan bahwa penggunaan jarak tanam 30 cm x 40 cm memberikan hasil terbaik terhadap jumlah polong per tanaman, berat polong per tanaman, panjang polong per tanaman dan berat berangkasan per tanaman.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh jarak tanam terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang panjang (*Vigna sinensis* L.).

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh perbedaan jarak tanam terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang panjang (*Vigna sinensis* L.).

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat bagi para petani, khususnya di Sumatera Selatan dalam pengembangan produktivitas kacang panjang.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tempat dan Waktu

Penelitian ini telah dilaksanakan di Lahan Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Tridinanti yang berada di Desa Semambu Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian telah dilaksanakan pada bulan Agustus 2024 sampai dengan Oktober 2024

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 5 (lima) perlakuan dan 5 (lima) ulangan, setiap ulangan terdiri dari 124 tanaman, maka jumlah tanaman yang diteliti adalah sebanyak 620 tanaman. Jumlah sampel yang diamati dalam setiap satuan percobaan diambil sebanyak 3 (tiga) tanaman contoh.

Perlakuan yang dirancang dalam penelitian jarak tanam ini adalah sebagai berikut:

J1 = 30 cm x 30 cm

J2 = 30 cm x 35 cm

J3 = 30 cm x 40 cm

J4 = 30 cm x 45 cm

Pengamatan pengaruh jarak tanam yang akan diamati dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Tinggi Tanaman (cm)

Pengukuran tinggi tanaman kacang panjang dilakukan dengan mengukur dari pangkal batang utama sampai titik tumbuh dengan menggunakan tali rafia. Pengukuran dilakukan setiap minggu sekali mulai umur 7 hari sampai umur 42 hari setelah tanam pada 3 (tiga) tanaman sampel.

b. Jumlah Polong per Tanaman (buah)

Perhitungan jumlah polong per tanaman dilakukan mulai umur 45 hari setelah tanam sampai umur 60 hari, dilakukan sebanyak 6 kali dalam jangka waktu 3 hari sekali yang ada pada masing-masing 3 (tiga) tanaman sampel kemudian diakumulasikan.

c. Jumlah Polong per Petak (buah)

Perhitungan jumlah polong per petak ditentukan dengan cara menghitung semua polong yang ada pada setiap petak mulai umur 45 hari setelah tanam sampai umur 60 hari setelah tanam sebanyak 6 kali dalam jangka waktu 3 hari sekali kemudian diakumulasikan.

d. Berat Polong per Tanaman (g)

Perhitungan berat polong per tanaman dilakukan umur 45 hari setelah tanam sampai umur 60 hari setelah tanam dilakukan sebanyak 6 kali dalam jangka waktu 3 hari sekali, berat polong per tanaman ditentukan dengan cara menimbang polong yang ada pada 3 (tiga) tanaman sampel dengan timbangan digital kemudian diakumulasikan.

e. Berat Polong per Petak (kg)

Perhitungan berat polong per petak ditentukan dengan cara menimbang polong yang ada pada setiap petak mulai umur 45 hari setelah tanam sampai umur 60 hari setelah tanam, sebanyak 6 kali dalam jangka waktu 3 hari sekali, ditentukan dengan cara menimbang polong dengan timbangan analog kemudian diakumulasikan.

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan diuji dengan menggunakan analisis keragaman Rancangan Acak Kelompok (RAK) seperti berikut:

Tabel 1 Daftar Analisis Keragaman Rancangan Acak Kelompok

Sumber Keragaman	Derajat Bebas	Jumlah Kuadrat	Kuadrat Tengah	F	F tabel	
(SK)	(DB)	(JK)	Hitung (KT)		5%	1%
Kelompok KTK/KTG	K -1 = V1	JKK		JKK/v1	(v1,v3)	
Perlakuan KTP/KTG	T -1 = V2	JKP		JKP/v2	(v2,v3)	
Galat (G)	vt-v1-v2= v3	JKG	JKG/v3	-		
Total (T)	(K.P)-1					

Sumber : (Hanafiah, 2004).

Uji nyata analisis keragaman dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel berikut ini:

1. Jika nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel 5% maka perlakuan tersebut berpengaruh nyata, dan dinotasikan dengan (n).
2. Jika nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel 1% maka perlakuan tersebut berpengaruh sangat nyata, dinotasikan dengan (sn).
3. Jika nilai F hitung lebih kecil atau sama dengan nilai F tabel 5% menunjukkan perlakuan tersebut berpengaruh tidak nyata, dinotasikan dengan (tn).

Apabila hasil uji F hitung diperoleh pengaruh nyata atau sangat nyata, maka dilanjutkan dengan uji beda antar perlakuan dan uji tes beda nyata jujur (BNJ) dengan rumus:

$$BNJ = (q \cdot a) \times \sqrt{\frac{KTG}{r}}$$

Keterangan : BNJ : Beda Nyata Jujur
q.a : Tabel q pada α 5%
KTG : Kuadrat Tengah Galat
r : Ulangan

Tingkat ketelitian dari penelitian ini maka diuji dengan koefisien keragaman (KK), dengan rumus sebagai berikut:

$$KK = \frac{\sqrt{KTG}}{\bar{y}} \times 100 \%$$

Keterangan : KTG : Kuadrat Tengah Galat
 $\bar{Y}$: Rerata Umum dari Seluruh Data
 KK : Koefisien Keragaman

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Hasil dari pengamatan rata-rata dan analisis keragaman seluruh parameter yang diamati terdapat pada Lampiran 8 sampai dengan Lampiran 27. Hasil Analisis keragaman terhadap semua hasil yang diamati dari semua parameter dapat dilihat dari Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Daftar Hasil Analisis Keragaman untuk Semua Parameter.

Peubah yang diamati	F Hitung	KK (%)
1. Pertumbuhan Tanaman		
A. Tinggi Tanaman (cm)		
Tinggi Tanaman 7 hst	80,31 ^{sn}	1,78
Tinggi Tanaman 14 hst	167,41 ^{sn}	0,96
Tinggi Tanaman 21 hst	1186,00 ^{sn}	0,30
Tinggi Tanaman 28 hst	5037,18 ^{sn}	0,06
Tinggi Tanaman 35 hst	5164,24 ^{sn}	0,05
Tinggi Tanaman 42 hst	113,50 ^{sn}	0,16
2. Hasil Tanaman		
a. Jumlah Polong per Tanaman (buah)	320,10 ^{sn}	1,27
b. Jumlah Polong per Petak (buah)	25,01 ^{sn}	7,09
c. Berat Polong per Tanaman (g)	305,29 ^{sn}	0,95
d. Berat Polong per Petak (kg)	20,59 ^{sn}	5,33
F Tabel 5%	3,01	
F Tabel 1%	4,77	

Keterangan: KK : Koefisien Keragaman
 hst : Hari setelah tanam
 g : gram
 sn : sangat nyata
 n : nyata
 tn : tidak nyata

Berdasarkan hasil analisis keragaman pada Tabel 2 menunjukkan bahwa jarak tanam berpengaruh sangat nyata terhadap semua parameter yang diamati tinggi tanaman, jumlah polong per tanaman, jumlah polong per petak, berat polong pertanaman dan berat polong per petak.

1. Tinggi Tanaman (cm)

Hasil pengamatan terhadap rata-rata tinggi tanaman dan analisis keragaman pada umur 7 hst, 14 hst, 21 hst, 28 hst, 35 hst dan 42 hst dapat di lihat lampiran 8 sampai dengan lampiran 19. Berdasarkan hasil analisis keragaman pada Tabel 2 menunjukkan bahwa jarak tanam berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman. Beda antara masing-masing perlakuan terhadap tinggi tanaman berdasarkan uji BNJ_{0,05} dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Pengaruh Jarak Tanam terhadap Tinggi Tanaman 7 hst, 14 hst, 21 hst, 28 hst, 35 hst dan 42 hst.

Perlakuan	Pengamatan Hari Ke-					
	7 hst	14 hst	21 hst	28 hst	35 hst	42 hst
J1	21,40	a 25,93	a 64,00	a 164,67	a 179,87	a 203,53
J2	22,73	b 26,93	b 65,20	b 165,67	b 180,80	b 204,53
J3	25,73	e 30,07	e 72,00	e 172,60	e 187,87	e 207,53
J4	24,73	d 28,13	d 68,00	d 168,60	d 183,80	d 206,53
J5	23,73	c 27,53	c 67,00	c 167,67	c 182,80	c 205,20
BNJ _{0,05}	0,82	0,52	0,39	0,19	0,19	0,65

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf pada kolom yang sama menunjukkan bahwa perlakuan berbeda tidak nyata pada taraf uji BNJ 5%.

Hasil uji BNJ_{0,05} pada Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa pengaruh jarak tanam terhadap tinggi tanaman 42 hst pada perlakuan J3 (30 cm x 40 cm) menghasilkan tinggi tanaman setinggi 207,53 cm, berbeda nyata dengan perlakuan lainnya.

2. Jumlah Polong per Tanaman (buah)

Hasil pengamatan terhadap rata-rata jumlah polong per tanaman dan analisis keragaman dapat dilihat pada Lampiran 20 sampai lampiran 21. Berdasarkan hasil analisis keragaman pada Tabel 2 menunjukkan bahwa jarak tanam berpengaruh sangat nyata terhadap jumlah polong per tanaman. Beda antara masing-masing perlakuan terhadap jumlah polong per tanaman berdasarkan uji BNJ_{0,05} dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Pengaruh Jarak Tanam terhadap Jumlah Polong per Tanaman (buah).

Perlakuan	Total jumlah polong per tanaman (buah)	BNJ _{0,05} = 1,39
J1	49,27	a
J2	54,07	b
J3	64,93	e
J4	57,80	d
J5	56,13	c

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan bahwa perlakuan berbeda tidak nyata pada taraf uji BNJ 5%.

Berdasarkan hasil uji BNJ_{0,05} pada Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa pengaruh jarak tanam terhadap jumlah polong per tanaman pada perlakuan J3 dengan jarak tanam (30 cm x 40 cm) menghasilkan jumlah polong per tanaman 64,93 buah, berbeda nyata dengan

perlakuan lainnya.

3. Jumlah Polong per Petak (buah)

Hasil Pengamatan terhadap rata-rata jumlah polong per petak dan analisis keragaman dapat dilihat pada Lampiran 22 sampai Lampiran 23. Berdasarkan hasil analisis keragaman pada Tabel 2 menunjukkan bahwa jarak tanam berpengaruh sangat nyata terhadap jumlah polong per petak. Beda antara masing-masing perlakuan terhadap jumlah polong per petak berdasarkan uji BNJ_{0,05} dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Pengaruh jarak tanam terhadap jumlah polong per petak (buah).

Perlakuan	Total jumlah polong per petak (buah)	BNJ _{0,05} = 175,65
J1	1.084,80	a
J2	1.184,80	ab
J3	1.616,00	c
J4	1.312,80	b
J5	1.202,00	ab

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan bahwa perlakuan berbeda tidak nyata pada taraf uji BNJ 5%.

Hasil uji BNJ_{0,05} pada Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa pengaruh jarak tanam terhadap jumlah polong per petak pada perlakuan J3 dengan jarak tanam (30 cm x 40 cm) menghasilkan jumlah polong per petak 1.616 buah, berbeda nyata dengan perlakuan lainnya.

4. Berat Polong per Tanaman (g)

Hasil pengamatan terhadap rata-rata berat polong per tanaman dan analisis dapat dilihat pada Lampiran 24 sampai Lampiran 25. Berdasarkan hasil analisis keragaman pada Tabel 2 menunjukkan bahwa jarak tanam berpengaruh sangat nyata terhadap berat polong per tanaman. Beda antara masing-masing perlakuan terhadap berat polong per tanaman berdasarkan uji BNJ_{0,05} dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6. Pengaruh jarak tanam terhadap berat polong per tanaman (g).

Perlakuan	Total berat polong per tanaman (g)	BNJ _{0,05} = 21,24
J1	1.033,20	a
J2	1.135,73	b
J3	1.272,00	d
J4	1.161,87	c
J5	1.172,00	c

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan bahwa perlakuan berbeda tidak nyata pada taraf uji BNJ 5%.

Berdasarkan hasil uji BNJ_{0,05} pada Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa pengaruh jarak tanam terhadap berat polong per tanaman pada perlakuan J3 (30 cm x 40 cm) menghasilkan berat polong per tanaman yaitu 1.272 gram, berbeda nyata dengan perlakuan lainnya.

5. Berat Polong per Petak (kg)

Hasil pengamatan terhadap rata-rata berat polong per petak dan analisis dapat dilihat pada lampiran 26 sampai lampiran 27. Berdasarkan hasil analisis keragaman Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa jarak tanam berpengaruh sangat nyata terhadap berat polong per petak. Beda antara masing-masing perlakuan terhadap berat polong per petak berdasarkan uji BNJ_{0,05} dapat dilihat pada Tabel 7 di bawah ini

Tabel 7. Pengaruh jarak tanam terhadap berat polong per petak (kg).

Perlakuan	Total berat polong per petak (kg)	BNJ _{0,05} = 2,53
J1	20,88	a
J2	22,86	ab
J3	27,58	c
J4	26,10	bc
J5	24,96	b

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan bahwa perlakuan berbeda tidak nyata pada taraf uji BNJ 5%.

Hasil Uji BNJ _{0,05} pada Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa pengaruh jarak tanam terhadap berat polong per petak perlakuan J3 dengan jarak tanam (30 cm x 40 cm) menghasilkan berat polong per petak yaitu 27,58 kg, yang berbeda nyata dengan perlakuan lainnya.

B. Pembahasan

Hasil analisis keragaman pada Tabel 2 menunjukkan bahwa jarak tanam berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah polong per tanaman, jumlah polong per petak, berat polong per tanaman dan berat polong per petak.

Hasil uji BNJ pada Tabel 3 sampai Tabel 8 di atas menunjukkan bahwa pengaruh jarak tanam terhadap tinggi tanaman 7 hst (25,73) cm, 14 hst (30,07) cm, 21 hst (72,00) cm, 28 hst (172,60) cm, 35 hst (187,87) cm, 42 hst (207,53) cm pada perlakuan J3 (30 cm x 40 cm) menghasilkan tinggi tanaman paling tinggi yaitu 207,53 cm, berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Tumbuhan yang terkena cahaya matahari maksimal dapat meningkatkan tinggi tanaman peningkatan laju pemanjangan batang terjadi karena adanya peregangan yang membuat batang menjadi lebih tinggi, kondisi ini bisa menguntungkan jika daun mencapai tingkat pencahayaan yang lebih baik (Salisbury dan Ross, 2017).

Hasil uji BNJ pada Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa pengaruh jarak tanam terhadap jumlah polong per tanaman pada perlakuan J3 dengan jarak tanam (30 cm x 40 cm) menghasilkan jumlah polong per tanaman 64,93 buah, berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Yusuf (2022) menyatakan bahwa Pengaturan jarak tanam yang ideal dapat meningkatkan efisiensi fotosintesis karena setiap bagian tanaman dapat memperoleh cahaya yang cukup, jarak tanam terlalu lebar meskipun setiap tanaman menerima cahaya yang lebih baik, efisiensi pemanfaatan lahan akan menurun, pengaturan jarak tanam yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa setiap tanaman mendapatkan cahaya yang cukup tanpa menyebabkan persaingan yang berlebihan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jarak tanam berpengaruh sangat baik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang panjang. Perlakuan jarak tanam 30 cm x 40 cm menghasilkan tinggi tanaman 207,53 cm, jumlah polong per tanaman 64,93 buah, jumlah polong per petak 1.616 buah, berat polong per tanaman 1.272 g dan berat polong per petak 27,58 kg.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis menyarankan untuk menanam menggunakan tanaman kacang panjang dengan jarak tanam 30 cm x 40 cm untuk tanaman kacang panjang varietas

Parade Tavi agar memperoleh hasil yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agam, M.J., Nurlaelih, E.E dan Saraswati, I.D. 2021. Pengaruh Jarak Tanam terhadap Pertumbuhan dan Hasil Kacang Panjang (*Vigna unguiculata* L.). Varietas Katrina dan Varietas Parade. Jurnal Produksi Tanaman 9 (9) Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang. Diakses di <https://scholar.google.com>., pada tanggal 6 Januari 2024.
- Anto, A. 2016. Teknologi Budidaya Kacang Panjang. Penyuluh Pertanian. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Tengah. Diakses di <https://mujihanani.wordpress.com>., pada tanggal 25 Agustus 2025.
- Hanafiah, K.A. 2004. Rancangan Percobaan. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal 110-130.
- Jali, S., Syamsuddin, S dan Putra, J.E. 2020. Pengaruh Pemberian Pupuk Organik Cair dan Jarak Tanam terhadap Hasil dan Pertumbuhan Tanaman Kacang Panjang. Jurnal Ilmu Pertanian Agronitas. 2 (1) Edisi April 2022 Fakultas Pertanian, Universitas Tamansiswa, Palembang. Diakses di <https://ejournal.unitaspalembang.ac.id>., pada tanggal 25 April 2024.
- Kurdianingsih, S., Tahayu, A dan Setyono, M. 2015. Efek Pupuk Kalium Organik Cair dan Tahapan Pemupukan Kalium terhadap Pertumbuhan Produksi dan Daya Simpan Kacang Panjang (*Vigna sesquipedalis* L. *Fruhw*). Jurnal Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Diakses di <https://ojs.unida.ac.id>., pada tanggal 24 Agustus 2025.
- Mulyadin, A. 2024. Kacang Panjang Jejak Panjang dalam Sejarah dan Gizi. Diakses di <https://pesawaran-pikiran-rakyat-com>., pada tanggal 2 April 2024.
- Yusuf, A.C. 2022. Pengaruh Jarak Tanam terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Sorgum manis (*sorghum bicolor* (L) *moench*). PLANTKLOPEDI. Jurnal Sains dan Teknologi Pertanian. 2 (2) : 18-25. Diakses di <https://doi.org.plantklopedia.ac.id>., pada tanggal 21 Juli 2025.