

PENGARUH STIMULAN ALAMI MENGGUNAKAN EKSTRAK KULIT PISANG RAJA
(*Musa sapientum* L.) TERHADAP PRODUKSI LATEKS POHON KARET
KLON PB 260 (*Hevea brasiliensis* Muell Arg.)

M. Dhani Dewantara^{1*)}, Yuliantina Azka^{1)}, Ridwan Hanan¹⁾**

Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Tridinanti

*)Penulis korespondensi: mdhanidewantara@gmail.com

**) Penulis co korespondensi : yuliantina_azka@univtridinanti.com

ABSTRACT

Natural rubber is one of the most important plantation commodities in Indonesia; however, its productivity remains relatively low compared to its potential. The application of stimulants is commonly used to increase latex yield, but excessive use of chemical stimulants may harm plant health and the environment. Therefore, this study aimed to evaluate the effectiveness of plantain peel extract (*Musa sapientum* L.) as a natural stimulant and to determine the optimal concentration for increasing latex production of rubber trees (*Hevea brasiliensis* clone PB 260). The research was conducted from January to February 2026 in a smallholder rubber plantation located in Sungai Rengit Village, Talang Kelapa District, Banyuasin Regency, South Sumatra. A Randomized Block Design (RBD) was applied with five treatments and five replications, namely P0 (control), P1 (100 g/L), P2 (200 g/L), P3 (300 g/L), and P4 (400 g/L). The observed parameters included latex volume, latex flow duration, fresh latex weight, and dry rubber content. The results showed that plantain peel extract had a highly significant effect on all observed parameters. The best treatment was P2 (200 g/L), producing the highest latex volume (67.13 ml), longest flow duration (161.80 minutes), and highest fresh latex weight (62.16 g). However, the highest dry rubber content was found in the control (33.56%). Latex production increased during the first and second tapping but declined in the third tapping. In conclusion, plantain peel extract is an effective natural stimulant with an optimal concentration of 200 g/L for sustainable latex production improvement.

Keywords: natural stimulant, plantain peel extract, latex production, rubber tree and optimal concentration

PENDAHULUAN

Industri karet alam merupakan salah satu sektor strategis di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024), luas areal perkebunan karet Indonesia pada tahun 2023 mencapai sekitar 3.557.091 hektar dengan produksi karet kering mencapai 2.717.081 ton, menjadikan Indonesia sebagai produsen karet alam terbesar kedua di dunia. Komoditas karet memiliki kontribusi penting terhadap lapangan usaha pertanian dan devisa ekspor negara. Namun demikian, produktivitas pohon karet di Indonesia masih berada di bawah potensi yang optimal. Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu daerah penghasil utama tanaman karet menunjukkan produktivitas yang relatif rendah, dengan rata-rata sekitar 1.088 kg/ha, sementara secara nasional produksi karet Indonesia tercatat mencapai sekitar 2.651.000 ton, masih tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Thailand yang mampu menghasilkan sekitar

4.707.000 ton. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan kinerja kebun karet di Indonesia yang harus segera diatasi agar industri karet nasional tetap kompetitif secara global (Anonim, 2024).

Berbagai faktor mempengaruhi hasil lateks dari pohon karet, termasuk faktor genotipe (klon), kondisi lingkungan (curah hujan, kualitas tanah, kelembaban) serta teknik sadap dan stimulasi yang diterapkan. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa definisi fisiologis dan manajemen klon sangat mempengaruhi aliran lateks, yang berarti meningkatkan produktivitas bukan hanya soal memperluas areal, tetapi juga soal pengelolaan internal kebun dan stimulasi fisiologis tanaman (Budiasih *et al.*, 2020). Teknik yang digunakan untuk meningkatkan aliran lateks dalam penyadapan tanaman karet adalah penggunaan stimulan kimia seperti ethephon. Hasil penelitian Wulandari *et al.*, (2015) menunjukkan bahwa pemberian dosis ethephon sebesar 0,9 cc per pohon dengan teknik aplikasi kulit batang (bark application) mampu meningkatkan durasi aliran lateks serta volume lateks secara signifikan dibandingkan tanpa aplikasi. Namun demikian, penelitian Herlinawati & Kuswanhadi (2018) menunjukkan bahwa aplikasi ethephon pada tanaman karet klon-klon berbeda dapat menurunkan kualitas fisiologis tanaman serta tidak selalu sesuai dengan kemampuan metabolisme tanaman. Selain itu, dalam kondisi spesifik di areal yang mengalami penyakit gugur daun sekunder, aplikasi stimulan ethephon konsentrasi tinggi justru memberikan hasil produksi yang lebih rendah dibandingkan konsentrasi rendah (Andriyanto *et al.*, 2023).

Sejalan dengan tren pertanian berkelanjutan, muncul kebutuhan akan stimulan alami yang biodegradable, tidak toksik, dan mudah diperoleh. Prinsip pertanian berkelanjutan mendorong pengembangan bahan alami pengganti bahan kimia sintetis, termasuk dalam stimulasi produksi lateks. Konsep ini penting agar industri karet tetap berdaya saing sekaligus ramah lingkungan (Anonim, 2024). Salah satu bahan alami yang berpotensi adalah limbah kulit pisang, yang selama ini kurang dimanfaatkan. Varietas Pisang Raja (*Musa sapientum* L.) dalam penelitian menunjukkan bahwa kulitnya mengandung etilen alami, asam amino, senyawa fenolik, vitamin, dan enzim yang berpotensi mempengaruhi metabolisme tanaman (Adhayanti *et al.*, 2023). Limbah organik ini memiliki kandungan bioaktif dan dapat menjadi sumber bahan aktif bagi tanaman. Kulit pisang sangat melimpah di Indonesia dan jika dimanfaatkan untuk tujuan agronomi, dapat menambah nilai ekonomi sekaligus mengurangi limbah (Jami'ah *et al.*, 2018).

Ekstrak kulit pisang raja berpotensi berfungsi sebagai stimulansia alami yang mempercepat aliran lateks dan meningkatkan produksi tanpa efek samping kimia (Adhayanti *et al.*, 2023). Penelitian mengenai stimulan kimia dan beberapa bahan alami lainnya telah banyak dilakukan, tetapi masih terbatas penelitian yang secara spesifik menginvestigasi ekstrak kulit pisang raja terhadap produksi lateks pohon karet di Indonesia. Hal ini menciptakan research gap yang mendasari urgensi penelitian. Mengisi celah ini, penelitian dapat memberikan bukti empiris baru sekaligus memperluas aplikasi agronomi stimulansia alami (Syamsiyah *et al.*, 2020).

Penelitian ini secara ilmiah akan menguji mekanisme stimulan alami melalui ekstrak kulit pisang raja terhadap aliran dan produksi lateks pohon karet. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif stimulan yang ramah lingkungan, lebih murah, dan layak diterapkan oleh petani karet Indonesia. Penggunaan stimulan alami di kebun karet diharapkan dapat meningkatkan produktivitas industri karet nasional dan mendukung pengelolaan kebun karet yang berkelanjutan.

BAHAN DAN METODE

Tempat dan waktu

Penelitian ini telah dilaksanakan dari bulan Januari 2026 sampai dengan bulan Februari 2026 di Kebun Karet rakyat seluas 3 Ha (Desa Sungai Rengit, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan).

Bahan dan Alat

Bahan yang telah digunakan dalam penelitian ini meliputi Kulit pisang raja (*Musa sapientum* L.), air aquades dan kebun karet sebagai objek yang diteliti.

Alat yang digunakan adalah pisau sadap, kain kasa, kuas kecil, blender, gelas ukur, botol, open, dan timbangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 5 (lima) perlakuan dan 5 (lima) ulangan, setiap satuan percobaan terdapat 3 (tiga) tanaman sampel, maka total tanaman yang digunakan sebanyak 75 pohon karet. Penelitian ini dirancang dengan menggunakan 5 perlakuan dan 5 ulangan, sebagai berikut: P0 = Kontrol (tanpa menggunakan ekstra kulit pisang raja), P1 = 100 g kulit pisang raja /l air, P2 = 200 g kulit pisang raja /l air, P3 = 300 g kulit pisang raja /l air dan 400 g kulit pisang raja /l air. Parameter yang diamati pada pengamatan tanaman yaitu, Volume lateks (ml), Lama lateks menetes (menit), Berat Lateks Segar (g) dan Berat Karet Kering (%). Data hasil penelitian dianalisis dengan analisis sidik ragam yang dilanjutkan dengan uji beda nyata jujur (BNJ) bila pengaruh perlakuan nyata atau sangat nyata. Untuk memperoleh tingkat ketelitian hasil yang diperoleh dari suatu percobaan digunakan uji Koefisienb Keragaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa pemberian stimulan Alami pada P2 (200 g kulit pisang per l) menunjukkan hasil volume lateks pada aplikasi 1 berturut-turut sebesar 63,40 ml; 59,40 ml; dan 57,47 ml. Pada aplikasi 2 diperoleh volume sebesar 67,13 ml; 65,27 ml; dan 59,93 ml. Selanjutnya pada aplikasi 3 sebesar 65,40 ml; 61,80 ml; dan 57,73 ml, serta pada aplikasi 4 sebesar 64,20 ml; 60,60 ml; dan 55,13 ml. Data tersebut menunjukkan bahwa volume lateks tertinggi diperoleh pada aplikasi 2 sadap 1, sedangkan volume terendah terdapat pada aplikasi 4 sadap 3. Secara umum terlihat adanya kecenderungan penurunan volume lateks pada penyadapan ketiga di

setiap perlakuan. Peningkatan volume lateks pada penyadapan awal diduga terjadi karena kandungan etilen dalam stimulan alami yang mampu merangsang aktivitas fisiologis pembuluh lateks. Stimulan alami seperti buah pisang diketahui mengandung etilen berkisar antara 0,2 ppm–50 ppm yang berperan dalam memperpanjang aliran lateks (Sinamo et al., 2015). Etilen bekerja dengan meningkatkan tekanan turgor dan memperlambat proses penyumbatan pembuluh lateks sehingga aliran lateks menjadi lebih lama dan volume yang dihasilkan meningkat. Namun demikian, penurunan volume pada penyadapan ketiga diduga terjadi karena berkurangnya respons tanaman terhadap rangsangan etilen akibat penyadapan berulang, sehingga metabolisme dan regenerasi lateks menjadi lebih rendah dibandingkan pada penyadapan awal.

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian stimulan Alami pada P2 (200 g kulit pisang per l) menunjukkan hasil lama lateks menetes pada aplikasi 1 berturut-turut selama 160,93 menit; 140,27 menit; dan 117 menit. Pada aplikasi 2 diperoleh lama menetes selama 161,47 menit; 136,13 menit; dan 116,80 menit. Selanjutnya pada aplikasi 3 selama 161,80 menit; 136,86 menit; dan 116,53 menit, serta pada aplikasi 4 selama 158,93 menit; 136,73 menit; dan 118,20 menit. Data tersebut menunjukkan bahwa lama aliran lateks cenderung lebih tinggi pada sadap pertama dan kedua, kemudian mengalami penurunan pada sadap ketiga di setiap aplikasi. Hasil ini sejalan dengan pendapat Nasarudin & Maulana (2009) yang menyatakan bahwa stimulan akan memperpanjang waktu aliran dan menghambat pembekuan pada alur sadap, sehingga lateks dapat menetes lebih lama setelah penyadapan. Siregar & Suhendry (2013) juga menyatakan bahwa stimulan ethrel dapat mempertahankan pengaliran lateks yang lebih lama dan lebih banyak dibandingkan dengan tanpa penggunaan stimulan. Hal ini terbukti dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa peningkatan lama lateks menetes pada sadap awal dalam penelitian ini menunjukkan efektivitas stimulan dalam memperpanjang waktu aliran lateks, sedangkan penurunan pada sadap ketiga diduga berkaitan dengan berkurangnya respons fisiologis tanaman akibat penyadapan berulang.

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa pemberian stimulan Alami pada P2 (200 g kulit pisang per l) menunjukkan hasil berat karet pada aplikasi 1 berturut-turut sebesar 58,72 g; 54,89 g; dan 52,88 g. Pada aplikasi 2 diperoleh berat karet sebesar 62,16 g; 60,44 g; dan 55,49 g. Selanjutnya pada aplikasi 3 sebesar 60,56 g; 57,23 g; dan 53,46 g, serta pada aplikasi 4 sebesar 59,45 g; 56,12 g; dan 51,05 g. Data tersebut menunjukkan bahwa berat karet tertinggi diperoleh pada aplikasi 2 sadap 1, sedangkan berat terendah terdapat pada aplikasi 4 sadap 3. Secara umum terlihat adanya kecenderungan penurunan berat karet pada penyadapan ketiga di setiap aplikasi perlakuan. Peningkatan berat karet pada sadap pertama dan kedua menunjukkan bahwa pemberian stimulan mampu meningkatkan produksi melalui perpanjangan waktu aliran dan peningkatan metabolisme lateks. Hal ini sejalan dengan pendapat Nasarudin & Maulana (2009) yang menyatakan bahwa stimulan dapat memperpanjang waktu aliran lateks sehingga produksi yang dihasilkan menjadi lebih tinggi. Siregar & Suhendry (2013) menambahkan bahwa penggunaan stimulan seperti ethrel dapat meningkatkan

hasil lateks dibandingkan tanpa penggunaan stimulan karena mampu mempertahankan aliran lateks lebih lama. Namun demikian, penurunan berat karet pada sadap ketiga diduga terjadi akibat berkurangnya respons fisiologis tanaman terhadap stimulan setelah penyadapan berulang, sehingga kemampuan regenerasi dan pembentukan lateks menjadi lebih rendah.

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa pemberian stimulan Alami pada P0 (tanpa stimulan) menunjukkan hasil kadar karet kering pada aplikasi 1 berturut-turut sebesar 32,07%; 32,43%; dan 33,56%. Pada aplikasi 2 diperoleh sebesar 31,87%; 32,08%; dan 32,92%. Selanjutnya pada aplikasi 3 sebesar 31,69%; 32,04%; dan 32,63%, serta pada aplikasi 4 sebesar 31,45%; 32,32%; dan 32,78%. Data tersebut menunjukkan bahwa kadar karet kering cenderung lebih rendah pada sadap pertama dan mengalami sedikit peningkatan pada sadap berikutnya, meskipun secara umum persentasenya relatif stabil di kisaran 31%–33%. Perubahan kadar karet kering ini diduga berkaitan dengan pengaruh stimulan terhadap sistem fisiologis tanaman. Pemberian stimulan umumnya meningkatkan aliran lateks dengan cara memperpanjang waktu pengaliran, namun peningkatan volume lateks seringkali diikuti oleh penurunan konsentrasi padatan karet dalam lateks akibat efek pengenceran. Hal ini sejalan dengan pendapat Syamsiah *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa pemberian stimulan dapat menyebabkan terjadinya penurunan kadar karet kering karena meningkatnya aliran cairan serum dalam lateks. Setiawan & Handoko (2008) menambahkan bahwa gas etilen yang diaplikasikan akan meresap ke dalam pembuluh lateks, di dalam pembuluh lateks gas tersebut menyerap air dari sel-sel yang ada di sekitarnya. Meskipun stimulan mampu meningkatkan produksi secara kuantitas, pengaruhnya terhadap kadar karet kering perlu diperhatikan karena berkaitan dengan mutu dan rendemen hasil karet yang diperoleh.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemberian ekstrak kulit pisang raja sebagai stimulan alami berpengaruh sangat nyata terhadap berat lateks yang dihasilkan oleh tanaman karet. Hal ini ditunjukkan dari hasil analisis keragaman yang memperlihatkan adanya perbedaan signifikan antar perlakuan pada setiap aplikasi penyadapan. Berat lateks tertinggi diperoleh pada Perlakuan P2 (200 g ekstrak kulit pisang per l) aplikasi 2 sadap 1 sebesar 62,16 g.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap produksi lateks tanaman karet disarankan untuk dilanjutkan pada tanaman karet dengan klon yang berbeda dan pada tanaman yang berumur 20 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhayanti, I., Abdullah, T., & Romantika, R. 2018. Uji Kandungan Total Polifenol dan Flavonoid Ekstrak Etil Asetat Kulit Pisang Raja (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*). *Media Farmasi*, 14(1): 146–152.
- Andriyanto, M. 2022. Kajian Stimulan Etefon Antioksidan Konsentrasi Rendah terhadap Produksi Karet (*Hevea brasiliensis*) saat Gugur Daun Sekunder. *Warta Perkaretan*, 41(2): 89–98.
- Anonim. 2024. *Rubber (Natural)*. Retrieved from Indonesia investments. Diakses di: <https://www.indonesiainvestments.com/business/commodities/rubber/im185>, tanggal 26 november 2025
- Badan Pusat Statistik. 2024. Statistik Karet Indonesia 2023. Diakses di: <https://assets.dataindonesia.id/2025/05/26/1748229624062-21-26.-statistik-karet-indonesia-2023>, tanggal 26 november 2025.
- Budiasih, R., Salim, M. A., Apriani, I., Hasani, S., & Subandi, M. 2020. Effect of Stimulant (ethephon) *Application and Tapping Frequency on Latex Production of Rubber Tree (Hevea brasiliensis* Muell. Arg.). *Bulgarian Journal of Agricultural Science*, 26(4): 793–799.
- Herlinawati, E., & Kuswanhadi, K. 2018. Pengaruh Stimulan Ethephon terhadap Produksi dan Fisiologi Lateks berbagai Klon. *Jurnal Penelitian Karet*, 35(2): 149–158.
- Jami'ah, S. R., Ifaya, M., Pusmarani, J., & Nurhikma, E. 2018. Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Metanol Kulit Pisang Raja (*Musa paradisiaca sapientum*) Dengan Metode DPPH (2,2-Difenil-1-Pikrilhidrazil). *Jurnal Mandala Pharmacon Indonesia*, 4(1): 33–38.
- Nasaruddin dan D. Maulana. 2009. Produksi Tanaman Karet pada Pemberian Stimulan Etephon. *Jurnal Agrisistem*, Vol. 5 No. 2: 1858-4330
- Setiawan, D. H., & Andoko, A. 2008. *Petunjuk Lengkap Budidaya Karet*. Jakarta: Agromedia Pustaka
- Siregar, T.H.S. dan I. Suhendry. 2013. *Budidaya dan Teknologi Karet*. Kanisius. Bogor.
- Syamsiyah, S., Suherman, C., Rosniawaty, S., dan Oktavia, F. 2020. Respons Produksi Tanaman Karet Klon BPM 24 terhadap Jenis dan Konsentrasi Stimulan Etilen Organik Kulit Pisang. *Kultivasi*, 19(3): 134–140.
- Wulandari, T., Sampoerno., & Khoiri, M. A. 2015. Pemberian Stimulan Etefon dengan Teknik Bark Application Pada Produksi Lateks Tanaman Karet (*Hevea brasiliensis* Muell. Arg.). *JOM Faperta*, 2(2): 1–12.

Tabel 1. Pengaruh pemberian stimulan alami terhadap Volume tanaman karet (ml) Aplikasi 1 sadap 1 sampai dengan Aplikasi 4 sadap 3.

Perlakuan	Ap1 1 Sd 1	Ap1 1 Sd 2	Ap1 1 Sd 3	Ap12 Sd 1	Apl 2 Sd 2	Ap1 2 Sd 3	Ap1 3 Sd 1	Ap1 3 Sd 2	Ap1 3 Sd 3	Ap1 4 Sd 1	Ap1 4 Sd 2	Ap1 4 Sd 3
P0	29,20 a	25,36 a	24,60 a	32,53 a	30,27 a	27,00 a	29,73 a	26,65 a	23,00 a	29,40 a	25,46 a	24,60 a
P1	41,20 b	37,06 b	36,67 b	44,87 b	41,93 b	38,60 b	42,27 b	39,33 b	36,00 b	41,93 b	38,13 c	36,27 b
P2	63,40 c	59,40 c	57,47 c	67,13 c	65,27 c	59,93 c	65,40 c	61,80 c	57,73 c	64,20 c	60,60 d	55,13c
P3	37,60 b	33,47 b	34,07 b	40,27 b	38,20 b	35,27 b	38,67 b	35,33 b	32,00 b	38,80 b	34,07 bc	33,00 b
P4	30,60 a	26,07 a	26,86 a	31,40 a	29,20 a	25,53 a	31,67 a	28,60 a	25,27 a	31,27 a	27,73 ab	25,47 a
BNJ_{0,05}	6,36	6,47	5,47	5,90	6,11	5,71	5,67	6,28	6,19	5,39	6,88	5,43

Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom-kolom yang sama menyatakan berbeda tidak nyata pada taraf uji 5%.

Tabel 2. Pengaruh pemberian stimulan alami terhadap Lama Lateks Menetes (menit) Aplikasi 1 sadap 1 sampai dengan Aplikasi 4 sadap 3.

perlakuan	Ap1 1 Sd 1	Ap1 1 Sd 2	Ap1 1 Sd 3	Ap12 Sd 1	Apl 2 Sd 2	Ap1 2 Sd 3	Ap1 3 Sd 1	Ap1 3 Sd 2	Ap1 3 Sd 3	Ap1 4 Sd 1	Ap1 4 Sd 2	Ap1 4 Sd 3
P0	124,73 a	111,40 a	95,20 a	126,00 a	109,93 a	96,00 a	29,73 a	26,65 a	23,00 a	29,40 a	25,46 a	24,60 a
P1	139,67 a	116,80 a	103,80 a	143,06 b	117,80 a	101,80 a	42,27 b	39,33 b	36,00 b	41,93 b	38,13 c	36,27 b
P2	160,93 b	140,27 b	117,53 b	161,47 c	136,13 b	116,80 b	65,40 c	61,80 c	57,73 c	64,20 c	60,60 d	55,13 c
P3	133,67 a	109,47 a	100,60 a	139,87 ab	115,00 a	100,53 a	38,67 b	35,33 b	32,00 b	38,80 b	34,07 bc	33,00 b
P4	130,60 a	110,80 a	97,00 a	133,80 ab	117,20 a	98,27 a	31,67 a	28,60 a	25,27 a	31,27 a	27,73 ab	25,47 a
BNJ_{0,05}	16,59	16,31	11,96	16,57	15,46	8,43	5,67	6,28	6,19	5,39	6,88	5,43

Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom-kolom yang sama menyatakan berbeda tidak nyata pada taraf uji 5%.

Tabel 3. Pengaruh pemberian stimulan alami terhadap Volume tanaman karet (ml) Aplikasi 1 sadap 1 sampai dengan Aplikasi 4 sadap 3

Perlakuan	Ap1 1 Sd 1	Ap1 1 Sd 2	Ap1 1 Sd 3	Ap12 Sd 1	Apl 2 Sd 2	Ap1 2 Sd 3	Ap1 3 Sd 1	Ap1 3 Sd 2	Ap1 3 Sd 3	Ap1 4 Sd 1	Ap1 4 Sd 2	Ap1 4 Sd 3
P0	27,41 a	23,36 a	22,64 a	30,12 a	28,03 a	25,00 a	27,53 a	24,70 a	21,30 a	27,23 a	23,59 a	22,79 a
P1	37,99 b	34,18 b	33,93 b	41,57 b	38,85 b	35,75 b	39,16 b	36,44 b	33,36 b	38,85 b	35,34 c	33,60 b
P2	58,72 c	54,89 c	52,88 c	62,16 c	60,44 c	55,49 c	60,56 c	57,23 c	53,46 c	59,45 c	56,12 d	51,05 c
P3	34,76 b	30,83 b	31,35 b	37,30 b	35,38 b	32,86 b	35,82 b	32,73 b	29,65 b	35,94 b	31,56 bc	30,57 b
P4	28,15 a	23,85 a	24,71 a	29,08 a	27,04 a	23,65 a	29,32a	26,47 a	23,39 a	28,95 a	25,68 ab	23,57 a
BNJ_{0,05}	6,25	6,18	5,18	5,73	5,93	5,52	5,57	6,07	11,09	5,36	6,70	5,22

Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom-kolom yang sama menyatakan berbeda tidak nyata pada taraf uji 5%.

Tabel 4. Pengaruh pemberian stimulan alami terhadap Lama Lateks Menetes (menit) Aplikasi 1 sadap 1 sampai dengan Aplikasi 4 sadap 3.

Perlakuan	Ap1 1 Sd 1	Ap1 1 Sd 2	Ap1 1 Sd 3	Ap12 Sd 1	Apl 2 Sd 2	Ap1 2 Sd 3	Ap1 3 Sd 1	Ap1 3 Sd 2	Ap1 3 Sd 3	Ap1 4 Sd 1	Ap1 4 Sd 2	Ap1 4 Sd 3
P0	32,07 c	32,43 c	33,56 b	31,87 c	32,08 c	32,92 c	31,69 c	32,04 c	32,63 b	31,45 b	32,32 b	32,78 c
P1	29,27 ab	29,30 ab	30,95 a	29,06 ab	29,54 ab	30,85 ab	29,10 ab	29,65b	31,28 ab	30,09 a	30,81 a	31,36 ab
P2	30,58 bc	31,16 bc	32,06 ab	30,38 bc	30,74 bc	31,63 b	30,44 bc	30,90 bc	31,80 ab	30,87 b	31,97 b	32,20 bc
P3	29,09 ab	29,55 ab	31,03 a	29,33 b	29,91 b	31,06 ab	29,24 ab	29,79 b	31,08 ab	29,83 a	30,71 a	31,41 ab
P4	27,68 a	28,83 a	30,82 a	27,76 a	28,41 a	30,49 a	27,70 a	28,17 a	30,35 a	29,57 a	30,30 a	31,02 a
BNJ_{0,05}	1,87	1,97	0,71	1,77	1,49	1,09	1,65	1,36	1,57	0,59	0,84	1,16

Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom-kolom yang sama menyatakan berbeda tidak nyata pada taraf uji 5%.