

Proposition de correction du TD sur les plans optimaux

Module de plan d'expériences - F. Husson - Agrocampus

Exercice 1 : PLAN OPTIMAL POUR RETROUVER UN PLAN FRACTIONNAIRE

```
1. set.seed(123)
library(DoE.base)
plan <- fac.design(nlevels=2, nfactors=6)
library(AlgDesign)
planOpt <- optFederov(~.,plan,nTrials=8,criterion="D")
planOpt
```

```
$D
[1] 1
$A
[1] 1
$Ge
[1] 1
$Dea
[1] 1
$design
  A B C D E F
2  2 1 1 1 2 2
23 1 2 1 2 2 1
35 1 1 1 1 1 1
36 2 1 2 2 1 1
40 2 2 1 2 1 2
45 2 2 2 1 2 1
53 1 2 2 1 1 2
56 1 1 2 2 2 2
```

- Il faut estimer 7 paramètres (1 pour la constante et 6 pour chaque facteur). Il reste 1 ddl pour la résiduelle.
- On retrouve le plan 2^{6-2} .

```
options(contrasts = c("contr.sum", "contr.sum"))
Xopti <- model.matrix(~ . , planOpt$design)
t(Xopti)%*%Xopti
```

	(Intercept)	A1	B1	C1	D1	E1	F1
(Intercept)	8	0	0	0	0	0	0
A1	0	8	0	0	0	0	0
B1	0	0	8	0	0	0	0
C1	0	0	0	8	0	0	0
D1	0	0	0	0	8	0	0
E1	0	0	0	0	0	8	0
F1	0	0	0	0	0	0	8

Exercice 2 : CONSTRUCTION DE PLANS OPTIMAUX

On s'intéresse à l'effet de 5 facteurs A B C D E sur une réponse Y. Le facteur A a 2 modalités, B et C ont 3 modalités, D et E ont 4 modalités.

- $2 \times 3^2 \times 4^2 = 288$
- $PPCM(6, 8, 12, 9, 16) = 144$

```
library(DoE.base)
Design.1 <- fac.design(nlevels=c(2,3,3,4,4), factor.names= c("A","B","C","D", "E"))
X <- model.matrix(~ . , Design.1)
VARCOV <- solve(t(X)%*%X)
determinant <- det(VARCOV)
```

```
[1] 82944
```

```
3. set.seed(123)
library(DoE.base)
Design.1 <- fac.design(nlevels=c(2,3,3,4,4), factor.names= c("A","B","C","D", "E"))

library(AlgDesign)
plan.1.Dopt<-optFederov(~.,Design.1,nTrials=12,criterion="D")
Xopti=model.matrix(~ . , plan.1.Dopt$design)
det(t(Xopti)%*%Xopti)      #1194393600
```

```
[1] 9437184
```

```
VARCOVopti <- solve(t(Xopti)%*%Xopti)
round(VARCOVopti, 2)
```

	(Intercept)	A1	B.L	B.Q	C.L	C.Q	D.L	D.Q	D.C	E.L	E.Q	E.C
(Intercept)	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1	0.00	0.12	0.00	0.00	-0.04	-0.08	-0.06	0.00	0.03	0.03	0.00	0.06
B.L	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.Q	0.00	0.00	0.00	0.33	0.14	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.L	0.00	-0.04	0.00	0.14	0.33	-0.01	0.02	0.00	-0.01	-0.01	0.00	-0.02
C.Q	0.00	-0.08	0.00	-0.08	-0.01	0.32	0.03	0.00	-0.02	-0.02	0.00	-0.03
D.L	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.02	0.03	0.40	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.10
D.Q	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00	-0.12	0.00
D.C	0.00	0.03	0.00	0.00	-0.01	-0.02	-0.01	0.00	0.38	-0.12	0.00	0.01
E.L	0.00	0.03	0.00	0.00	-0.01	-0.02	-0.01	0.00	-0.12	0.38	0.00	0.01
E.Q	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.38	0.00
E.C	0.00	0.06	0.00	0.00	-0.02	-0.03	0.10	0.00	0.01	0.01	0.00	0.40

On peut retrouver la valeur de l'objet D qui donne à quel point le plan est efficace par rapport au plan complet (efficacité de 32.7% pour l'estimation de chaque facteur) :

```
plan.1.Dopt$D
```

```
$D
[1] 0.3177281
```

```
plan.1.Dopt$A
```

```
$A
[1] 3.803819
```

```
(det((1/12)*t(Xopti)%*%Xopti)^(1/12))
```

```
[1] 0.3177281
```

```
sum(diag(solve(t(Xopti)%*%Xopti/12)))/12
```

```
[1] 3.803819
```

4. Avec la fonction `oa.design`, on obtient le plan complet.

```
> plan <- oa.design(nlevels=c(2,3,3,4,4),nruns=144)
```

```
creating full factorial with 288 runs ...
```

Pourtant avec le plan optimal en 144 essais on trouve bien un plan orthogonal.

```
Design.1.Dopt <- optFederov(~A+B+C+D+E,Design.1,nTrials=144,criterion="D")
Xopti <- model.matrix(~ A + B+ C + D + E , Design.1.Dopt$design)
VARCOVopti <- solve(t(Xopti)%*%Xopti)
round(VARCOVopti, 2)
```

	(Intercept)	A1	B.L	B.Q	C.L	C.Q	D.L	D.Q	D.C	E.L	E.Q	E.C
(Intercept)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.L	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.Q	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.Q	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D.L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D.Q	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
D.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
E.L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
E.Q	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
E.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

Exercice 3 : CONSTRUCTION D'UN PLAN POUR FAIRE DE LA FARINE D'INSECTES

On peut proposer une liste d'essais à partir d'un plan composite centré.