5. Tìm nghiệm của phương trình ở câu 4 thỏa mãn điều kiện Cauchy $u(1, y) = y$.


Lời giải. Thay nghiệm tổng quát (1.3.8) vào điều kiện Cauchy ta có

$$e + C(y) = y.$$

Khi đó ta có nghiệm của bài toán đang xét

$$u(x, y) = \frac{x^2 y - e + e^x}{x}.$$

Không khó để thấy nghiệm này thỏa mãn điều kiện Cauchy khi thay $x = 1$.



Hình 1.6: Hình ảnh nghiệm.

Bản thảo chưa hoàn t

Lời giải bổ sung — Ví dụ 5 · Mục 1.3.2.2

Kiến thức và trình tự giải

Mục tiêu. Với $A(x,y)u_x + B(x,y)u_y + C(x,y)u = R(x,y)$, tìm các đường mà trên đó PDE trở thành một ODE. Dùng chữ R cho vế phải để không nhầm với hàm tùy ý F.

Bước 1 — Đọc các hệ số và lập hệ đặc trưng. Đặt $U(s) = u(X(s), Y(s))$. Quy tắc dây chuyền cho $U' = u_x X' + u_y Y'$. Chọn $X' = A$, $Y' = B$, khi đó

$$X' = A(X,Y), \qquad Y' = B(X,Y), \qquad U' + C(X,Y)U = R(X,Y).$$

Nếu $A \neq 0$, có thể dùng x làm tham số: $dy/dx = B/A$, $du/dx + (C/A)u = R/A$. Nếu $A = 0$, chọn biến khác hoặc giữ hệ theo s; không chia cho hệ số bằng 0.

Bước 2 — Tìm bất biến để phân biệt các đặc trưng. Tích phân hai phương trình đầu để tìm $\rho(X,Y)$ không đổi. Kiểm tra $A\rho_x + B\rho_y = 0$. Hệ số hằng cho $\rho = Bx - Ay$. Ví dụ $X' = X, Y' = -Y$ cho $(XY)' = 0$; $X' = -Y, Y' = X$ cho $(X^2 + Y^2)' = 0$. Khi đặc trưng là vòng kín, cần kiểm tra nghiệm sau một vòng trở về cùng giá trị.

Bước 3 — Giải ODE của ẩn trên từng đường. Đặt $M(s) = \exp(\int C(X(s), Y(s))ds)$. Nhân phương trình của U với M:

$$(MU)' = MR, \qquad U(s) = M(s)^{-1}\left[K + \int M(s)R(X(s),Y(s))ds\right].$$

K hằng trên một đường, nhưng thay đổi giữa các đường, nên viết $K = F(\rho)$. Nếu tìm được nghiệm riêng u_p, có thể giải phương trình thuần nhất cho $u - u_p$ để giảm tính toán. Nếu đổi biến (ρ, z), phải tính Jacobian và dùng quy tắc dây chuyền để thấy PDE chỉ còn đạo hàm theo z.

Bước 4 — Thế dữ liệu và tìm hàm tùy ý. Với đường dữ liệu $(x_0(r), y_0(r))$, $u = h(r)$, thế vào nghiệm tổng quát để thu được $F(\rho_0(r)) = H(r)$, trong đó $\rho_0 = \rho(x_0, y_0)$. Nếu ρ_0 khả nghịch, đặt $r = \rho_0^{-1}(z)$ rồi viết $F(z) = H(\rho_0^{-1}(z))$. Nếu hai giá trị r_1, r_2 có cùng ρ_0, phải có $H(r_1) = H(r_2)$. Nếu đường dữ liệu chính là đặc trưng, dữ liệu phải thỏa ODE trên đường đó và thường không xác định hết F.

Bước 5 — Xác định miền tồn tại và duy nhất. Điều kiện không đặc trưng là $x_0'B - y_0'A \neq 0$ trên đường dữ liệu. Nó cho khả nghịch cục bộ dưới giả thiết trơn thích hợp; không tự cho duy nhất trên cả mặt phẳng. Chỉ những đặc trưng gặp dữ liệu mới được xác định. Tại gốc, trục hoặc đường hệ số suy biến, kiểm tra riêng và ghép các biểu thức đủ trơn.

Bước 6 — Kiểm tra kết quả. Tính u_x, u_y bằng quy tắc dây chuyền, thay vào $Au_x + Bu_y + Cu$ và kiểm tra bằng R. Sau đó thế lại điều kiện đầu/biên. Nêu rõ nếu chỉ có nghiệm cục bộ, nghiệm từng miền hoặc không có nghiệm trong lớp trơn yêu cầu.

Chi tiết bước tích phân ODE. Sau khi tìm bất biến ρ, viết $U' + P(s,\rho)U = Q(s,\rho)$. Chọn $M = \exp(\int_{s_0}^{s} P(r,\rho)dr)$; tính $M' = PM$, nên $MU' + M'U = MQ$. Tích phân từ s_0: $M(s)U(s) - U(s_0) = \int_{s_0}^{s} M(r)Q(r)dr$. Hằng số $U(s_0)$ phụ thuộc ρ; thay dữ liệu để tìm nó rồi mới đổi về tọa độ gốc.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1 — Dùng nghiệm tổng quát của ví dụ 4. $u = [e^x + F(x^2y)]/x$ trên $x > 0$.

Bước 2 — Thế dữ liệu $u(1,y) = y$**.** $e + F(y) = y$, nên $F(s) = s - e$. Thay lại:

$$u(x,y) = xy + (e^x - e)/x.$$

Bước 3 — Kiểm tra và duy nhất. Trên $x = 1$, công thức bằng y. Phần xy thỏa phương trình thuần nhất vì $x(xy)_x - 2y(xy)_y + xy = 0$; phần còn lại cho nguồn e^x. Mỗi đặc trưng $x^2y = \rho$ trong $x > 0$ gặp $x = 1$ đúng một lần, nên duy nhất trên miền này.

Chi tiết giải lại PDE. Hệ $X' = X, Y' = -2Y$ cho $X = x_0e^s, Y = y_0e^{-2s}$, nên $X^2Y = x_0^2y_0 = \rho$. Vì $dX/ds = X > 0$, phương trình của ẩn theo x là $dU/dx + U/x = e^x/x$. Nhân x rồi tích phân: $d(xU)/dx = e^x$, $xU = e^x + F(\rho)$. Do đó $u = (e^x + F(x^2y))/x$, trước khi thế $x = 1$ như trong bước 2.