

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И
ИНФОРМАТИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

"Уравнения первого порядка в нормальной
дифференциальной форме"

Студента 2 курса 10 группы
Русак Анны Алексеевны

Минск, 2022

Вариант 1

1. Указать тип и метод интегрирования дифференциальных уравнений:

а) $(2xy^2 + 3x^2 + \frac{1}{x^2} + \frac{3x^2}{y^2})dx + (2x^2y + 3y^2 + \frac{1}{y^2} - \frac{2x^3}{y^3})dy = 0$

Условие Эйлера: $\frac{\partial P}{\partial y} = 4xy - \frac{6x^2}{y^3} = \frac{\partial Q}{\partial x} = 4xy - \frac{6x^2}{y^3}$

Тип: Уравнение с полным дифференциалом

Метод интегрирования: Через КРИ-2 или нахождение общего интеграла $U(x, y) = C$, используя условия Эйлера

б) $xy(1 + y^2)dx + (1 + x^2)dy = 0$

$$\frac{x}{(1 + x^2)}dx + \frac{1}{y(1 + y^2)}dy = 0$$

Тип: Уравнение с разделяющимися переменными

Метод интегрирования: Общее решение $\int P(x) dx + \int Q(y) dy = C$

в) $2xydx + (x^2 - y^2)dy = 0$

$$P(xt, yt) = t^2 P(x, t) \quad Q(xt, yt) = t^2 Q(x, t)$$

Тип: Однородное уравнение

Метод интегрирования: Замена $U = \frac{y}{x}$ и сведение к линейному уравнению

г) $y' \operatorname{ctg} x - y = 2 \cos x^2 \operatorname{ctg} x$

Тип: Линейное по y уравнение

Метод интегрирования: Метод Лагранжа, метод Бернулли или через интегрирующий множитель

д) $x^2 y^2 y' + xy^3 = a^2, a \in \mathbb{R}$

$$y' + y \frac{1}{x} = a^2 x^{-2} y^{-2}$$

Тип: Уравнение Бернулли $m = -2$

Метод интегрирования: Замена $U = y^{1-m}$ и сведение к линейному уравнению

$$е) y' = 4y^2 - 4x^2y + x^4 + x + 4$$

Тип: Уравнение Риккати

Метод интегрирования: Необходимо найти частное решение, после чего делается замена $y = U + y_0$, где y_0 — частное решение. Полученное уравнение сводится к уравнению Бернулли

$$ж) yx' - 2x + y^2 = 0$$

Тип: Линейное по x уравнение

Метод интегрирования: Метод Лагранжа, метод Бернулли или через интегрирующий множитель

2. Проинтегрировать уравнение, установив вид интегрирующего множителя:

$$(x^3(1 + \ln x) + 2y)dx + x(3y^2x^2 - 1)dy = 0 ; \mu = \mu(y), \mu = \mu(x)$$

$$\frac{P'_y - Q'_x}{Q} = \frac{2 - 9y^2x^2 + 1}{x(3y^3x^2 - 1)} = \frac{-3(3y^2x^2 - 1)}{x(3y^3x^2 - 1)} = -\frac{3}{x} = f(x)$$

$$\frac{\mu'}{\mu} = -\frac{3}{x}; \quad \frac{d\mu}{\mu} = -\frac{3dx}{x}; \quad \mu = x^{-3}$$

$$((1 + \ln x) + \frac{2y}{x^3})dx + (3y^2 - \frac{1}{x^2})dy = 0$$

$$\text{Условие Эйлера: } \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{2}{x^3} = \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{2}{x^3}$$

$$\frac{\partial U}{\partial x} = 1 + \ln x + \frac{2y}{x^3} \quad \frac{\partial U}{\partial y} = 3y^2 - \frac{1}{x^2}$$

$$U = \int 3y^2 - \frac{1}{x^2} dy + \phi(x) = y^3 - \frac{y}{x^2} + \phi(x)$$

$$\frac{\partial U}{\partial x} = \frac{2y}{x^3} + \phi'(x) = 1 + \ln x + \frac{2y}{x^3}$$

$$\phi'(x) = 1 + \ln(x) \Rightarrow \phi(x) = x + \int \ln x dx = \left[\begin{matrix} u = \ln x & dv = dx \\ du = \frac{dx}{x} & v = x \end{matrix} \right] = x + x \ln x -$$

$$- \int 1 dx = x + x \ln x - x + C = x \ln x + C$$

$$U = y^3 + \frac{y}{x^2} + x \ln x + C$$

Дополнительное решение $x = 0$

$$\text{Ответ: } U = y^3 + \frac{y}{x^2} + x \ln x + C, x = 0$$

3. Преобразовать уравнение $y(x + \ln y) + (x - \ln y)y' = 0$ с помощью подстановки $\ln y = \eta$. Указать тип и метод интегрирования полученного уравнения.

$$y = e^\eta; \quad dy = e^\eta d\eta$$

$$e^\eta(x + \eta)dx + (x - \eta)e^\eta d\eta = 0$$

$$(x + \eta)dx + (x - \eta)d\eta = 0$$

$$\text{Условие Эйлера: } \frac{\partial P}{\partial \eta} = 1 = \frac{\partial Q}{\partial x} = 1$$

Тип: Уравнение с полным дифференциалом

Метод интегрирования: Через КРИ-2 или нахождение общего интеграла $U(x, \eta) = C$, используя условия Эйлера

4. Решить задачу Коши $dy = (y - 2)^{2/3}dx$, $y|_{x=1} = 2$

$$\frac{dy}{(y - 2)^{2/3}} = dx$$

$$3(y - 2)^{1/3} = x + C$$

$$(y - 2)^{1/3} = \frac{x}{3} + C_1$$

$$y - 2 = \left(\frac{x}{3} + C_1\right)^3; \quad y = \left(\frac{x}{3} + C_1\right)^3 + 2$$

$$y|_{x=1} = \left(\frac{1}{3} + C_1\right)^3 + 2 = 2 \Rightarrow C_1 = -\frac{1}{3} \Rightarrow y = \left(\frac{x}{3} - \frac{1}{3}\right)^3 + 2$$

$$\text{Ответ: } y = \left(\frac{x}{3} - \frac{1}{3}\right)^3 + 2$$

Вариант 2

1. Указать тип и метод интегрирования дифференциальных уравнений:

$$\text{а) } xy(1 + y^2)dx - (1 + x^2)dy = 0$$

$$\frac{x}{(1 + x^2)}dx - \frac{1}{y(1 + y^2)}dy = 0$$

Тип: Уравнение с разделяющимися переменными

Метод интегрирования: Общее решение $\int P(x) dx + \int Q(y) dy = C$

$$б) \frac{x^2 dy - y^2 dx}{(x - y)^2} = 0$$

$$\frac{x^2 dy}{(x - y)^2} - \frac{y^2 dx}{(x - y)^2} = 0$$

Условие Эйлера:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{-2y(x - y)^2 + 2(x - y)(-y^2)}{(x - y)^4} = \frac{(x - y)(-2xy + 2y^2 - 2y^2)}{(x - y)^4} = -\frac{2xy}{(x - y)^3}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{2x(x - y)^2 - 2(x - y)x^2}{(x - y)^4} = \frac{(x - y)(2x^2 - 2xy - 2x^2)}{(x - y)^4} = -\frac{2xy}{(x - y)^3}$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

Тип: Уравнение с полным дифференциалом

Метод интегрирования: Через КРИ-2 или нахождение общего интеграла $U(x, y) = C$, используя условия Эйлера

$$в) (x^2 + y^2)dx - 2xydy = 0$$

$$P(xt, yt) = t^2 P(x, t) \quad Q(xt, yt) = t^2 Q(x, t)$$

Тип: Однородное уравнение

Метод интегрирования: Замена $U = \frac{y}{x}$ и сведение к линейному уравнению

$$г) (4 - x^2)y' + xy = 4$$

Тип: Линейное по y уравнение

Метод интегрирования: Метод Лагранжа, метод Бернулли или через интегрирующий множитель

$$д) y' \operatorname{tg} x + 2y \operatorname{tg}^2 x = ay^2, a \in \mathbb{R}$$

Тип: Уравнение Бернулли $m = 2$

Метод интегрирования: Замена $U = y^{1-m}$ и сведение к линейному уравнению

$$е) xy' = x^2 y^2 - y + 1$$

Тип: Уравнение Риккати

Метод интегрирования: Необходимо найти частное решение, после чего делается замена $y = U + y_0$, где y_0 — частное решение. Полученное уравнение сводится к уравнению Бернулли

$$\text{ж)} \quad dx + (x + y^2)dy = 0$$

$$x' + x + y^2 = 0$$

Тип: Линейное по x уравнение

Метод интегрирования: Метод Лагранжа, метод Бернулли или через интегрирующий множитель

2. Проинтегрировать уравнение, установив вид интегрирующего множителя:

$$y^2(x - y)dx + (1 - xy^2)dy = 0 ; \mu = \mu(y), \mu = \mu(x)$$

$$\frac{P'_y - Q'_x}{Q} = \frac{2xy - 3y^2 + y^2}{1 - xy^2} \neq f(x)$$

$$\frac{Q'_x - P'_y}{P} = \frac{2y^2 - 2xy}{y^2(x - y)} = \frac{2y(y - x)}{y^2(x - y)} = -\frac{2}{y} = f(y)$$

$$\frac{\mu'}{\mu} = -\frac{2}{y}; \quad \frac{d\mu}{\mu} = -\frac{2dx}{y}; \quad \mu = y^{-2}$$

$$(x - y)dx + \left(\frac{1}{y^2} - x\right)dy = 0$$

$$\text{Условие Эйлера: } \frac{\partial P}{\partial y} = -1 = \frac{\partial Q}{\partial x} = -1$$

$$\frac{\partial U}{\partial x} = x - y \quad \frac{\partial U}{\partial y} = \frac{1}{y^2} - x$$

$$U = \int x - y \, dx + \phi(y) = \frac{x^2}{2} - xy + \phi(y)$$

$$\frac{\partial U}{\partial y} = -x + \phi'(y) = \frac{1}{y^2} - x \Rightarrow \phi'(y) = \frac{1}{y^2}$$

$$\phi(y) = -\frac{1}{y} + C$$

$$U = \frac{x^2}{2} - xy - \frac{1}{y} + C$$

Дополнительное решение $y = 0$

$$\text{Ответ: } U = \frac{x^2}{2} - xy - \frac{1}{y} + C, y = 0$$

3. Преобразовать уравнение $y' = x + e^{x+2y}$ с помощью подстановки $\eta = e^{-2y}$.
Указать тип и метод интегрирования полученного уравнения.

$$\ln \eta = -2y; \quad y = -\frac{1}{2} \ln \eta; \quad dy = -\frac{1}{2\eta} d\eta$$

$$-\frac{1}{2\eta} d\eta = (x + \frac{e^x}{\eta}) dx$$

$$d\eta = (-2\eta x - 2e^x) dx$$

$$\eta' + 2\eta x = -2e^x$$

Тип: Линейное по η уравнение

Метод интегрирования: Метод Лагранжа, метод Бернулли или через интегрирующий множитель

4. Решить задачу Коши $dy = x\sqrt{y}dx$, $y|_{x=1} = 0$

$$\frac{dy}{\sqrt{y}} = x dx$$

$$2\sqrt{y} = \frac{x^2}{2} + C$$

$$y = (\frac{x^2}{4} + C_1)^2$$

$$y|_{x=1} = (\frac{1}{4} + C_1)^2 = 0 \Rightarrow C_1 = -\frac{1}{4} \Rightarrow y = (\frac{x^2}{4} - \frac{1}{4})^2$$

Ответ: $y = (\frac{x^2}{4} - \frac{1}{4})^2$