

GIẢI PHÁP ĐIỀU TRỊ BỆNH CHÁY LÁ KHOAI MÔN (KHOAI CAO)

Bệnh cháy lá (khô lá) khoai môn (khoai cao) do nấm *Phytophthora colocasiae* gây ra. Đây là bệnh quan trọng nhất trên cây khoai môn, nó cũng gây thiệt hại năng suất nặng nhất và người trồng cũng phải chi phí nhiều nhất.

Cuộc chiến giữa người trồng và nấm bệnh chưa bao giờ hết căng thẳng. Nấm bệnh nằm phục kích trong đất nhiều năm, khi có cơ hội là lây lan: qua củ giống, vết thương, nước. Đặc biệt chúng có một vũ khí mà người trồng ngán ngẩm và bất lực đó là khả năng kháng thuốc cực nhanh. Một hoạt chất thuốc hoàn toàn mới và đặc trị có thể trở lên vô dụng sau 2 mùa được sử dụng. Người trồng đổi thuốc liên tục, phun mật độ dày hơn là 2 ngày/ lần nhưng ruộng khoai vẫn tàn lụi.

Qua nhiều năm nghiên cứu về đặc điểm thực vật của cây khoai môn, nghiên cứu chuyên sâu về đặc tính sinh học và gen kháng thuốc của nấm *Phytophthora colocasiae*, Công Ty TNHH Được Mùa đã hoàn thành **GIẢI PHÁP NHIỆM MÀU** điều trị bệnh cháy lá.

- Vết bệnh khô ngay và không lây lan sau 12 giờ phun thuốc kể cả trong điều kiện có mưa.
- Sau 02 lần phun thuốc bệnh được khống chế hoàn toàn.
- Có thể sử dụng lâu dài trong nhiều năm vì mức độ kháng thuốc là rất thấp và rất chậm.

LOẠI THUỐC	CAMARO 100SC	MIKCID 1.5SL
	Trừ nấm: <i>Colletotrichum</i> , <i>Fusarium</i> , <i>Phytophthora</i> , <i>Pythium</i> , <i>Rhizoctonia</i> ... Nội hấp, lưu dẫn, ít độc, được phép dùng cho rau và cây ăn trái.	Đặc trị: Nấm và vi khuẩn Thuốc sinh học: Nội hấp, lưu dẫn, tan hoàn toàn trong nước.
LƯỢNG NƯỚC		
Bình 25L	25-50ml	25-50ml
Bình 16L	20-30ml	20-30ml
PHUN XỊT	Tùy theo tình trạng bệnh và thời tiết. Nếu thời tiết khô ráo thì dùng liều lượng thấp và phun lần 2 sau 4-5 ngày. Nếu mưa dầm thì sử dụng liều cao nhất và phun lần 2 sau 2-3 ngày.	

Giải pháp và các sản phẩm này được đặc chế riêng cho bệnh trên cây khoai môn do đã được bổ sung thêm các chất phụ gia để tăng cường khả năng hấp thu của thuốc.



RUỘNG KHOAI MÔN BỊ TÀN PHÁ BỞI BỆNH



VẾT BỆNH TRÊN LÁ KHOAI MÔN

Lưu ý :

- Có thể bổ sung thêm chất bám dính để giảm trơn trượt của hạt nước thuốc.
- Áp dụng đồng thời phun phủ lên mặt trên của lá và hướng béc từ dưới lên để phun vào mặt dưới của lá. Phun vào mặt dưới của lá sẽ hao thuốc hơn, tốn nhiều thời gian hơn nhưng hiệu quả diệt trừ có thể tăng gấp 3 lần.
- Mặc dù khả năng kháng thuốc là thấp nhưng chúng tôi vẫn khuyến khích sử dụng luân phiên các loại thuốc để có thể sử dụng sản phẩm lâu dài.