

Bệnh sơ đen mít gây hại nặng nề trên các giống mít Thái. Nguyên nhân là do vi khuẩn *Pantoea stewartii* subsp gây ra. Con đường lây nhiễm chủ yếu của vi khuẩn là qua nước mưa. Thời điểm mà vi khuẩn xâm nhập vào trái bắt đầu từ lúc mít có cựa gà (đài mít) đến lúc trái nhỏ khoảng 2kg. Đây là thời kỳ mẫn cảm nhất. Nếu xử lý tốt thì sau giai đoạn này không còn phải lo lắng đến bệnh sơ đen.



Kỹ thuật xử lý như sau:

Vào đầu mùa mưa nên bón lượng vôi bột khoảng 30 -50kg/ 1.000m². Vôi bột được rải đều trên mô đất và gốc. Mục đích để khử trùng mặt đất và cung cấp canxi cho cây làm vỏ trái. Vỏ trái dày, cứng là yếu tố làm hạn chế bệnh một cách tự nhiên.

Khi cây ra cựa gà (đài mít) thì phun ngừa ngay, phun định kỳ 7 ngày/ lần cho đến khi trái mít đạt trọng lượng khoảng 2kg.

Sử dụng 40ml thuốc MIKCIDE 1.5SL/ bình 25L (25ml/16L) phun trùm lên phần cựa gà. Đối với trái non, phun phủ đều xung quanh trái, tập trung vào phần cuống trái là nơi đọng nước.