

GIẢI PHÁP ĐIỀU TRỊ BỆNH BẠCH TẠNG CHÈ

Bệnh bạch tạng chè đã xuất hiện ở Việt nam từ vài chục năm nhưng mức độ gây hại không đáng kể vì vậy nó không được quan tâm chú ý

Nhưng bắt đầu từ năm 2018 thì bệnh bắt đầu lan rộng ở tất cả các vùng trồng chè tại Thái Nguyên. Lá chè khi bị bệnh sẽ mất diệp lục, triệu chứng biểu hiện lúc đầu từ chóp lá và mép lá. Sau đó toàn bộ lá bị trắng bệch, chỉ có gân chính giữ được màu xanh. Lá chè bị bệnh giòn, khi bẻ thì gãy nghe rõ tiếng « tách », khi vò thì vỡ, mất mùi, mất vị chát. Khả năng lây lan là khá nhanh.

Trong nhiều năm, do không biết được nguyên nhân gây bệnh nên nông dân đã sử dụng hầu hết các loại thuốc đã có ở Việt Nam : rất nhiều loại thuốc trừ bệnh, rất nhiều loại thuốc trừ chích hút, rất nhiều các loại phân bón lá vi lượng, rất nhiều chất điều tiết sinh trưởng. Thậm chí nhiều nông dân đã đào bỏ đi lớp đất mặt sâu khoảng 0.5-1m, sau đó chở đất sạch ở nơi chưa từng được trồng trọt để bổ xung lại. Nói ngắn gọn là thay đất và thay luôn cây bị bệnh bằng cây khỏe nhưng diện tích trồng mới cũng tiếp tục bị nhiễm bệnh. Những diện tích đã nhiễm bệnh thì nông dân đã bỏ hoang hoặc chuyển đổi sang cây trồng khác. Một vùng trồng cây đặc sản nổi tiếng của Thái Nguyên « Chè Thái, gái Tuyên » có nguy cơ bị xóa sổ.



TRIỆU CHỨNG ĐIỂN HÌNH

Qua tham khảo thông tin từ các đồng nghiệp ở Nhật Bản, Trung Quốc là 2 quốc gia mà cây chè cũng bị tàn phá bởi căn bệnh này và từ các phòng nghiên cứu chuyên sâu trên thế giới thì nguyên nhân bệnh mà họ công bố như sau : Bệnh bạch tạng chè là bệnh đột biến ở cây chè và nó được cảm biến bởi nhiệt độ và ánh sáng. Nếu nhiệt độ xuống thấp hoặc ánh sáng quá mạnh thì bệnh xuất hiện. Khi 2 yếu tố này không còn thì bệnh tự hết. Mô tả này rất giống với thời điểm bệnh xuất hiện ở Việt nam là bắt đầu từ tháng 11 cho đến tháng 2 hàng năm, đó là lúc nhiệt độ thấp. Qua thời điểm này cây chè lại phục hồi, như chưa từng bị bệnh. Nhưng năng suất và chất lượng chè thì giảm nghiêm trọng.

Hiện tại ở Trung Quốc, Nhật bản và trên thế giới chưa có bất cứ phương pháp điều trị căn bệnh này, họ mặc nhiên rằng bệnh này không thể chữa trị và chỉ có thay giống trà để đột biến không xảy ra.



TÌNH TRẠNG BỆNH TRƯỚC PHUN THUỐC



CHÈ PHỤC HỒI SAU 02 LẦN XỬ LÝ

GIẢI PHÁP ĐIỀU TRỊ BỆNH BẠCH TẠNG CHÈ

Từ năm 2022, theo đề nghị của các bà con trồng chè ở Thái Nguyên thì Công Ty TNHH Được Mùa bắt đầu nghiên cứu về căn bệnh quái ác này trên chè. Chỉ sau 6 tháng nghiên cứu và thực nghiệm, Công Ty TNHH Được Mùa đã tìm được nguyên nhân đích thực, chuẩn hóa giải pháp và quy trình điều trị bệnh bạch tạng chè. Hiệu quả của giải pháp này vượt ra khỏi sự tưởng tượng của người trồng chè. Họ không thể tin được chỉ trong thời gian ngắn ngủi, loại bệnh đã đeo bám gây tổn hại cho họ trong cả chục năm, một loại bệnh mà giới chuyên gia cũng bất lực lại được giải quyết nhanh chóng đến thế, đơn giản đến vậy, hiệu quả ngỡ ngàng và chi phí rẻ không ngờ.

Thành quả này thể hiện nội lực nghiên cứu của công ty TNHH Được Mùa về sinh lý cây trồng, về sinh học phân tử, trình độ sản xuất và ứng dụng thuốc BVTV.

LOẠI THUỐC LƯỢNG NƯỚC	HOBYO 200WP	ZORKET 450WP	GIẢI ĐỘC
	Thuốc diệt vi khuẩn, kháng virus phổ rộng, điều trị cả Virus AND và ARN	Đặc trị chích hút loại bỏ môi giới truyền bệnh	Đào thải độc tố của Virus, vi khuẩn, rút ngắn thời gian điều trị, cây nhanh chóng hồi phục
Phuy 200L	500gr	270 -300 gr	250ml
Bình 25L	75gr	45gr	40ml
Bình 16L	55gr	35gr	25ml
SỐ LẦN PHUN	LẦN 1	LẦN 2	LẦN 3
LỊCH PHUN	Khi phát hiện bệnh	Sau lần 1 từ 3-4 ngày	Sau lần 2 từ 6-7 ngày

Lưu ý :

- Kỹ thuật phun là quan trọng. Khi phun thì hướng béc phun từ dưới lên để thuốc luôn bám được vào mặt dưới lá sau đó phun trùn lên mặt trên của lá.
- Với các ruộng thường xuyên bị bệnh, nên phun ngừa khi trời chớm lạnh.
- Với các ruộng đã bị bệnh thì phun sớm nhất có thể.
- Thông thường, sau 02 lần phun với tổng thời gian từ lần phun thứ nhất là khoảng 10 ngày thì cây đã phục hồi. Sau khi phun lần 1 và lần 2 cần quan sát tốc độ hồi phục của cây, nếu cây hồi phục dần dần theo chiều hướng tốt lên thì không cần phun lần thứ 3.
- Nếu sau phun lần thứ 2 khoảng 4-5 ngày mà tốc độ hồi phục chững lại thì nên phun tiếp lần thứ 3. Chưa có trường hợp phải phun đến lần thứ 3, nó chỉ cần thiết khi nhiệt độ quá thấp.
- Nên chọn ngày ấm áp (trên 20 độ C) để phun thuốc, cây sẽ hấp thụ thuốc tốt hơn, thời gian phục hồi nhanh hơn.