

Tinh dầu của cây hồi có nhiều ứng dụng. Tinh dầu hồi còn là thành phần trong các thuốc BVTV để trừ : tuyến trùng, côn trùng, virus, vi khuẩn và nấm. Đối với nấm bệnh, tinh dầu hồi đặc trị tới 11 loại nấm gây bệnh phổ biến trên cây trồng : *Alternaria solani*, *Bipolaris maydis*, *Botryodiplodia theobromae*, *Fusarium graminearum*, *Fusarium oxysporum* f. sp. *Cucumerinum*, *Fusarium oxysporum* f. sp. *Lycopersici*, *Fusarium oxysporum* f. sp. *Vasinfestum*, *Magnaporthe oryzae*, *Pythium aphanidermatum*, *Rhizoctonia cerealis*, *Rhizoctonia solani*.

Nhưng chính bản thân cây hồi cũng đang bị loại nấm bệnh tàn phá, khả năng tổn thất đến 80% năng suất, cây rụng lá, rụng quả, khô cành và chết. Bệnh do nấm *Colletotrichum fioriniae*; *Colletotrichum horii* gây ra. Các biện pháp phòng trừ hiện tại không đạt hiệu suất cao:

- Hiệu quả không cao do thiếu thuốc đặc trị.
- Tán cây rất cao, khó khăn cho kỹ thuật phun thuốc.
- Bào tử phát tán theo nước và theo gió nên khả năng cách ly, hạn chế lây lan hầu như không có tác dụng.
- Rừng có nhiều tầng, tiểu khí hậu phù hợp cho sự phát triển và tồn tại của nấm bệnh.
- Nấm gây hại ở tất cả các bộ phận của cây gây tổn thương nặng nề trong thời gian ngắn nên các phản ứng chậm trễ không đem lại kết quả tốt.

Công Ty TNHH Được Mùa đã nghiên cứu và hoàn thiện giải pháp phòng trừ triệt để bệnh thán thư trên cây hồi.



CÂY HỒI RỤNG LÁ KHÔ CÀNH VÀ CHẾT



VẾT BỆNH TRÊN THÂN CÂY HỒI

GIẢI PHÁP ĐIỀU TRỊ CÂY ĐÃ NHIỄM BỆNH

LOẠI THUỐC LƯỢNG NƯỚC	CAMARO 100SC	MIKCIDE 1.5SL	GIẢI ĐỘC
	Trừ nấm: <i>Fusarium</i> , <i>Phytophthora</i> , <i>Pythium</i> , <i>Rhizoctonia</i> , <i>Collectotrichum</i> ... <i>Nội hấp, lưu dẫn, ít độc, được phép dùng cho rau và cây ăn trái.</i>	Đặc trị: Nấm và vi khuẩn <i>Thuốc sinh học: Nội hấp, lưu dẫn, tan hoàn toàn trong nước.</i>	Đào thải độc tố của nấm bệnh, rút ngắn thời gian điều trị, cây nhanh chóng hồi phục.
Phuy 200L	220ml	240ml	250ml
LẦN PHUN	LẦN 1	LẦN 2	LẦN 3
	Ngay khi phát hiện bệnh	Sau lần 1 từ 5-7 ngày	Sau lần 2 từ 7-10 ngày

ĐIỀU TRỊ BỆNH THÁN THƯ HỒI

Lưu ý :

- Phun bằng máy áp lực cao, hạt nước thuốc nhỏ và nhuyễn bao phủ toàn bộ, lá, cành và thân cây.
- Sau phun lần đầu tiên khoảng 1-2 ngày có thể có hiện tượng các lá bị bệnh sẽ rụng nhiều hơn (các lá không bị bệnh vẫn xanh tốt). Sau 03 ngày phun thuốc thì lá, hoa, quả ngừng rụng.
Cây đã ổn định. Vết bệnh trên lá, trên hoa, trên quả, trên thân đã khô và ngừng phát triển. Cơ bản thì vết bệnh đã được khống chế ngay trong lần phun thuốc đầu tiên.
- Sau lần phun thứ 3 khoảng 15 ngày cây ra lá mới, chồi mới sạch bệnh.
- Sau lần phun thứ 3 khoảng 03 tháng, cây có bộ tán mới xum xuê khỏe mạnh.

GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA TRƯỚC VỤ

Đối với bệnh thán thư ở cây hời, bệnh sẽ trở nặng vào thời điểm cây ra hoa và đậu trái.
Vì vậy biện pháp phòng ngừa trước mỗi vụ là khôn ngoan và hiệu quả nhất.

LOẠI THUỐC	CAMARO 100SC	MIKCIDE 1.5SL	GIẢI ĐỘC
	Trừ nấm: Fusarium, Phytophthora, Pythium, Rhizoctonia, Collectotrichum... Nội hấp, lưu dẫn, ít độc, được phép dùng cho rau và cây ăn trái.	Đặc trị: Nấm và vi khuẩnThuốc sinh học: Nội hấp, lưu dẫn, tan hoàn toàn trong nước.	Đào thải độc tố của nấm bệnh, rút ngắn thời gian điều trị, cây nhanh chóng hồi phục
LƯỢNG NƯỚC			
Phuy 200L	220ml	240ml	250ml
LẦN PHUN	LẦN 1	LẦN 2	LẦN 3
	Trước khi hoa nở rộ 5-7 ngày	Sau khi đã đậu trái đồng loạt khoảng 1 tuần.	Sau lần 2 từ 7-10 ngày

Lưu ý :

- Theo giải pháp này sẽ có nhiều ưu điểm:
- Không rụng hoa, không rụng lá.
 - Tỷ lệ đậu quả cao hơn.
 - Giảm tỷ lệ quả lép. Quả no tròn.
 - Không rụng trái non
 - Cây có năng suất cao và đều theo từng năm, mất hẳn tình trạng 2 năm cây có năng suất thấp và 1 năm năng suất cao.