

HOBYO 200WP

THUỐC TRỪ VIRUS THỰC THIẾT

Hiện nay đã phát hiện được hơn 2.000 loài Virus gây hại trên hàng nghìn loài thực vật. Cấu tạo của Virus rất đơn giản vì vậy tính linh động cao hơn, có nhiều biến thể nên việc phòng trừ là khó khăn nhất so với tất cả các loại dịch hại. Tại Việt nam, có 10 loài Virus gây hại chính trên: cà chua, xà lách, đu đủ, chanh dây, ớt, dưa, bầu bí, Atiso, hoa cúc.... làm thiệt hại nghiêm trọng năng suất và chất lượng nông sản.





Khi ***cây trồng bị nhiễm Virus***, một biện pháp luôn luôn được khuyến cáo là tiêu hủy để tránh lây lan bởi vì không có thuốc trừ Virus. Đối với người nông dân, để bảo vệ thành quả lao động thì đã dùng tất cả những thứ mình có, ***tất cả những kinh nghiệm, vô vàn những biện pháp truyền miệng nhưng cũng không thể cứu vãn được tình thế.***

Từ nhiều năm trước, công ty TNHH Được Mùa đã đầu tư nghiên cứu các hoạt chất để phòng chống Virus, các biện pháp kỹ thuật chăm sóc và canh tác cây trồng để hỗ trợ nâng cao hiệu quả. Hàng chục các hoạt chất đã được nghiên cứu, hàng trăm các mô hình đã được thử nghiệm và đánh giá, nghiệm thu.

Và bây giờ chúng tôi KIÊU HÃNH THÔNG BÁO rằng một kỷ nguyên mới trong sản xuất nông nghiệp đã bắt đầu với sản phẩm **HOBYO 200WP.**

HOBYO 200WP là THUỐC TRỪ VIRUS THỨ THIẾT

đầu tiên được công nhận ở Việt Nam và trên thế giới.

THUỐC TRỪ BỆNH



Cảnh báo
Có thể có hại nếu nuốt phải
Có thể có hại khi tiếp xúc với da
Có thể có hại nếu hít phải

HOBYO

200WP

**LẦN ĐẦU TIÊN
TẠI VIỆT NAM**

XOĂN LÁ, CHÙN NGỌN
Cà chua, Ớt, Dưa hấu, Chanh dây, Thuốc lá

ĐIỂM HÉO
Cà chua, Xà lách, Húng quế, Atiso

TRẮNG LÁ (PHẤN TRẮNG), LỖN TRẮN
Quả dưa, Súp lơ, Bắp cải

**THUỐC TRỪ
VIRUS
THỨ THIẾT**

KHẢM LÁ, KHẢM TRÁI, VÀNG LÁ
Cà chua, Ớt, Dưa hấu, Dưa leo, Ổi đỏ, Thuốc lá

SỐC THẦN, NGẠI TỬ
Bông cải, Hoa ily, Phlox lam, Xà lách

KHÔ THẦN, HƯNG ĐỐC LƯN CÂY
Mướp đắng, Khế, Mít, Ổi

XOĂN LÁ - KHẢM LÁ - CHÙN NGỌN TRẮNG LÁ - PHẤN TRẮNG



CÔNG TY TNHH DƯỢC MÙA
ĐC: số 41, đường số 2A, KDC Nam Hùng Vương,
P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP.HCM
ĐT: 028.62.777.693 Fax: 028.37.563.066

Thành phần:
Moroxydine hydrochloride:..... 16%
Copper acetate:4%
Alkylnaphthalene sulfonate:.....7%
ButylNatri Naphthalene Sulfonate:3%
Phụ gia: Vừa đủ 1kg.



Hoạt chất Copper acetate gắn kết với axit amin tạo thành phức hợp bền vững. Nó gây ra tình trạng rối loạn hiệu ứng của các electron không liên kết dẫn đến sự phân hủy mRNA và protein capsid. Từ đó ngăn

chặn sự xâm nhập của Virus vào tế bào khỏe mạnh (chống lan rộng) và chống sao chép (sinh sản) của Virus. Sự tạo phức bền vững cũng làm xáo trộn sự phân cắt protease, tạo ra các sợi AND hoặc ARN của Virus bị lỗi, hình thành các Virus hoặc Virion bị biến tính và chúng không còn khả năng gây hại cho cây trồng.

Moroxydine Hydrochloride là một loại chất chống Virus được sử dụng cho con người, nó có hiệu lực mạnh với cả Virus AND và ARN. Nó được chỉ định để điều trị Virus cúm (đường hô hấp) và nhiễm Virus Herpes (gây tổn thương các niêm mạc). Nhiều dẫn xuất của Moroxydine Hydrochloride đang là biệt dược để điều trị Virus viêm gan B và C.

Chúng tôi đã sử dụng chất dẫn đặc biệt để Moroxydine Hydrochloride có khả năng nội hấp và lưu dẫn trong cây trồng. Sau đó Moroxydine Hydrochloride xâm nhập qua màng để vào bên trong tế bào của thực vật. Tại đây, Moroxydine Hydrochloride ngăn chặn sự hình thành hoặc phá vỡ bản sao vi rút, ngăn chặn hoặc phá hủy lớp vỏ protein hình thành virion và axit nucleic trong vỏ bằng cách phân hủy hoặc ngăn chặn sự hình thành các protein của Virus và can thiệp vào nhà máy Ribosome để ngăn chặn quá trình lắp ráp Virus.

Sự hiệp đồng của Copper acetate với Moroxydine Hydrochloride và được hỗ trợ bởi chất dẫn đã tạo lên hiệu ứng nhiều mặt, tấn công tổng lực vào tất cả các giai đoạn sinh sản, sinh trưởng, phát tán của Virus:

CÔ LẬP - TRIỆT SẢN - BIẾN TÍNH - PHÂN HỦY

Tiến trình hồi phục các cây trồng sau khi sử dụng HOBYO 200WP được tổng kết như sau:

SAU PHUN LẦN THỨ NHẤT 03 NGÀY

(Hãy phun ngừa hoặc ngay khi cây chớm bị bệnh)

KHẢM LÁ	XOÃN LÁ	XOÃN NGỌN	HOẠI TỬ	CÒI CỌC
Phần thịt lá màu vàng không lan rộng, màu vàng lợt dần, bề mặt lá giảm độ xỉn	Lá bắt đầu duỗi ra, lá mềm trở lại, mặt lá sáng bóng dần.	Các lá bắt đầu lỏng dần ra, không bó khít lại với nhau. Đọt muốn vươn tới.	Các vết hoại tử ngừng lan rộng. Mặt lá sáng bóng dần.	Rễ nhú đầu trắng. Ngọn muốn vươn tới. Mặt lá sáng bóng dần.

SAU PHUN LẦN THỨ HAI 03 NGÀY

(Phun sau lần thứ nhất 5-7 ngày)

KHẢM LÁ	XOÃN LÁ	XOÃN NGỌN	HOẠI TỬ	CÒI CỌC
Toàn bộ lá đã có màu xanh đồng đều. Mặt lá bóng, sáng.	Lá đã duỗi ra đạt khoảng 65% diện tích lá thật, mặt lá bóng, sáng.	Các lá tách hẳn nhau ra. Đọt đã vươn ra.	Các vết cũ đã khô lại, không xuất hiện các vết hoại tử mới. Mặt lá sáng, bóng nhiều diệp lục.	Rễ non ra nhiều, rễ cũ tăng chiều dài trên 40%. Ngọn vươn dài. Mặt lá sáng, bóng, nhiều diệp lục.

SAU PHUN LẦN THỨ BA 03 NGÀY
(Phun sau lần thứ hai 7-10 ngày)

KHẢM LÁ	XOÃN LÁ	XOÃN NGỌN	HOẠI TỬ	CÒI CỌC
Cây không còn biểu hiện đã từng bị khảm. Mặt lá xanh đồng đều, bóng, sáng. Cây sung sức.	Lá đã duỗi ra đạt trên 85% diện tích lá thật. Mặt lá xanh khỏe, bóng, sáng. Cây sung sức.	Các lá đã mở hoàn toàn. Đọt vươn dài, hết hiện tượng ngù đầu (Đầu lân). Đọt mập, thân lớn. Cây sung sức.	Không xuất hiện các vết hoại tử mới. Mặt lá xanh đồng đều, bóng, sáng. Các lá mới ra nhiều, Cây sung sức.	Rễ phát triển tối đa về số lượng và chiều dài. Ngọn mập, vươn dài. Mặt lá xanh đồng đều, bóng, sáng. Cây sung sức.

Hãy sử dụng **THUỐC TRỪ VIRUS THỨ THIỆT - HOBYO 200WP** để tận hưởng thành quả trí tuệ và mẫn nguyện với mùa màng bội thu.