BMC

Bảo Vệ Cây Trồng Cho Màu Xanh No Ấm

SỔ TAY

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC BVTV

Điện thoại Mua Hàng / Zalo:

0834.888.539 - 0919.410.292 - 02723.778.061

Website: www.bmcgroup.com.vn

GIỚI THIỆU CÔNG TY

BMC

Bảo Vệ Cây Trồng Cho Màu Xanh No Ấm

- Công ty cổ phần BMC Việt Nam là công ty sản xuất, gia công, phân phối thương mại sản phẩm thuốc BVTV, phân bón và máy móc nông nghiệp.

- Chúng tôi rất tự hào là một trong những công ty phát triển hàng đầu tại Việt Nam về lĩnh vực chúng tôi đang hoạt động:

* Đứng đầu về thị phần sản phẩm bình phun động cơ điện trên toàn quốc.
* Top đầu về chất lượng trong sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật tại thị trường Việt Nam.
* Luôn sáng tạo các sản phẩm mới, độc đáo phục vụ trong nông nghiệp.

- Chúng tôi luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để nhân viên có một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thử thách nhưng đầy sáng tạo và phát triển toàn diện.

- Tổ chức đào tạo nội bộ cũng như đào tạo bên ngoài thông qua các chương trình đào tạo của **Việt Nam - Nhật Bản** như: **VJCC, JICA, PACE, VCCI** cho **CBCNV** để phát triển năng lực làm việc.

- Chúng tôi là một trong những Doanh Nghiệp có chế độ phúc lợi tốt nhất tại nơi chúng tôi hoạt động. Thu nhập của người lao động luôn phát triển cùng với sự phát triển không ngừng của công ty.

CÁC LOẠI CỎ HẠI

Cỏ lồng vực

Cỏ chỉ

Cỏ tranh

Cỏ mần trầu

Cỏ đuôi phụng

Cỏ chác

Cỏ lác

Cỏ cối

Cỏ lá tre

Cỏ gấu

Cỏ hôi

Thài lài (rau trai)

THUỐC TRỪ CỎ WYNCAFOS 10SL

PHƯỢNG HOÀNG LỬA®

DIỆT CỎ TẬN GỐC

- ◇ HIỆU QUẢ KÉO DÀI
- ◇ AN TOÀN
- ◇ TIẾT KIỆM

97% TECHNICAL CAO CẤP – Nguyên liệu Pha từ thuốc Technical 97% cao cấp – Chất lượng cao

Hoạt chất:
Glufosinate ammonium...10% w/w
Phụ gia đặc biệt vừa.....1 lít
Hãng sản xuất: Ningxia wynca technology co.,Ltd.

Đặc tính - Công dụng:

Sản phẩm với thành phần Glufosinate ammonium là thuốc trừ cỏ không chọn lọc, phổ rộng, có tác động nội hấp và tiếp xúc diệt cỏ ở giai đoạn hậu nảy mầm từ khi cỏ còn nhỏ ra đến khi cỏ đã lớn. Diệt được nhiều loại cỏ một và hai lá mầm như: Mần trầu, thài lài, cỏ tranh, cỏ chỉ, cỏ tứt, cỏ đậu, đèn gai, rau sam, mắc cỡ… trên vườn cây cà phê.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Cỏ hại	Cách dùng
Vườn cao su, vườn cà phê, ruộng ngô (bắp), hồ tiêu, vườn cây ăn trái, đất không trồng trọt...	Cỏ chỉ, mần trầu, mắc cỡ, đèn gai, cỏ tranh, thài lài, các loại cỏ lá rộng, cỏ đuôi phụng, cỏ tứt, cỏ đậu, rau sam…	4.0 lít/ha. Pha 150 ml/bình 18 –20 lít. Phun thuốc khi cỏ đang phát triển mạnh

Pha thuốc với nước trong, không phun lên cỏ ngập nước và không phun lên phần xanh của cây trồng.
Lượng nước sử dụng từ 500 – 600 lít/ha. Phun ướt đều thân và lá cỏ khi cỏ cao khoảng 20cm.
Thời gian cách ly: Không xác định.

Lưu ý khi phun thuốc để đạt hiệu quả cao:

- Khi cỏ đã lớn nên tăng liều.
- Tuyệt đối không phun khi trời mưa hay thời tiết bất lợi.
- Dùng phễu phun xuống định hướng ướt đều bề mặt lá cỏ và cả phần màu xanh của cỏ. Tuyệt đối không được phun thuốc chạm vào cây trồng.

NƯỚC ĐỎ ĐẬM ĐẶC
LƯU DẪN DÀI LÂU

THUỐC TRỪ CỎ NEWFOSINATE 150SL

KHAI HOANG Q7

KHAI HOANG Q10

Thay thế GLIPHOSATE

TRÂU RỪNG® MỚI

Hoạt chất: Glufosinate ammonium...150g/lít + Phụ gia đặc biệt...850g/lít
Hãng sản xuất: Jiangsu Huangma Agrochemicals Co., Ltd.

DIỆT SẠCH CÁC LOẠI CỎ HẰNG NIÊN - ĐA NIÊN - CỎ KHÁNG THUỐC

Đặc tính - Công dụng:

- **Newfosinate 150SL** là thuốc trừ cỏ nội hấp, không chọn lọc, diệt được nhiều loại cỏ đã kháng Glyphosate IPA... một cách nhanh chóng.
- Sản phẩm chứa hoạt chất Glufosinate ammonium 150g, diệt trừ tất cả các loại cỏ hàng niên, đa niên như: Mần trầu, cỏ tranh, cỏ chỉ, cỏ mực, cỏ chân vịt, cỏ lông vực, cỏ lẻ tre, đèn gai, rau sam, rau trai (thài lài)... trên đất trồng cây công nghiệp, vườn cây ăn trái và đất không trồng trọt.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Cỏ hại	Liều dùng
Đất trồng cây công nghiệp, vườn cây ăn trái, đất không trồng trọt...	Cỏ tranh, cỏ chỉ, cỏ lẻ tre, cỏ mực, cỏ chân vịt, cỏ lông vực, cỏ mần trầu, đèn gai, rau sam, rau trai (thài lài), cỏ chắc lác...	Sử dụng 3.0 lít/ha. Pha 150-200ml/bình 20 lít. Pha 200-300ml/bình 25 lít. Phun 400-500 lít nước/ha.

Lưu ý: Thời gian cách ly không xác định.

- Pha thuốc với nước trong, không phun lên cỏ ngập nước và không phun lên phần xanh của cây trồng.
- Phun thuốc khi cỏ đang sinh trưởng phát triển xanh tốt. Sau khi phun thuốc 3 - 5 ngày cỏ vàng úa và chết hẳn sau 7 - 10 ngày kế tiếp.
- Khi cỏ đã già, cỏ nở hoa hoặc kết hạt thì cần phun ướt đều từ gốc tới ngọn, lượng nước phun phải từ 800 - 1000 lít/ha.

THUỐC TRỪ CỎ

KINH NGHIỆM PHỐI TRỘN CỦA NHÀ NÔNG:

Newfosinate 150SL + Parato 200SL *(Hoạt chất: Diquat dibromide 200g/l)*

Cây trồng	Dịch hại	Liều dùng
Cây công nghiệp, vườn cây ăn trái, đất không trồng trọt...	**Cỏ lá hẹp:** Cỏ chỉ, cỏ mực, cỏ tranh, cỏ chân vịt, cỏ lồng vực, cỏ mần trầu,... **Cỏ lá rộng:** Dền gai, rau sam, cỏ lá tre, rau trai (thài lài)...	Newfosinate 100ml + Parato 100ml/bình 16 lít. Newfosinate 150ml + Parato 100ml/bình 25 lít. Phun 500 – 750 lít nước/ha. Khi cỏ đã có hoa, cỏ cao hơn 30cm, phun 800 – 1.000 lít/ha

Lưu ý: Bao xài cỏ lá rộng và cỏ lá hẹp.

THUỐC TRỪ CỎ

KENBAST 15SL

KENBAST 15SL

Hiệu TRÂU ĐEN® 150SL

Hiệu TRÂU VÀNG 280

Hiệu BÒ RỪNG

Hiệu DP.AUO

Thay thế LYRHOXINI 41SL

Hiệu GLY 888

Hiệu SỨ TỬ ĐỎ

Hoạt chất: Glufosinate ammonium 150 g/lít + Chất phụ gia 850 g/lít
Hãng sản xuất: Kenso Corporation (M) Sdn. Bhd (Malaysia)

SIÊU DIỆT CỎ - CHÁY TẬN GỐC

Đặc tính - Công dụng:

Hoạt chất **Glufosinate-ammonium** là thuốc trừ cỏ không chọn lọc thế hệ mới thay thế hoạt chất **Glyphosate** và **Paraquat** có tác động tiếp xúc mạnh, diệt trừ các loại cỏ lá hẹp, lá rộng khó trị như: Mần trầu, cỏ tranh, cỏ cú, cỏ ống, cỏ chỉ... trên đất trồng cây công nghiệp, vườn cây ăn trái, đất không trồng trọt...

THUỐC TRỪ CỎ

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Cỏ hại	Cách dùng
Cao su, cà phê, ngô (bắp), hồ tiêu, vườn cây ăn trái, đất không trồng trọt...	Cỏ chỉ, mần trầu, dền gai, cỏ tranh, thài lài, cỏ chắc, cỏ lác, cỏ gấu, cỏ lá tre...	Pha 150 - 200 ml/bình 20 lít. Phun ướt đều từ gốc tới ngọn. Cỏ già, cỏ lớn có thể tăng liều.

Lưu ý:

- Pha thuốc với nước trong, không phun lên đất ngập nước hoặc đất quá khô và không phun lên phần xanh của cây trồng.
- Phun tốt nhất vào giai đoạn cỏ đang phát triển xanh tốt, sau 3 - 5 ngày cỏ vàng, từ 7 - 10 ngày cỏ chết hết.
- Khi cỏ có hoa hoặc cỏ cao hơn 30cm thì lượng nước phun phải từ 800 - 1000 lít/ha.
- Không phun thuốc khi trời sắp mưa. Trong vòng 4 giờ sau khi phun thuốc, gặp phải trời mưa có thể làm giảm hiệu quả diệt trừ cỏ.
- Thời gian cách ly: Không xác định.

THUỐC TRỪ CỎ

shina 200 18SL

Cháy Siêu Tốc 4.0

Hoạt chất:
Glufosinate ammonium... 200g/lít (18% w/w)
Phụ gia đặc biệt.....800g/lít

Hãng sản xuất:
Jiangsu Pesticide Research Institude Company Ltd

Đặc tính - Công dụng:

- **Shina 18SL** là thuốc trừ cỏ nội hấp, không chọn lọc, diệt được nhiều loại cỏ đã kháng Glyphosate IPA... một cách nhanh chóng.
- **Shina 18SL** trừ được nhiều nhóm cỏ hòa bản như: Cỏ chỉ, cỏ tranh, cỏ mực, cỏ chân vịt, cỏ lồng vực, cỏ mần trầu...; cỏ lá rộng như: Dền gai, rau sam, rau trai (thài lài)... trên cây công nghiệp, vườn cây ăn trái, đất không trồng trọt...

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Dịch hại	Liều dùng
Cây công nghiệp, vườn cây ăn trái, đất không trồng trọt...	Cỏ chỉ, cỏ mực, cỏ chân vịt, cỏ lồng vực, mần trầu,... Cỏ lá rộng như: Dền gai, rau sam, rau trai (thài lài...)	Sử dụng 3 - 4 lít/ha. Pha 150 - 200 ml/bình 20 lít. Pha 200 - 300 ml/bình 25 lít. Lượng nước 400 - 500 lít/ha.

Lưu ý:

- Pha thuốc với nước trong, không phun lên cỏ ngập nước và không phun lên phần xanh của cây trồng.
- Phun tốt nhất vào giai đoạn cỏ đang phát triển xanh tốt.
- Sau khi phun thuốc 3 - 5 ngày cỏ vàng và chết nhanh.
- Khi cỏ đã già, cỏ đã có hoa hoặc cỏ cao hơn 30cm thì lượng nước phun phải từ 800 - 1000 lít/ha.

Thời gian cách ly: Không xác định.

THUỐC TRỪ CỎ GUSSI BASTAR 200SL

bastar 200SL

Gussi **Bastar 200SL**

Hiệu
CỎ CHÁY HỒNG HÀ NHI

Hoạt chất: Glufosinate ammonium 200g/L
Hãng sản xuất: Shandong Eshung Industrial Co. Ltd.

Đặc tính - Công dụng:

- Gussi Bastar 200SL là thuốc trừ cỏ nội hấp, không chọn lọc, **hàm lượng 200g/l** nên diệt trừ nhiều loại cỏ lá rộng và lá hẹp, hằng niên và đa niên, nhất là đối với các loại cỏ khó trừ như: mần trầu, cỏ tranh, cỏ cú, cỏ ống, cỏ chỉ… trên đất trồng cây công nghiệp, vườn cây ăn trái, đất không trồng trọt…

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Cỏ hại	Cách dùng
Cao su, cà phê, ngô (bắp), hồ tiêu, vườn cây ăn trái, đất không trồng trọt…	Cỏ chỉ, mần trầu, dền gai, cỏ tranh, thài lài, cỏ chác, cỏ lác, cỏ gấu, cỏ lá tre…	Sử dụng 2.0 lít/ha. Pha 150 - 200 ml/bình 20 lít. Phun ướt đều từ gốc tới ngọn Cỏ già, cỏ lớn có thể tăng liều.

Lưu ý:
- Pha thuốc với nước trong, không phun lên đất ngập nước hoặc đất quá khô và không phun lên phần xanh của cây trồng.
- Phun tốt nhất vào giai đoạn cỏ đang phát triển xanh tốt, sau 3 - 5 ngày cỏ vàng và chết nhanh.
- Khi cỏ có hoa hoặc cỏ cao hơn 30cm thì lượng nước phun phải từ 800 - 1000 lít/ha.
- Không phun thuốc khi trời sắp mưa. Trong vòng 4 giờ sau khi phun thuốc, gặp phải trời mưa có thể làm giảm hiệu quả diệt trừ cỏ.
- Thời gian cách ly: Không xác định.

THUỐC TRỪ CỎ KENBAST 15SLGOLD

Parato- THẦN LỬA 300

CHÁY NHANH 4.0 THẾ HỆ MỚI

THAY THẾ CỎ LƯU DẪN GLYPHOSATE, CỎ CHÁY PARAQUAT

Hoạt chất: Glufosinate ammonium 150g/l
Hàng sản xuất:
Kenso Corporation (M) Sdn.Bhd (Malaysia)

Đặc tính - Công dụng:

- Sản phẩm là thuốc trừ cỏ nội hấp, không chọn lọc, diệt trừ được nhiều loại cỏ lá rộng và lá hẹp, hằng niên và đa niên, nhất là đối với các loại cỏ khó trừ như: Mần trầu, cỏ tranh, cỏ cú, cỏ ống, cỏ chỉ... trên đất trồng cây công nghiệp, vườn cây ăn trái, đất không trồng trọt...

Hướng dẫn sử dụng:

Cao su, cà phê, ngô (bắp), hồ tiêu, vườn cây ăn trái, đất không trồng trọt...	Cỏ chỉ, mần trầu, dền gai, cỏ tranh, thài lài, cỏ chác, cỏ lác, cỏ gấu, cỏ lá tre...	Pha 90 - 100 ml/bình 20 lít. Phun ướt đều từ gốc tới ngọn. Cỏ già, cỏ lớn có thể tăng liều.

Lưu ý:

- Pha thuốc với nước trong, không phun lên đất ngập nước hoặc đất quá khô và không phun lên phần xanh của cây trồng.
- Phun tốt nhất vào giai đoạn cỏ đang phát triển xanh tốt, sau 2 - 3 ngày phun, cỏ vàng, từ 4 - 5 ngày cỏ chết tận gốc.
- Khi cỏ có hoa hoặc cỏ cao hơn 30cm thì lượng nước phun phải từ 800 - 1000 lít/ha.
- Không phun thuốc khi trời sắp mưa. Trong vòng 4 giờ sau khi phun thuốc, gặp phải trời mưa có thể làm giảm hiệu quả diệt trừ cỏ.
- Thời gian cách ly: Không xác định.

THUỐC TRỪ CỎ KENBAST 15SL LONG

NƯỚC TÍM

LẠC ĐÀ®

DIỆT CỎ TẬN GỐC

CỎ BẮT ĐẦU CHẾT SAU 5 -7 NGÀY PHUN

Hoạt chất: Glufosinate ammonium 150g/lít
Hãng sản xuất:
Kenso Corporation (M) Sdn. Bhd (Malaysia)

Đặc tính - Công dụng:

Sản phẩm là thuốc trừ cỏ tiếp xúc, nội hấp, không chọn lọc, diệt trừ được nhiều loại cỏ lá rộng và lá hẹp, hằng niên và đa niên, nhất là đối với các loại cỏ khó trừ như: Mần trầu, cỏ tranh, cỏ cú, cỏ ống, cỏ chỉ... trên đất trồng cây công nghiệp, vườn cây ăn trái, đất không trồng trọt...

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Cỏ hại	Cách dùng
Cao su, cà phê, ngô (bắp), hồ tiêu, vườn cây ăn trái, đất không trồng trọt...	Cỏ chỉ, mần trầu, dền gai, cỏ tranh, thài lài, cỏ chác, cỏ lác, cỏ gấu, cỏ lá tre...	Pha 150 - 200 ml/bình 25 lít. Phun ướt đều từ gốc tới ngọn. Cỏ già, cỏ lớn có thể tăng liều.

Lưu ý:

- Pha thuốc với nước trong, không phun lên đất ngập nước hoặc đất quá khô và không phun lên phần xanh của cây trồng.
- Phun tốt nhất vào giai đoạn cỏ đang phát triển xanh tốt, sau 3 - 5 ngày cỏ vàng sau 7 - 10 ngày cỏ chết tốt.
- Khi cỏ có hoa hoặc cỏ cao hơn 30cm thì lượng nước phun phải từ 800 - 1000 lít/ha.
- Không phun thuốc khi trời sắp mưa. Trong vòng 4 giờ sau khi phun thuốc, gặp phải trời mưa có thể làm giảm hiệu quả diệt trừ cỏ.
- Thời gian cách ly: Không xác định.

THUỐC TRỪ CỎ GUSSI BASTAR 200SL LONG

NƯỚC ĐỎ

VOI RỪNG®

DIỆT CỎ TẬN GỐC!

x2 HIỆU QUẢ

Hoạt chất: Glufosinate ammonium 200g/l
Hãng sản xuất:
Shandong Eshung Industrial Co. Ltd.

Đặc tính - Công dụng:

- Sản phẩm là thuốc trừ cỏ tiếp xúc, nội hấp, không chọn lọc, diệt trừ được nhiều loại cỏ lá rộng và lá hẹp, hằng niên và đa niên, nhất là đối với các loại cỏ khó trừ như: Mần trầu, cỏ tranh, cỏ cú, cỏ ống, cỏ chỉ... trên đất trồng cây công nghiệp, vườn cây ăn trái, đất không trồng trọt...

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Cỏ hại	Cách dùng
Cao su, cà phê, ngô (bắp), hồ tiêu, vườn cây ăn trái, đất không trồng trọt...	Cỏ chỉ, mần trầu, dền gai, cỏ tranh, thài lài, cỏ chác, cỏ lác, cỏ gấu, cỏ lá tre...	2.0 lít/ha. Pha 100 - 150 ml/bình 20 lít. Phun ướt đều từ gốc tới ngọn khi cỏ đang phát triển.

Lưu ý:

- Pha thuốc với nước trong, không phun lên đất ngập nước hoặc đất quá khô và không phun lên phần xanh của cây trồng.
- Phun tốt nhất vào giai đoạn cỏ đang phát triển xanh tốt, sau 3 - 5 ngày cỏ vàng và chết nhanh.
- Khi cỏ có hoa hoặc cỏ cao hơn 30cm thì lượng nước phun phải từ 800 - 1000 lít/ha.
- Không phun thuốc khi trời sắp mưa. Trong vòng 4 giờ sau khi phun thuốc, gặp phải trời mưa có thể làm giảm hiệu quả diệt trừ cỏ.
- Thời gian cách ly: Không xác định.

THUỐC TRỪ CỎ

YOSKY 10SL

MẠNH GẤP 2 LẦN Glufosinate THÔNG THƯỜNG

MỚI

TRƯƠNG DÔI KỴ

KHAI HOANG P7

TRÂU RỪNG 2.0 GLU-P

KHAI HOANG G63

Hoạt chất: Glufosinate-P 10%w/w (tương đương 109g/l) + chất phụ gia 90%w/w
Hãng sản xuất: Yongnong Bioscience Co., Ltd.

Đặc tính - Công dụng:

- Sản phẩm là thuốc trừ cỏ tiếp xúc, nội hấp, không chọn lọc, phổ tác dụng rộng, diệt tất cả các loại cỏ hàng niên và đa niên như: Mần trầu, cỏ tranh, cỏ cú, cỏ ống, cỏ chỉ... trên đất trồng cây công nghiệp, vườn cây ăn trái, đất không trồng trọt...

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Cỏ hại	Cách dùng
Cao su, cà phê, ngô (bắp), hồ tiêu, vườn cây ăn trái, đất không trồng trọt...	Cỏ chỉ, mần trầu, dền gai, cỏ tranh, thài lài, cỏ chác, cỏ lác, cỏ gấu, cỏ lá tre...	Liều lượng: 3.0 lít/ha. Pha 120-150 ml/bình 20 lít. Phun ướt đều từ gốc tới ngọn Cỏ già, cỏ lớn có thể tăng liều.

Lưu ý:

- Pha thuốc với nước trong, không phun lên đất ngập nước hoặc đất quá khô và không phun lên phần xanh của cây trồng.
- Phun tốt nhất vào giai đoạn cỏ đang phát triển xanh tốt. Trong vòng 4 giờ sau khi phun thuốc, gặp phải trời mưa có thể làm giảm hiệu quả diệt trừ cỏ.
- Thời gian cách ly: Không xác định.

THUỐC TRỪ CỎ FAQUATRIO 20SL

Parato 200SL

Cháy Siêu Tốc 4.0 Mới

CỎ CHÁY NHANH 4.0

THAY THẾ PARAQUAT 276SL

Hoạt chất: Diquat dibromide ... 200g/lít+Phụ gia đặc biệt 800g/lít
Hãng sản xuất: Shandong Runyang Chemical Company

Diệt sạch các loại cỏ – Cháy khô sau 24 giờ.

Đặc tính - Công dụng:

- Sản phẩm chứa hoạt chất **Diquat Dibromide** là hoạt chất trừ cỏ không chọn lọc, hậu nảy mầm, có tác động tiếp xúc hấp thu qua lá và các phần màu xanh, diệt được hầu hết các loại cỏ như: Cỏ tranh, cỏ lông vực, cỏ tắc, cỏ mần trầu, cỏ bông tua, dền gai, rau sam, mắc cỡ, các loại cỏ lá rộng…

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Cỏ hại	Liều dùng
Đất trồng cây công nghiệp, vườn cây ăn trái, đất không trồng trọt...	Cỏ tranh, cỏ chỉ, cỏ lá tre, cỏ mực, cỏ chân vịt, cỏ lông vực, cỏ mần trầu, dền gai, rau sam, rau trai (thài lài), cỏ chác lác...	Sử dụng 3.0 lít/ha. Pha 150 - 200 ml/bình 20 lít

Lưu ý:

- Pha thuốc với nước trong, không phun lên đất ngập nước hoặc quá khô và không phun lên phần xanh của cây trồng.
- Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun ướt đều cỏ từ gốc tới ngọn vào giai đoạn cỏ đang phát triển xanh tốt.
- Sau khi phun thuốc **24h** cỏ vàng và bắt đầu chết.
- Thời gian cách ly: Không xác định.

THUỐC TRỪ CỎ RICEUP 300EC

Hiệu

GANGSTER300EC

RẤT AN TOÀN CHO CÂY L

Hoạt chất:
Pretilachlor.....300 g/l
(Chất an toàn Fenclorim 100 g/l)
Hãng sản xuất:
Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.

Đặc tính - Công dụng:

- GANGSTER 300EC chứa hoạt chất diệt cỏ Pretilachlor và chất an toàn Fenclorim, có tác động nội hấp, được hấp thu vào rễ và mầm cây cỏ, ngăn chặn quá trình phân chia tế bào làm cỏ ngừng phát triển và chết.

- GANGSTER 300EC là thuốc trừ cỏ tiền nẩy mầm, có tính chọn lọc cao, diệt trừ được hầu hết các loại cỏ như: Cỏ hòa bản (lồng vực, đuôi phụng...), cỏ năng, lác (cháo, chắc, u du...) và một số cỏ lá rộng (rau mác, cỏ xà bông, rau ngổ, mã đề...). Đặc biệt thuốc còn diệt lúa cỏ, lúa nền (lúa rài) trên ruộng lúa.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Cỏ hại	Cách dùng
Lúa sạ	Cỏ lồng vực, cỏ chỉ, cỏ cháo, cỏ cú, cỏ chắc, cỏ mực, lác rận, rau dừa nước, rau bợ, rau ngổ, rau xà bông...	Sử dụng 1.2 lít/ha Pha 50 - 60 ml/16L nước. Pha 75 - 100 ml/25L nước.

Lưu ý:

- Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc sau khi gieo sạ 1-4 ngày.
- Sử dụng cho lúa đã ủ nảy mầm, cỏ đủ rễ. Phun càng sớm, hiệu quả càng cao.
- Ruộng trước khi phun thuốc cần cày bừa, trục sạch cỏ vụ trước, san phẳng mặt ruộng, nước không đọng vũng, phun thuốc bằng béc phun sương phủ đều mặt ruộng.
- Sau khi phun 2 - 3 ngày thì cho nước vào, tránh để nước ngập ngọn mạ, giữ nước ẩm trong ruộng 5 - 10 ngày, không để đất ruộng bị khô, nứt nẻ.
- Thời gian cách ly: Không xác định.

Cỏ đuôi phụng

Cỏ lồng vực

Lúa cỏ

Cỏ mực

Rau bợ

THUỐC TRỪ CỎ DKTAZONE 480SL

Hiệu

Vamco® 480SL

Sức mạnh xe tăng Đức

DIỆN MẠO MỚI

Hoạt chất:
Bentazone.....480g/L
Special additives.....520g/L

Hãng sản xuất:
Anhui Zhongshan Chemical Industry Co., Ltd.

ĐẶC TRỊ CỎ TRÊN RUỘNG LÚA, LẠC, ĐẬU TƯƠNG...

Đặc tính - Công dụng:

- **Vamco 480SL** là thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm thuộc thế hệ mới nhất, tiên tiến nhất. Thuốc được hấp thu qua cả lá và rễ, có tác dụng cực kỳ hiệu quả với các loại cỏ lá rộng trên ruộng.
- Đặc biệt, sản phẩm **Vamco 480SL** có thời gian áp dụng rộng và rất an toàn. Sản phẩm được đăng ký trừ cỏ trên ruộng đậu nành (đậu tương),...

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Thời điểm	Liều lượng
Trừ cỏ dại trên ruộng: Lúa, lạc (đậu phộng), đậu tương (đậu nành)...	8 - 15 ngày sau sạ, gieo trồng.	80ml/ bình 25 lít nước.
	15 - 30 ngày sau sạ, gieo trồng.	100 - 125ml/ bình 25 lít nước.

Lưu ý:

- Sử dụng từ 1,5 lít/ha. Pha với 400 - 500 lít nước.
- Lắc kỹ chai thuốc trước khi sử dụng.
- Đi chậm, phun đủ lượng nước.
- Thời gian cách ly: Không xác định.

THUỐC TRỪ CỎ MISUNG 15SC

GIÁO SƯ CỎ ®

AN TOÀN VỚI CÂY TRỒNG - PHUN PHỦ LÊN NGÔ, MÍA

Có Giáo Sư Cỏ - Còn lo gì chứ!

SẠCH CỎ DẠI

Hoạt chất:
Mesotrione.....15% w/w
Special additives...85% w/w

Hãng sản xuất: Anhui Shengdan Biochemical Co., Ltd.

Đặc tính - Công dụng:

- GIÁO SƯ CỎ là thuốc trừ cỏ chọn lọc, hậu nảy mầm sớm, có tác động tiếp xúc, nội hấp, trừ cỏ phổ rộng. Thuốc làm ức chế quá trình quang hợp của cây cỏ. Sau khi phun từ 3 - 5 ngày, cây cỏ bắt đầu có triệu chứng bạch tạng và chết gục sau khi phun 10 ngày. Hiệu quả cao với cỏ hàng niên và một số cỏ đa niên lá hẹp, lá rộng như cỏ chỉ, mần trầu, cỏ gấu, cỏ tức,... trong ruộng ngô, mía... Hiệu quả cao đối với các loại cỏ hòa bản, lá rộng.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Cỏ hại	Cách dùng
Mía	Cỏ hòa thảo Cỏ lá rộng	0.8 lít/ha. Pha 50 - 60 ml/bình 20 lít Phun 3 bình cho 1.000 m^2 Lượng nước phun từ 500 - 600 lít/ha.
Ngô (bắp)		

Lưu ý:

- Trên ngô **(bắp), mía** phun khi cỏ đã mọc nhưng còn nhỏ (1 - 5 lá).
- Với **bắp nếp, ngọt:** Nên xịt dưới gốc, hạn chế xịt vào lá, nõn.
- Phun thuốc tốt nhất khi cây ngô từ 8 lá trở lên, có thể phun trùm lên cây ngô, hạn chế phun tập trung vào nõn ngô. Thuốc có thể làm cho lá bị vàng, trắng sau một thời gian ngắn cây ngô phục hồi và các lá ra sau sẽ xanh trở lại.
- **Thời gian cách ly:** Không xác định.

Cỏ mần trầu

Cỏ gấu

Cỏ chỉ

Cỏ cứt lợn

Cỏ lác

THUỐC TRỪ CỎ BPSACO 500EC

SIÊU DIỆT MẦM

TRÙM CỎ® 500EC

Hoạt chất:
Acetochlor.....500g/lít
Phụ gia đặc biệt...500g/lít

Hãng sản xuất:
Shandong Zhongshi Pesticide Co., Ltd.

Đặc tính - Công dụng:

- Theo danh mục thuốc BVTV, hoạt chất **Acetochlor** được đăng ký tên thương mại ở nhiều nước trên thế giới dùng để diệt cỏ hòa bản, lông vực, cỏ chỉ, cỏ túc, cỏ đuôi chồn, mần trầu, cỏ lác, cỏ gấu, cỏ lá rộng: Dền gai, cỏ rây, mắc cỡ... trên lạc, ngô, mía, sắn, hành, tỏi, sắn...

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Cỏ hại	Liều dùng
Lạc, sắn, ngô, mía, bông vải, đậu tương, khoai lang, lạc, mía, hành...	Cỏ hòa bản, cỏ chỉ, cỏ lông vực, cỏ túc, mần trầu, cỏ đuôi chồn, cỏ lác, cỏ gấu, dền gai, cỏ rây, mắc cỡ...	Pha 15-20 ml/bình 10 lít nước. Pha 30-40 ml/bình 20 lít nước. Lượng thuốc dùng: 1.0 - 1.2 lít/ha Lượng nước phun: 400 - 500 lít/ha

Lưu ý:

- Phun thuốc trước và sau khi tra hạt hoặc đặt hom từ 1 - 4 ngày.
- Giữ đủ độ ẩm cho đất, tránh trời mưa to động nước nhiều.
- Thời gian cách ly: Không xác định.

THUỐC TRỪ CỎ GOROP 500EC

Gorop 500EC

Hoạt chất:
Acetochlor.....500g/lít
Phụ gia đặc biệt...500g/lít

Hãng sản xuất:
Weifang Kesai Agrochem Co., Ltd.

Đặc tính - Công dụng:

Gorop 500EC là thuốc trừ cỏ diệt mầm, nội hấp lưu dẫn, dùng để diệt mầm cỏ, trừ được hầu hết các loại cỏ lá rộng, lá hẹp như: Cỏ hoà bản, lồng vực, cỏ chỉ, cỏ túc, cỏ đuôi chồn, mần trầu, cỏ lác, cỏ gấu, cỏ lá rộng: Dền gai, cỏ ráy, mắc cỡ trên khoai mì (sắn), đậu tương, bắp (ngô), lạc... Sản phẩm đăng ký trừ cỏ trên đậu tương.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Cỏ hại	Liều dùng
Đậu tương	Cỏ	Pha 45 - 55 ml/bình 25 lít nước. Phun 2 bình cho 1 công Nam bộ (1.000m2) hoặc pha 360 - 450 ml cho 1 phuy 200 lít nước.

Lưu ý:

- Phun sau khi gieo trồng lấp hạt hoặc củ từ 1 - 4 ngày và giữ cho đất đủ độ ẩm cao, tránh đọng nước.
- Thời gian cách ly: Không xác định.

THUỐC TRỪ CỎ MODUSA 960EC

Modusa 960EC

MoDusa 960EC Gold

Hoạt chất: S-Metolachlor 960 g/L + Phụ gia & dung môi vừa đủ 1 Lít
Hãng sản xuất: Weifang Sino-Agri Union Chemical Co., Ltd.

Đặc tính - Công dụng:

- Modusa 960EC chủ yếu được hấp thụ qua mạch dẫn đi lên trên, ức chế sự tăng trưởng của chồi và rễ. Hiệu quả cao trong trừ cỏ trên cây trồng cạn: Cỏ lá hẹp (cỏ gạo, mần trầu, cỏ túc, cỏ đuôi chồn...); chác lác (cỏ cháo, cỏ chắc, cỏ lác, cỏ cú...); cỏ lá rộng (đồng tiền, dền gai, nghể, vỉ cúc, rau sam, cỏ mực, cỏ chân vịt)...

- Thuốc chứa hoạt chất tiên tiến là phát minh mới sau, mạnh hơn gấp đôi Acetochlor, an toàn hơn cho môi trường và người sử dụng, sạch cỏ hơn. Thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm, chỉ cần phun 1 lần cho cả vụ, trừ các loại cỏ gây hại quan trọng ngay từ đầu vụ tiết kiệm chi phí, tăng thu nhập.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Cỏ hại	Liều dùng
Ngô, khoai mì (sắn), đậu tương, lạc, mía, bông vải, rau muống, rau cải,...	Cỏ gạo, mần trầu, cỏ túc, cỏ đuôi chồn, chác lác, cỏ cháo, cỏ chắc, cỏ lác, cỏ cú, cỏ đồng tiền, dền gai, nghể, vi cúc, rau sam, cỏ mực, cỏ chân vịt...	0.8 lít/ha. Pha 20-25 ml/bình 16 lít, phun 2 - 2,5 bình/1000m^2, hoặc 35-40 ml/bình 25 lít, phun 1,5 bình/1000m^2.

Lưu ý: Thời gian cách ly không xác định.

- Phun trước hoặc ngay sau khi gieo trồng trên đất ẩm (sau khi mưa hoặc tưới nước), tránh để thuốc tiếp xúc trực tiếp với hạt giống đang nảy mầm.
- Phun khi cỏ chưa mọc mầm hoặc còn nhỏ dưới một lá rưỡi.
- Đối với ngô (bắp), nên phun trước khi gieo 3 - 4 ngày.

Ngô (bắp)

Mía

Đậu nành (đậu tương)

Khoai mì (sắn)

Đậu phộng (lạc)

Khoai lang

THUỐC TRỪ CỎ

Maruka 5EC

DIỆT CỎ LÁ HẸP TRÊN CÂY TRỒNG LÁ RỘNG

Hoạt chất:
Quizalofop-P-ethyl...50g/lít
Phụ gia đặc biệt.....950g/lít

Hãng sản xuất:
Anhui Fengle Agrochemical Co., Ltd

Đặc tính - Công dụng:

- Maruka 5EC là thuốc trừ cỏ chọn lọc, nội hấp, hậu nảy mầm sớm, tác động lên đỉnh sinh trưởng và rễ của cỏ dại làm cho cỏ dại không tổng hợp được acid amin...
- Maruka 5EC diệt trừ được các loại cỏ lá hẹp mọc từ hạt thuộc nhóm hòa bản, lúa rài (lúa mọc từ hạt lúa rơi rớt trong vụ trước) trong ruộng khoai tây, khoai lang, lạc, đậu tương, đậu xanh, bông vải, súp lơ, cải bắp, khoai mì (sắn)...

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Dịch hại	Liều dùng
Khoai tây, khoai lang, lạc, đậu tương, đậu xanh, khoai môn, súp lơ, cải bắp, vừng, khoai mì (sắn)...	Cỏ đuôi phụng, lúa rài, cỏ chỉ, cỏ mần trầu, cỏ lông công, cỏ lồng vực...	0.8 - 1.2 lít/ha. Pha 35ml/bình 16 lít. Pha 50-70ml/bình 25 lít. Phun 400-500 lít nước/ha.

Lưu ý:

- Thời gian cách ly: Không xác định.
- Đất ruộng phải đủ ẩm trước khi phun, đất khô cần tưới nước trước khi phun.
- Phun sau khi gieo trồng được 10-15 ngày (cỏ 2 - 3 lá), nếu quá thời gian trên (khi cỏ 5 - 6 lá) phải tăng liều dùng hoặc dùng thuốc khác.
- Không phun thuốc khi có gió to hoặc sắp có mưa to.
- Không phun thuốc vào ruộng cây họ bầu, bí, dưa ở giai đoạn ít hơn 7 lá thật.
- Không sử dụng trên cây trồng lá hẹp như: bắp, lúa, mía...

KINH NGHIỆM PHỐI TRỘN CỦA NHÀ NÔNG:

1. Maruka 5EC + Bpsaco 500EC (Hoạt chất: Acetochlor 500g/lít)

Cây trồng	Dịch hại	Liều dùng
Khoai tây, khoai lang, lạc, đậu tương, đậu xanh, khoai môn, súp lơ, cải bắp, vừng, khoai mì (sắn)...	Cỏ đuôi phụng, cỏ chỉ, cỏ mần trầu, cỏ lông công, cỏ lồng vực, lúa rài...	Maruka 40ml + Bpsaco 40ml /bình 16 lít. Maruka 70ml + Bpsaco 50ml /bình 25 lít. Phun 500-750 lít nước/ha

Lưu ý: Diệt cỏ nhanh và triệt để hơn, kể cả hạt cỏ và mầm cỏ.

2. Maruka 5EC + Whip 6.5EC (Hoạt chất: Fenoxaprop-P-Ethyl 65g/lít)

Cây trồng	Dịch hại	Liều dùng
Khoai tây, khoai lang, lạc, đậu tương, đậu xanh, khoai môn, súp lơ, cải bắp, vừng, khoai mì (sắn)...	Cỏ đuôi phụng, cỏ chỉ, cỏ mần trầu, cỏ lông công, cỏ lồng vực, lúa rài...	Maruka 40ml + Whip 15ml /bình 16 lít. Maruka 70ml + Whip 20ml /bình 25 lít. Phun 500-750 lít nước/ha

Lưu ý: Diệt cỏ nhanh và triệt để hơn.

THUỐC TRỪ CỎ

Laoton 108EC

+ PHUN PHỦ ĐƯỢC LÊN CÂY TRỒNG
+ AN TOÀN VỚI CÂY TRỒNG
+ TRỪ CỎ LÁ HẸP TRÊN CÂY TRỒNG LÁ RỘNG

LÃO TÔN RA TAY
ĐÁNH BAY CỎ DẠI

Hoạt chất:
Haloxyfop-p-methyl:....108g/l
Special Additives:.....892g/l

Hãng sản xuất:
Hailir Pesticides and Chemicals Group Co., Ltd.

Đặc tính - Công dụng:

- Haloxyfop-P-methyl là thuốc trừ cỏ chọn lọc, được hấp thụ bởi lá và rễ, thủy phân thành haloxyfop-P chuyển đến các mô phân sinh gây ức chế sự phát triển của chúng. Haloxyfop-P-methyl được sử dụng trừ cỏ hằng năm và lâu năm trên lạc (đậu phộng), sắn (khoai mì), đậu nành (đậu tương).

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Cỏ hại	Cách dùng
Lạc (đậu phộng)	Cỏ hòa thảo, cỏ gạo, mần trầu, cỏ bông, cỏ chỉ, cỏ đuôi phụng...	Lượng thuốc 0,8 lít/ha. Pha từ 50 - 70ml/bình 20 lít. Phun 3 bình cho 1000m^2. Phun sau khi gieo từ 5-10 ngày
Sắn (khoai mì)		
Đậu nành (đậu tương)		
Khoai lang, hành lá		

Lưu ý:

- Hành lá bền rễ tốt mới cho xịt.
- Lượng nước phun từ 400-600 lít/ha.
- Phun sau khi gieo trồng từ 5-10 ngày, khi cây từ 1-3 lá, cây trồng sẽ phục hồi lại sau phun 1 thời gian ngắn.
- Phun thuốc khi cỏ còn nhỏ, từ 1-3 lá, không phun cho các cây trồng khác.
- Thời gian cách ly: Không xác định.

Gardona 250SL

DIỆT SẠCH CỎ DẠI - AN TOÀN CÂY

Hoạt chất:
Fomesafen.....250g/L
Special additives.....750g/L

Hãng sản xuất :
Dengfeng Jinbo Pesticde Chemical Co., Ltd.

Đặc tính - Công dụng:

- Thuốc trừ cỏ Gardona 250SL là thuốc trừ cỏ thế hệ mới, tiên tiến. Thuốc được hấp thu nhanh qua lá, thân, rễ cỏ vào mô thực vật làm mất diệp lục, phá hủy màng tế bào khiến cỏ bị héo và chết. Thuốc diệt trừ hữu hiệu các loại cỏ lá rộng như: Cỏ hôi (lông hôi), mắc cỡ (cây xấu hổ), rau sam, chua me, dền gai, cỏ cúc, chó đẻ, tầm bóp...
- Sau khi phun, lá cây trồng có thể bị táp hoặc xoăn, cây sẽ phục hồi lại, ra lá mới bình thường sau 5 - 7 ngày. Không ảnh hưởng tới năng suất cây trồng.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Cỏ hại	Cách dùng
Đậu nành (đậu tương), đậu phộng (lạc), củ đậu, khoai mì (sắn).	Mắc cỡ (cây xấu hổ), rau sam, cỏ cúc, cỏ hôi (lông hôi), chó đẻ, chua me, dền gai, tầm bóp...	1.0 lít/ha, pha 25 - 30 ml/bình 20 lít. Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun sau khi gieo, trồng 10-15 ngày, khi cỏ từ 2 - 3 lá.

Lưu ý:

- Riêng với khoai mì, bà con nên dùng béc phun chùm, xịt tập trung phía dưới gốc mì. Hạn chế xịt lên ngọn. Lá cây có thể bị táp khi dính thuốc. Lá mới, lộc non sẽ ra lại sau 5 - 7 ngày.
- Khi phun, có thể kết hợp với thuốc trừ cỏ Maruka hoặc Laoton để tăng cường hiệu quả phòng trừ cỏ dại lá hẹp. Không phun thuốc cho các cây trồng khác nếu chưa thử. Trước khi phun cần làm ẩm nền đất, phun khi trời mát, không có mưa.
- Thời gian cách ly: Không xác định.

Dusan 240EC

DIỆT SẠCH CỎ DẠI
PHUN PHỦ ĐƯỢC LÊN CÂY TRỒNG

Hoạt chất:
Lactofen.....240g/L
Special additives.....760g/L

Hãng sản xuất :
Dengfeng Jinbo Pesticde Chemical Co., Ltd.

Đặc tính - Công dụng:

- Thuốc trừ cỏ Dusan 240EC là thuốc trừ cỏ thế hệ mới, tiên tiến. Thuốc được hấp thu nhanh qua lá, thân, rễ cỏ vào mô thực vật làm mất diệp lục, phá hủy màng tế bào khiến cỏ bị héo và chết. Thuốc diệt trừ hữu hiệu các loại cỏ lá rộng như: Cỏ hôi (lông hôi), mắc cỡ (cây xấu hổ), rau sam, chua me, dền gai, cỏ cúc, chó đẻ, tầm bóp...
- Sau khi phun, lá cây trồng có thể bị táp hoặc xoăn, cây sẽ phục hồi lại, ra lá mới bình thường sau 5 - 7 ngày. Không ảnh hưởng tới năng suất cây trồng.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Cỏ hại	Cách dùng
Đậu nành (đậu tương), đậu phộng (lạc), củ đậu, khoai mì (sắn).	Mắc cỡ (cây xấu hổ), rau sam, cỏ cúc, cỏ hôi (lông hôi), chó đẻ, chua me, dền gai, tầm bóp...	0.3 - 0.4 lít/ha, pha 15-20ml/bình 20 lít. Lượng nước phun 400-600 lít/ha. Phun sau khi gieo, trồng 10-15 ngày, khi cỏ từ 2 - 3 lá.

Lưu ý:

- Riêng với khoai mì, bà con nên dùng béc phun chùm, xịt tập trung phía dưới gốc mì. Hạn chế xịt lên ngọn. Lá cây có thể bị táp khi dính thuốc. Lá mới, lộc non sẽ ra lại sau 5 - 7 ngày.
- Khi phun, có thể kết hợp với thuốc trừ cỏ Maruka hoặc Laoton để tăng cường hiệu quả phòng trừ cỏ dại lá hẹp. Không phun thuốc cho các cây trồng khác nếu chưa thử. Trước khi phun cần làm ẩm nền đất, phun khi trời mát, không có mưa.
- Thời gian cách ly: Không xác định.

AMESIP 80WP

Voi Rừng®

Diệt Sạch Các Loại Cỏ

Hoạt chất:
Ametryn.....80% w/w
Phụ gia đặc biệt...20% w/w

Hãng sản xuất:
Forward (Beihai) Hepu Pesticide Co., Ltd.

Đặc tính - Công dụng:

Sản phẩm là thuốc chọn lọc, phổ tác dụng rộng, có tác dụng tiếp xúc nội hấp và lưu dẫn mạnh. Thuốc diệt cỏ ở giai đoạn tiền nảy mầm và hậu nảy mầm sớm, các loại cỏ hằng niên và đa niên, lá rộng và lá hẹp thường xuất hiện trên ruộng mía, thơm (dứa), thanh long như: Cỏ mần trầu, đuôi phụng, lông vực, cỏ đuôi chồn, dền gai, rau sam, cỏ chắc lác...

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Cỏ hại	Liều dùng
Mía	Cỏ mần trầu, đuôi phụng, lồng vực, cỏ đuôi chồn, dền gai, rau sam, cỏ chác lác...	3.0 - 5.0 kg/ha. Pha 100 - 150g cho bình 18 lít nước.

Lưu ý:

- Lượng nước phun từ 400 - 600 lít/ha.
- Phun thuốc trãi đều, không phun trực tiếp vào ngọn mía, ngô, dứa.
- Giữ đất có độ ẩm trước và sau khi phun thuốc.
- Thời gian cách ly: 45 ngày sau khi phun.

THUỐC TRỪ CỎ SURON 80WP

DURONG 800WP

Có RỒNG ĐỎ
Không lo NHỔ CỎ

Hoạt chất:
Diuron.....80% w/w
Phụ gia đặc biệt...20% w/w

Hãng sản xuất:
Jingma Chemicals Co., Ltd.

Đặc tính - Công dụng:

DURONG 800WP là thuốc trừ cỏ tác động nội hấp và chọn lọc, diệt trừ các loại cỏ lá hẹp và lá rộng trên ruộng mía, bông vải, cà phê, khoai mì (sắn) như: Cỏ lá rộng, cỏ hòa thảo, mần trầu, cỏ túc, cỏ ống, cỏ chân gà, dền gai, rau sam, mắc cỡ...

DURONG 800WP chủ yếu trừ cỏ trước khi mọc (tiền nảy mầm) hoặc cỏ mới mọc, còn nhỏ có từ 1-2 lá.

DURONG 800WP có hiệu quả diệt cỏ kéo dài nên làm giảm chi phí diệt cỏ.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Dịch hại	Liều dùng
Mía	Cỏ lá rộng, cỏ hòa thảo	3.5 kg/ha. Pha 40g/bình 12-16 lít nước. Phun 600 - 800 lít nước/ha. Phun thuốc sau khi gieo hạt bông 1-2 ngày. Tránh phun trực tiếp
Ngô (bắp)		

Lưu ý:

- Nên phun trước khi cỏ mọc hay khi cỏ còn nhỏ (có 1-2 lá) hiệu quả trừ cỏ sẽ cao.

Nếu phun khi mía đã mọc, tránh phun trực tiếp vào ngọn mía.

Khi phun thuốc đất càng ẩm càng tốt, nếu đất khô cần tưới ẩm trước khi phun.

- Thời gian cách ly: Không xác định.



Many 800WP

Siêu trừ cỏ/ngô

Hoạt chất:
Atrazine.....800g/kg
Phụ gia đặc biệt...200g/kg

Hãng sản xuất:
Jinan Kesai Agrochem Co., Ltd

Đặc tính - Công dụng:

- Many 800WP là thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm "cỏ mới mọc được 2-3 lá". Thuốc tác động trên mầm cỏ, lá cỏ và rễ cỏ làm cho cây cỏ không tổng hợp được acid amin.
- Many 800WP trừ được nhiều nhóm cỏ hòa bản như: Cỏ chỉ, cỏ mực, cỏ chân vịt, cỏ lông vực, cỏ mần trầu..., cỏ lá rộng như: dền gai, rau sam... trên dứa (khóm, thơm), mía, ngô...

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Dịch hại	Liều dùng
Dứa (khóm, thơm)	Cỏ chỉ, cỏ mực, cỏ chân vịt, cỏ lông vực, cỏ mần trầu, dền gai, rau sam...	1 - 2 kg/ha. Pha 50 - 100g/bình 16 - 20 lít. Phun khi cỏ chưa mọc hoặc đang mọc (cỏ non). Lượng nước phun từ 400 - 500 lít nước/ha.
Mía		
Ngô (bắp)		

- Phun sau khi gieo trồng được 5 – 15 ngày, nếu quá thời gian trên (khi cỏ có 5-6 lá) phải tăng liều dùng.
- Không phun thuốc khi có gió to hoặc sắp có mưa lớn.
- Không để thuốc bay vào lúa, rau cải, ngũ cốc, măng tây, đậu nành, đậu phộng, đậu xanh, đay, khoai tây...
- Thời gian cách ly: Không xác định.

THUỐC TRỪ CỎ TEMBO 8%OD

Vua Cỏ Ngô®

THẾ HỆ MỚI THAY THẾ MESOTRIONE
AN TOÀN VỚI CÂY TRỒNG
DIỆT SẠCH CỎ LÁ RỘNG, LÁ HẸP

Hoạt chất:
Tembotrione 8%w/w (80g/kg)
Phụ gia đặc biệt vừa đủ .....1 lít
Hãng sản xuất:
Anhui JiuYi Agriculture Co., Ltd.

Đặc tính - Công dụng:

- Tembotrione là hoạt chất thuốc trừ cỏ trên ngô, mía thế hệ mới nhất hiện nay. Là thế hệ sau của thuốc trừ cỏ Mesotrione. Tembotrione làm mất diệp lục xanh, khiến cỏ bạc trắng nhanh - chết sạch gọn. Thuốc an toàn cho ngô, mía.
- Thuốc hấp thu qua lá, diệt cỏ bằng cách ức chế tổng hợp sắc tố, làm cỏ vàng trắng và chết dần; an toàn cho cây ngô khi dùng đúng liều lượng. Diệt trừ hiệu quả các loại cỏ lá rộng và cỏ lá hẹp trên ruộng ngô/mía, như cỏ lồng vực, cỏ mần trầu, cỏ chỉ, cỏ lác, cỏ cứt lợn…

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Dịch hại	Liều dùng
Ngô, mía	Cỏ dại	Pha 35-40ml/20L nước

Lưu ý:

- Thời gian cách ly: Không xác định
- Phun xịt thuốc vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát.
- Hạn chế xịt vào nõn và lá non của bắp (ngô)/cây mía.
- Không xịt khi trời nắng nóng

TOPMESI® 40SC

SÚT BAY CỎ DẠ

TỐT HƠN MESOTRIONE + ATRAZINE

AN TOÀN VỚI CÂY TRỒNG

Hoạt chất:

Topramezone.....3%w/w (30g/kg)

Terbuthylazine....37%w/w (370g/kg)

Hãng sản xuất:

Shandong Sinomey Co., Ltd.

Đặc tính - Công dụng:

- Bộ đôi Topramezone + Terbuthylazine là "chuẩn mực vàng" mới, hiệu quả nhất hiện nay trong các loại thuốc trừ cỏ bắp, mía. Sự kết hợp hoàn hảo của 2 hạt chất hậu nảy mầm, giúp diệt trừ các loại cỏ lá rộng, lá hẹp kháng thuốc: diệt nhanh - sâu - bền.
- Topramezone "tắt đèn" diệp lục khiến cỏ bạc trắng, ngừng sinh trưởng chỉ sau vài ngày, trong khi Terbuthylazine tạo lớp khiên bảo vệ ruộng, vườn khỏi mầm cỏ từ 4-6 tuần. Topmesi rất an toàn với bắp, mía.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Dịch hại	Liều dùng
Ngô, mía	Cỏ dại	Pha 35-40ml/20L nước

Lưu ý:

- Thời gian cách ly: Không xác định
- Không xịt khi trời nắng nóng.
- Nên phun xịt thuốc vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát.
- Hạn chế phun xịt vào nõn và lá non của bắp (ngô).
- Thuốc phun xịt hiệu quả cao nhất khi cỏ nhỏ, dưới 4-5 lá

Cỏ mần trầu

Cỏ gấu

Cỏ chỉ

Cỏ cứt lợn

Cỏ lác

CÁC LOẠI SÂU RẦY

Rầy nâu

Rầy xanh

Sâu tơ


Sâu cuốn lá

Sâu đục thân

Sâu đục quả

Bọ trĩ

Rầy bông

Rầy mềm

Sâu keo mùa thu

Rệp sáp

Rầy chổng cánh

Sâu vẽ bùa

Nhện đỏ, nhện trắng

Sâu xanh

THUỐC TRỪ SÂU

Abinsec 1.8EC

SIÊU DIỆT SÂU, RẦY, ỐC...

Hoạt chất: Abamectin 1.8% w/w + Phụ gia đặc biệt vừa đủ 1 lít
Hãng sản xuất: Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.

Nước đỏ

Abinsec 1.8EC

Đặc trị sâu xanh, nhện đỏ, rệp sáp, sâu cuốn lá, sâu đục thân, đục bẹ, sâu đ

OXATIFI 1.8EC

Đặc trị sâu tơ, sâu xanh, cuốn lá, đục thân, bọ nhảy, bọ trĩ, vẽ bùa, nhện đỏ

Đặc tính - Công dụng:

Abinsec 1.8EC chứa hoạt chất Avermectin B1a, B1b (Abamectin) là thuốc có cơ chế tiếp xúc, nội hấp và lưu dẫn mạnh. Đặc trị nhiều loại sâu rầy như: Sâu cuốn lá, sâu xanh, bọ trĩ, sâu vẽ bùa, nhện đỏ, rầy xanh, rầy mềm, sâu đục thân, dòi đục quả, ốc bươu vàng, bọ phấn... trên nhiều cây trồng khác nhau.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Sâu hại	Liều dùng
Dâu tây, dưa chuột, dưa hấu Các loại hoa: Hoa cúc, hoa đồng tiền, hoa hồng.	Bọ phấn, bọ trĩ, dòi đục lá, rầy mềm...	Pha 15-20ml/bình 25 lít Cây non, cây trồng trong nhà kính pha liều thấp (15ml/bình 25 lít).
Rau họ thập tự: Bắp cải, súp lơ, su hào.	Bọ phấn, rầy mềm, sâu ăn lá...	
Táo	Nhện đỏ, nhện trắng, sâu đục thân...	
Trà (chè)	Bọ cánh tơ, rầy xanh	Pha 15-20 ml/bình 25 lít.
Lúa	Bọ trĩ, sâu cuốn lá, ốc bươu vàng	Pha 30-50 ml/bình 25 lít.
Thông, tùng	Sâu róm	Pha 15-20 ml/bình 25 lít.

Lưu ý: Thời gian cách ly 7 ngày
- Lượng nước phun từ 400 - 500 lít/ha.
- Không phun thuốc khi có gió lớn hoặc trời sắp mưa to.
- Phun thuốc ướt đều lá khi sâu mới nở, sâu còn nhỏ (tuổi 1 - 2), đối với cây non (cây còn nhỏ) giảm thuốc khi pha cho thích hợp.

THUỐC TRỪ SÂU

Ankamec 3.6EC

Nước đỏ, nước trong

Dapharnec 3.6EC

Chitin 3.6EC

Nước đỏ, nước trong

HAIHAMEC 3.6EC

Nước đỏ, nước trong

SIÊU DIỆT SÂU, RẦY, ỐC...

Hoạt chất: Abamectin 3.6% w/w + Phụ gia đặc biệt vừa đủ 1 lít

Đặc tính - Công dụng:

- Hoạt chất Abamectin là thuốc tiếp xúc, nội hấp lưu dẫn. Đặc trị nhiều loại sâu rầy như: Sâu cuốn lá, sâu xanh, bọ trĩ, sâu vẽ bùa, nhện đỏ, rầy xanh, rầy mềm, sâu đục thân, dòi đục quả, ốc bươu vàng, bọ phấn,... trên nhiều cây trồng khác nhau.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Sâu hại	Liều dùng
Dâu tây, dưa chuột, dưa hấu...	Bọ phấn, bọ trĩ, dòi đục lá, rầy mềm...	Pha 15-20ml/bình 25 lít Cây non, cây trồng trong nhà kính pha liều thấp (15ml/bình 25 lít). Lượng nước phun: 400 - 500 lít/ha.
Các loại hoa: Hoa cúc, hoa đồng tiền, hoa hồng.	Bọ phấn, bọ trĩ, dòi đục lá, rầy mềm...	
Rau họ thập tự: Bắp cải, súp lơ, su hào.	Bọ phấn, rầy mềm, sâu ăn lá...	
Táo	Nhện đỏ, nhện trắng, sâu đục thân...	
Thông, tùng	Bọ róm	
Lúa	Bọ trĩ, ốc bươu vàng	Pha 30-50ml/bình 25 lít
Trà (chè)	Rầy xanh	

Lưu ý: Thời gian cách ly: 7 ngày

- Không phun thuốc khi có gió lớn hoặc trời sắp mưa to.
- Phun thuốc ướt đều lá khi sâu mới nở, sâu còn nhỏ (tuổi 1 - 2), đối với cây non (cây còn nhỏ) giảm thuốc khi pha cho thích hợp.

KHÔNG GÂY NGHẸT BÉC

Báo Đen®

Đặc trị: Sâu - Rầy - Nhệ

Hoạt chất:
Avermectin B1a, B1b (Abamectin) : 38g/lít

Hãng sản xuất:
Bailing Agrochemical Co., Ltd

• Nước đo
• Nước trong

Đặc tính - Công dụng:

- Hoạt chất Abamectin là thuốc tiếp xúc, nội hấp, lưu dẫn. Đặc trị nhiều loại sâu hại trên nhiều loại cây trồng khác nhau như: Sâu tơ, sâu hành, sâu vẽ bùa, bọ nhảy, sâu xám, sâu keo, bọ nhảy, rầy xanh, rầy phấn, rệp sáp, ốc bươu vàng...

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Sâu hại	Liều dùng
Bắp cải	Sâu tơ, bọ nhảy, sâu xám	Pha 25ml/bình 20 lít. Sâu hành: Pha 50-100ml cho bình 20 lít.
Đậu tương	Sâu đục quả	
Cải thìa	Sâu vẽ bùa, bọ nhảy, sâu tơ	
Bắp (ngô)	Sâu keo, sâu xám	
Lúa	Sâu cuốn lá, đục thân, nhện gié, bọ trĩ	
Hành	Sâu hành	

Lưu ý:

- Sâu cuốn lá: Phun thuốc khi thấy bướm rộ.
- Nhện gié: Phun khi nhện xuất hiện tuổi nhỏ.

Lượng nước: Phun từ 400 - 600 lít/ha.
Thời điểm: Phun khi sâu hại bắt đầu xuất hiện.
Thời gian cách ly: 7 ngày sau khi phun.

Rất độc với Ốc

• Nước đỏ
• Nước trong

Daphamec 5.0EC

CẢNH BÁO! RẤT ĐỘC VỚI ỐC

Hoạt chất:
Abamectin.....50g/lít
Phụ gia đặc biệt vừa đủ 1 lít

Hãng sản xuất:
Zhejiang Xianma Chemical Co., Ltd

Đặc tính - Công dụng:

- Daphamec 5.0EC chứa hoạt chất Abamectin có cơ chế tiếp xúc, nội hấp và lưu dẫn. Đặc trị nhiều loại sâu rầy như: Sâu cuốn lá, sâu xanh, bọ trĩ, sâu vẽ bùa, nhện đỏ, rầy xanh, rầy mềm, sâu đục thân, dòi đục quả, ốc bươu vàng, bọ phấn,... trên nhiều cây trồng khác nhau.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Sâu hại	Liều dùng
Dâu tây, dưa chuột, dưa hấu...	dòi đục lá, rầy mềm...	Pha 20-50ml/bình 25 lít Cây non, cây trồng trong nhà kính pha liều thấp (25ml/bình 25 lít).
Các loại hoa: Hoa cúc, hoa đồng tiền, hoa hồng.	Bọ phấn, bọ trĩ, dòi đục lá, rầy mềm...	
Rau họ thập tự: Bắp cải, súp lơ, su hào.	Bọ phấn, rầy mềm, sâu ăn lá...	
Táo	Nhện đỏ, nhện trắng, sâu đục thân...	
Thông, tùng	Bọ róm	
Lúa	Bọ trĩ, ốc bươu vàng	Pha 20-50ml/bình 25 lít
Chè (trà)	Rầy xanh	

Lưu ý:

- Thời gian cách ly: 7 ngày
- Không phun thuốc khi có gió lớn hoặc trời sắp mưa to.
- Phun thuốc ướt đều lá khi sâu mới nở, sâu còn nhỏ (tuổi 1 - 2), đối với cây non (cây còn nhỏ), cây trong nhà kính, giảm thuốc khi pha cho thích hợp.

KAJIO 5EC - Hoạt chất: Emamectin benzoate 50g/lít

KAJIO 5EC

G9-THÁNH SÂU

Emamectin 60

KAJIO 5WG - Hoạt chất: Emamectin benzoate 50g/kg

KAJIO 5.0WG

G9-THÁNH SÂU

Emamectin 60

DIỆT SẠCH SÂU, RẦY, RỆP - BẢO VỆ CÂY TRỒNG

Hãng sản xuất: Ace Bioscience Pte Ltd (Singapore).

Đặc tính - Công dụng:

- Kajio 5EC, Kajio 5WG là thuốc trừ sâu thế hệ mới có nguồn gốc thiên nhiên, diệt trừ hữu hiệu nhiều loại sâu đã kháng các nhóm thuốc khác. Hoạt chất Emamectin benzoate có phổ tác động rộng, thấm thấu mạnh vào mô lá, ít chịu tác động của thời tiết nên côn trùng bị trúng độc rất nhanh.
- Kajio 5EC, Kajio 5WG thân thiện với môi trường, phù hợp với chương trình rau an toàn. Kajio 5EC, Kajio 5WG đặc trị bọ phấn, rầy mềm, rầy xanh, sâu tơ, sâu xanh, bọ cánh tơ, sâu phao đục bẹ...

Hướng dẫn sử dụng Kajio 5EC:

Cây trồng	Sâu hại	Liều dùng
Lúa	Muỗi hành, sâu đục bẹ, cuốn lá, đục thân, nhện gié	Sử dụng 0,2 lít/ha. Pha từ 5 - 15ml/ bình 20 - 25 lít nước. Phun khi sâu 1-2 tuổi.
Rau màu	Sâu tơ, sâu xám, bọ nhảy...	
Cam, bưởi, phật thủ	Nhện đỏ, nhện trắng, bọ trĩ...	
Cà phê	Rệp sáp, mọt đục cành...	
Chè (trà)	Rầy xanh, bọ cánh tơ (bọ trĩ)...	
Xoài, cây ăn trái...	Bọ cánh tơ (bọ trĩ), nhện đỏ, rầy bông, rệp sáp...	

Lưu ý:

- Thời gian cách ly: 7 ngày sau khi phun.
- Không phun thuốc khi có gió lớn hoặc trời sắp mưa to.
- Lượng nước phun 400 - 800 lít/ha, khi cây còn non, cây trong nhà kính cần giảm lượng thuốc cho thích hợp.

Hướng dẫn sử dụng Kajio 5WG:

Cây trồng	Sâu hại	Liều dùng
Chè, xoài, cà phê, sầu riêng...	Bọ cánh tơ (bọ trĩ), rầy xanh, rệp sáp, mọt đục cành...	Pha 15-20g/ bình 16-18 lít. Phun ướt đẫm cây chè từ gốc tới ngọn.
Lúa	Muỗi hành, sâu đục bẹ, sâu cuốn lá, sâu đục thân, nhện gié...	120 - 200g/ha. Pha 15-20g/bình 16-18 lít.
Bắp, cây ăn trái, rau màu...	Sâu xanh, sâu tơ, bọ nhảy, bọ trĩ, sâu keo, sâu xám, rệp sáp...	

Lưu ý:

- Thời gian cách ly: 7 ngày sau khi phun.
- Không phun thuốc khi có gió lớn hoặc trời sắp mưa to.
- Lượng nước phun 400 - 800 lít/ha, khi cây còn non, cây trong nhà kính cần giảm lượng thuốc cho thích hợp.

THUỐC TRỪ SÂU KAJIO 1GR

KAJIO 1GR ALPHA

KAJIO 1GR GOLD

Hoạt chất: Avermectin B1a 90% + Avermectin B1b 10% (Emamectin benzoate) : 1g/kg

Hãng sản xuất: Ace Bioscience Pte Ltd (Singapore)

Đặc tính - Công dụng:

- Kajio 1GR chứa hoạt chất Avermectin B1a 90% + Avermectin B1b 10% (Emamectin benzoate) là chất trừ sâu sinh học được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp, thuốc có nguồn gốc từ vi sinh vật, phổ tác dụng rộng, diệt được rất nhiều côn trùng miệng nhai và chích hút.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Sâu hại	Liều dùng
Lúa, mía, ngô, khoai lang, khoai môn, khoai tây, hành, lạc, cà phê, hồ tiêu, rau ăn lá, hoa ly, hoa cúc, hoa hồng, cam, củ cải trắng, cà chua, cà rốt, thanh long, sầu riêng, xoài,...	Tuyến trùng (u cục rễ), sâu đục thân, sâu cuốn lá, sùng khoai, sùng đất, ve sầu, siêu nhân, sâu đất, sâu xám, bọ trĩ (bù lạch), bọ nhảy, muỗi hành (sâu năng),...	10 - 20 kg/ha (10.000m^2). Cách dùng: Rải gốc khi sâu mới chớm xuất hiện. Có thể tăng liều khi sâu, sùng nhiều.

Lưu ý:

- Với ruộng lúa: Cần giữ nước trong ruộng từ 7 - 10 ngày để thuốc phát huy hiệu quả sau khi rải.
- Các cây trồng khác: Sau khi rải, tưới nước gốc cây để thuốc đạt hiệu quả tốt.

Thời gian cách ly: 7 ngày sau khi sử dụng.

THUỐC TRỪ SÂU LEDAN 4GR

Hiệu **PANDA 4GR**

Hiệu **GÀ ĐÁ 4GR**

Hoạt chất: Cartap Hydrochloride 4% w/w + Phụ gia đặc biệt 96% w/w

Hãng sản xuất: Wu Zin Pesticide Factory

MỚI NHẤT - MẠNH NHẤT

DIỆT SÂU ĐỤC THÂN, CUỐN LÁ, SÂU, SÙNG, TUYẾN T

Đặc tính - Công dụng:

- Cartap Hydrochloride là hoạt chất thuộc nhóm Carbamate, có hiệu quả cao trong việc kiểm soát các loại sâu hại. Thuốc có tác động phổ rộng với cơ chế tác động vị độc và tiếp xúc, lưu dẫn. Cartap Hydrochloride hoạt động bằng cách gây tê liệt hệ thần kinh của côn trùng, khiến chúng ngừng ăn và chết. Nhờ vậy, Cartap Hydrochloride mang lại hiệu quả diệt trừ cao và lâu dài.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Sâu hại	Liều lượng
Lúa	Sâu đục thân, cuốn lá, bọ trĩ, rầy nâu	Liều lượng: 15 - 20kg/ha Thời điểm: Rải thuốc trên mặt ruộng khi thấy bướm xuất hiện rộ hoặc khi sâu rầy vừa xuất hiện.
Mía, ngô	Sâu đục thân	
Cà phê	Rệp sáp, rệp muội, sâu đục cành	
Thuốc lá	Rệp sáp	
Điều, hồ tiêu	Bọ xít muỗi	
Lạc, đậu, rau cải	Sâu khoang, sâu xanh	
Các loại hoa	Sâu đục hoa, sâu ăn lá	

Lưu ý:

- Sản phẩm dùng để rải diệt sâu bọ và côn trùng trong đất.
- Không sử dụng khi trời sắp mưa to hoặc khi có gió lớn.

Thời điểm: Sử dụng vào sáng sớm hoặc chiều để đạt hiệu quả cao nhất.

BASUZIN 1GB

ĐẶC TRỊ: CÁC LOẠI CÔN TRÙNG TRONG ĐẤT

TIẾP XÚC - VỊ ĐỘC - XÔNG HƠI

Hoạt chất:
Propoxur.....1% w/w
Phụ gia đặc biệt....99% w/w
Hãng sản xuất: Trustchem Co., Ltd

Đặc tính - Công dụng:

Basuzin 1GB là thuốc diệt côn trùng có cơ chế tiếp xúc, vị độc và xông hơi, chuyên dùng trừ các loại sâu, sùng, tuyến trùng gây hại trong đất.

RONG ĐẤT

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Sinh vật hại	Liều lượng
Lúa	Sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ xít muỗi, sâu phao...	Sử dụng 15 - 20 kg/ha.
Ngô (bắp), khoai lang	Sâu keo, sâu đục thân, bọ hà, sùng	
Cam, xoài, nhãn	Sâu đất, sùng đất	
Cà phê, hồ tiêu	Rệp sáp, bọ xít muỗi, mọt, mối	
Cà chua, dưa leo, đậu, bắp cải, hành...	Bọ nhảy, sùng đất, tuyến trùng, sâu đất...	

Lưu ý:

- Sản phẩm dùng để rải diệt sâu bọ và côn trùng trong đất.
- Không sử dụng khi trời sắp mưa to hoặc khi có gió lớn.
- Thời điểm: Sử dụng vào sáng sớm hoặc chiều để đạt hiệu quả cao nhất.



MIRIPHOS 1GB

ĐẶC TRỊ: CÁC LOẠI CÔN TRÙNG TRONG ĐẤT

XÔNG HƠI CỰC MẠNH

Công nghệ: ẤN ĐỘ

Hoạt chất:
Pirimiphos methyl...1% w/w
Phụ gia đặc biệt.....99% w/w

Hãng sản xuất: Trustchem Co., Ltd

Đặc tính - Công dụng:

Miriphos 1GB chứa hoạt chất Pirimiphos methyl có tác dụng kiểm soát côn trùng bằng cách ức chế enzyme acetylcholinesterase, làm gián đoạn hệ thần kinh của chúng.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Sinh vật hại	Liều lượng
Lúa	Sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ xít muỗi, sâu phao...	Sử dụng 10 - 15 kg/ha.
Ngô (bắp), khoai lang	Sâu keo, sâu đục thân, bọ hà, sùng	
Cam, xoài, nhãn	Sâu đất, sùng đất	
Cà phê, hồ tiêu	Rệp sáp, bọ xít muỗi, mọt, mối	
Cà chua, dưa leo, đậu, bắp cải, hành...	Bọ nhảy, sùng đất, tuyến trùng, sâu đất...	

Lưu ý:

- Sản phẩm dùng để rải diệt sâu bọ và côn trùng trong đất.
- Không sử dụng khi trời sắp mưa to hoặc khi có gió lớn.
- Thời điểm: Sử dụng vào sáng sớm hoặc chiều để đạt hiệu quả cao nhất.



CHLORFENA 240SC

SÂU CUỐN LÁ, SÂU ĐỤC THÂN, RẦY XANH,
RỆP SÁP, BỌ CÁCH TƠ (BỌ TRĨ), NHỆN, SÙNG KHOAI,...

Chim sâu

Hoạt chất:
Chlorfenapyr: 240g/lít
Phụ gia đặc biệt 760g/lít

Hãng sản xuất:
Shanghai E-Tong Chemical Co., Ltd

Đặc tính - Công dụng:

- Chlorfena 240SC là thuốc trừ sâu thế hệ mới, với hoạt chất Chlorfenapyr có cơ chế vị độc, thấm sâu nhanh, hoạt chất ức chế thần kinh làm cho côn trùng ngạt, ngừng thở và chết nhanh. Đặc trị được các loại côn trùng và sâu rầy gây hại.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Đối tượng	Liều dùng
Lúa	Nhện gié, sâu cuốn lá, rầy lưng trắng, sâu đục thân, rầy nâu, sâu năn, sâu đục bẹ, bọ trĩ	Liều lượng: Pha 25 - 30ml thuốc với 18 -25 lít nước để phun xịt.
Đậu tương	Sâu xanh da láng, sâu khoang	
Điều	Bọ trĩ	
Lạc	Sâu cuốn lá, sâu xanh da láng	
Ngô	Sâu keo mùa thu	

Lưu ý: Không phun khi trời sắp mưa to hoặc khi có gió lớn.

Ohayo 240sc

SIÊU DIỆT SÂU CUỐN LÁ, ĐỤC THÂN, RẦY XANH, BỌ CÁNH TƠ (BỌ TRĨ), NHỆN, RỆP SÁP...

Hoạt chất:
Chlorfenapyr: 24%w/v
Phụ gia đặc biệt 76%w/v

Hãng sản xuất:
Shanghai E-Tong Chemical Co., LTD

Đặc tính - Công dụng:

- Chlorfenapyr là hoạt chất thế hệ mới vị độc, tiếp xúc mạnh, thấm sâu nhanh, hoạt chất ức chế thần kinh làm cho côn trùng ngạt, ngừng thở và chết nhanh.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Đối tượng	Liều dùng
Lúa	Nhện gié, sâu cuốn lá, rầy lưng trắng, sâu đục thân, rầy nâu, sâu năn, sâu đục bẹ, bọ trĩ	Liều lượng: Pha 25 - 30ml thuốc với 18 -25 lít nước để phun xịt.
Đậu tương	Sâu xanh da láng, sâu khoang	
Chè, điều	Bọ trĩ	
Lạc	Sâu cuốn lá, sâu xanh da láng	
Ngô	Sâu keo mùa thu	
Rau màu	Sâu tơ, sâu xanh	

Lưu ý: Không phun khi trời sắp mưa to hoặc khi có gió lớn.

THUỐC TRỪ SÂU IGRO 240SC XPRO

Hiệu

HOÀNG TỬ SÂU ®

CHUYÊN DÙNG CHO TRÀ, CHÈ

DIỆT SẠCH 99.99%

Hoạt chất:
Chlorfenapyr.....240g/lít
Phụ biệtvừa đủ.....1 lít

Hãng sản xuất:
Jiangsu Flag Chemical Industry Co., Ltd.

Đặc tính - Công dụng:

- Thuốc Igro 240SC Xpro với hoạt chất Chlorfenapyr là thuốc trừ sâu phổ rộng,chuyên dùng để tiêu diệt nhiều loại côn trùng gây hại như sâu, bọ cánh tơ, nhện đỏ… bằng cách tác động lên hệ thần kinh và quá trình trao đổi năng lượng của chúng, khiến côn trùng ngừng ăn và chết.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Đối tượng	Cách dùng
Trà, chè	Bọ cánh tơ (bọ trĩ đen, bọ trĩ vàng), rầy xanh, nhện đỏ, bọ phấn, rầy mềm	Liều lượng: Pha 25-30 ml cho bình 18-25 lít nước để phun xịt Lượng nước phun:400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non tuổi nhỏ (tuổi 1-2), mật độ khoảng 1 con/cây.
Ngô	Sâu keo mùa thu	

Lưu ý:

- Không phun khi trời sắp mưa to hoặc khi có gió lớn.
- Thời gian cách ly 14 ngày.

THUỐC TRỪ SÂU BN-FOSTHI 10GR

Hiệu

SURIA 10GR

Đặc trị:
- Tuyến trùng
- Sâu hại trong đất

Hoạt chất:
Fosthiazate.....10% w/w
Special additives...90% w/w

Hãng sản xuất:
Hailir Pesticide and Chemicals Group Co., Ltd.

Đặc tính - Công dụng:

- Hoạt chất Fosthiazate thuộc nhóm lân hữu cơ, ức chế men cholinesterase, tác động trực tiếp qua tiếp xúc, xông hơi và nội hấp, sản phẩm có khả năng diệt trừ tuyến trùng và sâu hại trong đất lẫn rễ cây, hiệu lực kéo dài.
- Sản phẩm là giải pháp toàn diện trong việc quản lý tuyến trùng, sâu đất, ve sầu, sùng... với tác động tiêu diệt trực tiếp hoặc gây bất hoạt tuyến trùng, giúp hiệu quả phòng trừ ở mọi giai đoạn phát triển, từ trứng đến lúc trưởng thành.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng		
Cà phê, hồ tiêu	Tuyến trùng, ve sầu, sâu đất, rệp sáp, bọ xít muỗi, mọt, mối...	Sử dụng 15 kg/ha. Lượng nước 3 - 5 lít/cây.
Ngô (bắp), khoai lang	Sâu keo, sâu đục thân, bọ hà	Sử dụng 10 - 15 kg/ha.
Cam, xoài, nhãn	Sâu đất, sùng đất	
Cà chua, dưa leo, đậu, bắp cải, hành...	Bọ nhảy, sùng đất, tuyến trùng, sâu đất...	

Lưu ý:
- Nên rải thuốc xung quanh gốc cây vào đầu mùa mưa khi tuyến trùng bắt đầu phát triển mạnh.
- Thời điểm: Sử dụng vào sáng sớm hoặc chiều để đạt hiệu quả cao nhất.
- Thời gian cách ly: 17 ngày.

SINAPY RAM 80WG

THẾ HỆ MỚI

Hoạt chất:
Nitenpyram.....20% w/w
Pymetrozine.....60% w/w
Phụ gia đặc biệt 20% w/w

DIỆT RẦY RỆP TỨC KHẮC
LƯU DẪN KÉO DÀI - KHÔNG NÓNG CÂY

Đặc tính - Công dụng:

- Sinapyram 80WG là thuốc trừ rầy thế hệ mới chứa hai hoạt chất tiên tiến Nitenpyram và Pymetrozine, có tính nội hấp, lưu dẫn mạnh và hiệu lực kéo dài. Thuốc được đăng ký để phòng trừ rầy (cả rầy cám và rầy trưởng thành)

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Đối tượng	Liều dùng
Lúa	Rầy nâu	Pha 20-25g/25 lít nước Phun thuốc khi rầy mới xuất hiện tuổi 1-2

Lưu ý:

- Không phun khi trời sắp mưa to hoặc khi có gió lớn.
- Thời gian cách ly: 7 ngày

SIÊU DIỆT SÂU

Đặc trị: sâu tơ, sâu xanh, sâu vẽ bùa, sâu khoang, rệp sáp, bọ nhảy

Hoạt chất:

Spirotetramat.....10%w/w
Tolfenpyrad.....8%w/w SC
Phụ gia vừa đủ 1 lít

Hãng sản xuất:

Liuzhou Huinong Chemicals Co., Ltd.

Đặc tính - Công dụng:

- Tamatra S 18SC kết hợp hai hoạt chất Spirotetramat và Tolfenpyrad giúp trừ hiệu quả nhiều loại sâu rầy trên cây trồng. Spirotetramat thấm sâu và chạy khắp cây, diệt rầy, rệp, bọ phấn từ trong ra ngoài. Tolfenpyrad giúp hạ nhanh sâu ăn lá, bọ trĩ, và các đối tượng khó trị. Hai hoạt chất hỗ trợ nhau, cho hiệu lực mạnh, kéo dài, giúp cây sạch sâu

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Dịch hại	Liều lượng
Lúa	Sâu cuốn lá nhỏ, bọ trĩ	Pha 30ml cho bình16 - 25 lít
Rau cải	Rầy xanh, bọ trĩ	
Chè	Rệp sáp, bọ cánh tơ, rầy xanh	
Cà chua	Sâu đục quả, bọ phấn	
Bắp cải	Sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang	
Cam	Sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh	

Lưu ý:

- Luân phiên với các loại thuốc trừ sâu khác để sâu không kháng thuốc.
- Không phun khi có gió lớn hoặc sắp có mưa khoảng 1 giờ
- Thời gian cách ly: 7 ngày

ĐẶC TRỊ SÂU KHÁNG THUỐC

Em Oil®99EC Spray

ĐẶC TRỊ NHỆN ĐỎ HẠI CHÈ (TRÀ), CÂY CÓ MÚI VÀ NHỆN LÔNG NHUNG GÂY BỆNH CHỔI RỒNG TRÊN NHÃN SÂU HỒNG ĐỤC QUẢ BƯỞI, HOA MAI

Mới

Hoạt chất:
Petroleum oil.....99% w/w

Hãng sản xuất:
Shandong Lukang Biological Pesticides Co., Ltd.

Đặc tính - Công dụng:

- Thuốc trừ sâu Em Oil 99EC với hoạt chất Petroleum oil là chế phẩm đặc trị hiệu quả đối với nhện đỏ. Thuốc hoạt động theo cơ chế bám phủ cơ thể sinh vật gây hại, làm nghẹt lỗ thở khiến côn trùng và nhện không thể hô hấp, từ đó bị tiêu diệt nhanh chóng.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Đối tượng	Liều dùng
Hoa mai	Nhện đỏ	Pha 100ml/20 lít nước Phun vào chiều mát

Lưu ý:

- Thuốc trừ nhện, không xịt khi trời nắng nóng.
- Không xịt khi cây có hoa, trái non, lộc non (lá non).
- Nên xịt sau khi thu hoạch trái cây, cắt tỉa cành, dọn vườn.
- Thời gian cách ly: 7 ngày

THUỐC TRỪ SÂU ZIGEN 15SC

Zigen®

hay thế FIPRONIL MỚI

Hoạt chất:
Tolfenpyrad.....15% w/w

Hãng sản xuất:
Liuzhvou Huinong Chemical Co., Ltd.

ĐẶC TRỊ: RẦY, BỌ TRĨ (BỌ CÁNH TƠ, BÙ LẠCH), BỌ PHẤN TRẮNG, SÂU TƠ, SÂU CUỐN LÁ, RẦY XANH, SÂU HÀNH, SÂU ĐỤC QUẢ, SÂU ĐỤC THÂN, SÂU VẼ BÙA, DÒI ĐỤC LÁ, NHỆN ĐỎ, BỌ XÍT MUỖI, RỆP, RUỒI VÀNG...

Đặc tính - Công dụng:

- Zigen 15SC là thuốc trừ sâu tổng hợp, chứa hoạt chất trừ sâu gốc Pyrazole thế hệ mới nhất, phát minh từ Nhật Bản, diệt trừ sâu bọ tổng hợp phổ rộng. Thuốc có cơ chế tiếp xúc, vị độc, hiệu lực nhanh, mạnh ngay cả với côn trùng đã kháng các

Hướng dẫn sử dụng:

Đối tượng	Liều dùng
Rầy nâu, bọ trĩ (bọ cánh tơ, bù lạch), bọ phấn trắng, sâu tơ, sâu cuốn lá, rầy xanh, sâu hành, sâu đục quả, sâu đục thân, sâu vẽ bùa, dòi đục lá, nhện đỏ, bọ xít muỗi, rệp, ruồi vàng...	Pha 24 - 30ml/ 20 lít nước.

Lưu ý:
- Không phun khi trời sắp mưa to hoặc khi có gió lớn.
- Thời gian cách ly: 7 ngày

ZIGEN® 15SC A3

ZIGEN 15SC Xpro THÁNH SÂU®

ZIGEN SUPER 15SC GIÁO SƯ TRÍ®

Thành phần: Tolfenpyrad.....15% w/w
Hãng sản xuất: Liuzhvou Huinong Chemical Co., Ltd.

Dạng SC Mát Cây - Xanh Lá

Đặc tính - Công dụng:

- Zigen 15SC là thuốc trừ sâu tổng hợp, chứa hoạt chất trừ sâu gốc Pyrazole thế hệ mới nhất, phát minh từ Nhật Bản, diệt trừ sâu bọ tổng hợp phổ rộng. Thuốc có cơ chế tiếp xúc, vị độc, hiệu lực nhanh, mạnh ngay cả với côn trùng đã kháng các

Hướng dẫn sử dụng:

Đối tượng	Liều dùng
Rầy nâu, bọ trĩ (bọ cánh tơ, bù lạch), bọ phấn trắng, sâu tơ, sâu cuốn lá, rầy xanh, sâu hành, sâu đục quả, sâu đục thân, sâu vẽ bùa, dòi đục lá, nhện đỏ, bọ xít muỗi, rệp, ruồi vàng...	Pha 24 - 30ml/ 20 lít nước.

Lưu ý:

- Không phun khi trời sắp mưa to hoặc khi có gió lớn.
- Thời gian cách ly: 7 ngày

SHA CHONG JING 95WP

Hiệu

Panda Nhật

Hoạt chất:
Thiosultap-sodium
(Nereistoxin) (Monosultap) 95%w/w
Special Additives ... 5% w/w

Hãng sản xuất:
Liyang Lihua Chemical Co., Ltd.

PREMIUM QUALITY
DIỆT SẠCH 100%
GUARANTEED

Đặc tính - Công dụng:

- Thiosultap-Sodium có tác dụng tiếp xúc vị độc, cản trở hoạt động của cơ quan cảm nhận trong tế bào thần kinh côn trùng.
- Thuốc có phổ tác động rộng diệt cả trứng sâu, trừ được nhiều loại sâu rầy chích hút và miệng nhai.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Sâu hại	Liều dùng
Lúa, ngô (bắp), mía, lạc, đậu tương, điều, cà phê...	Sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ trĩ (bù lạch), sâu năng (muỗi hành), rệp sáp, bọ xít muỗi, sâu khoang, rầy nâu, sâu đục bẹ...	- Sử dụng 0.45 - 0.6kg với 400 - 600 lít/ha. - Pha 10 - 14 g thuốc/bình 10 lít nước. - Phun 1.5 bình cho 1 sào Bắc Bộ (360 m^2). - Phun 3 bình cho 1 sào Trung Bộ (500 m^2). - Phun 6 bình cho 1 công Nam Bộ (1.000 m^2).
Hoa hồng	Sâu đục nụ	

Lưu ý:

- Lượng nước phun từ 500 - 600lít/ha.
- Không phun thuốc khi có gió lớn hoặc trời sắp mưa to.
- Không phun thuốc cho cây dâu nuôi tằm.
- Không phun thuốc khi cây có hoa hoặc lá còn ướt hoặc có sương.
- Có thể trộn chung với các loại thuốc BVTV khác, trừ thuốc có tính kiềm, pha xong phải phun ngay.
- Thời gian cách ly: 14 ngày.

THUỐC TRỪ SÂU LEDAN 95SP

Hiệu **PANDA JAPAN**

Hiệu **Panda Nhật**

Hoạt chất: Cartap Hydrochloride 95% w/w + Phụ gia đặc biệt 5% w/w
Hãng sản xuất: Wu Zin Pesticide Factory

MỚI NHẤT - MẠNH NHẤT
CÔNG PHÁ RẦY - SẠCH SÂU KHÁNG

Đặc tính - Công dụng:

- Cartap Hydrochloride là hoạt chất thuộc nhóm Carbamate, có hiệu quả cao trong việc kiểm soát các loại sâu hại. Thuốc có tác động phổ rộng với cơ chế tác động vị độc và tiếp xúc. Cartap Hydrochloride hoạt động bằng cách gây tê liệt hệ thần kinh của côn trùng, khiến chúng ngừng ăn và chết. Nhờ vậy, Cartap Hydrochloride mang lại hiệu quả diệt trừ cao và lâu dài.

Cây trồng	Sâu hại	Liều lượng
Lúa	Sâu đục thân, cuốn lá, bọ trĩ, rầy nâu	Liều lượng: 0.6 - 0.8 kg/ha Lượng nước: 400 - 500 lít/ha. Thời điểm: Phun khi lúa đẻ nhánh 5-7 ngày sau cao điểm bướm rộ, phun thời điểm đòng già hay thấp thó trỗ.
Mía, ngô	Sâu đục thân	
Cà phê	Rệp sáp, rệp muội, sâu đục cành	
Thuốc lá	Rệp sáp	
Điều, hồ tiêu	Bọ xít muỗi	
Lạc, đậu, rau cải	Sâu khoang, sâu xanh	
Các loại hoa	Sâu đục hoa, sâu ăn lá	

Lưu ý:

- Không phun thuốc khi có gió lớn hoặc trời sắp mưa to.
- Thời gian cách ly: 14 ngày sau khi phun.

THUỐC TRỪ SÂU

Ohayo 100SC

CHẾT KHÔ SÂU HẠI

Hoạt chất:
Chlorfenapyr.....100g/lít
Phụ gia đặc biệt ...900g/lít

Hãng sản xuất:
Fertiagro Pte., Ltd (Singapore)

Đặc tính - Công dụng:

- Ohayo 100SC là thuốc trừ sâu thế hệ mới, nhóm pyrazole, an toàn cho cây trồng, hiệu quả kéo dài.
- Ohayo 100SC diệt trừ các loại sâu, và nhện hại đã kháng các loại thuốc khác.
- Ohayo 100SC đặc trị bọ trĩ trên chè (trà), dưa, hoa, nhện trắng trên cây có múi, hoa, sâu tơ, sâu xanh da láng trên rau...

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Sâu hại	Liều dùng
Bầu bí, chè, dưa các loại	**Bọ trĩ, nhện trắng** Bọ trĩ, nhện trắng	Pha 15-20ml/bình 16- 18 lít Phun vào mặt sau của lá, nơi nhện đỏ trú ngụ.
Hoa các loại		
Rau các loại	Sâu xanh, sâu tơ	Pha 15-20ml/bình 16-18 lít Phun ướt đẫm cây trồng.
Lúa	Sâu cuốn lá	Pha 15-20ml/bình 16-18 lít.

Lưu ý:

- Lượng nước phun: 400 - 500 lít/ha.
- Thời gian cách ly: 14 ngày sau khi phun.
- Không phun thuốc khi có gió lớn hoặc trời sắp mưa to.
- Phun thuốc khi sâu mới nở, sâu còn nhỏ (tuổi 1 - 2).



THUỐC TRỪ SÂU TOMI 5EC

Hiệu

LUFENURON 5EC

Sản phẩm sinh học
Thân thiện và ít độc với môi trường

PHÒNG TRỊ: SÂU CUỐN LÁ HẠI LÚA, SÂU XANH DA LÁNG HẠI ĐẬU XANH, THUỐC LÁ; SÂU ĐỤC QUẢ HẠI ĐẬU TƯƠNG; SÂU VẼ BÙA HẠI CAM; SÂU TƠ HẠI BẮP CẢI...

Hoạt chất: Lufenuron.....5%w/w
Special additives...95%w/w

Hãng sản xuất:
Henan Vision Agricultural Science And Technology Co., Ltd.

Đặc tính - Công dụng:

LUFENURON 5EC là thuốc trừ sâu thế hệ mới, có tác động vị độc. Phổ tác dụng rộng, có tác dụng điều tiết sinh trưởng côn trùng, ức chế tổng hợp chất Kitin làm ấu trùng sâu không lột xác được và chết. Hiệu quả diệt sâu triệt để.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Sâu hại	Liều dùng
Cam, chanh, quýt, bưởi...	Sâu vẽ bùa	0.6 lít/ha. Lượng nước 500-600 lít/ha Phun khi sâu mới xuất hiện (tuổi 1 - 2), mật độ khoảng 3 - 5 con/cây.
Đậu tương (đậu phộng)	Sâu đục quả, sâu xanh	
Đậu xanh	Sâu khoang, sâu xanh da láng	
Thuốc lá	Sâu xanh da láng	
Lúa	Sâu cuốn lá	
Bắp cải	Sâu tơ, sâu xanh	
Ngô (bắp)	Sâu keo mùa thu	

Lưu ý:

- Đối với cây ăn trái (cam) có thể sử dụng 50 - 80ml thuốc/100 lít. Phun ướt đều cây trồng. Phun khi mới xuất hiện đọt, lá non.
- Thời gian cách ly: 7 ngày sau khi phun.

Takiwa 22SC

MẠNH MẼ NHƯ TÊN LỬA ĐỨC

Đặc trị: Sâu khoang, Sâu tơ,
Sâu cuốn lá, Sâu đục trái, Sâu xanh.

Hoạt chất:
Metaflumizone 22%w/w (240g/L)
Phụ gia và dung môi đủ 1 Lít

Hãng sản xuất:
Shandong United Pesticide Industry Co., Ltd.

Đặc tính - Công dụng:

Hoạt chất Metaflumizone là thuốc trừ sâu tác động trong hệ thần kinh côn trùng, khiến côn trùng bị liệt, ngừng ăn, và chết dần sau khi ăn phải thuốc. Hiệu quả cao với sâu tơ, sâu xanh, sâu cuốn lá, sâu khoang...

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Sâu hại	Liều lượng
Bắp cải	Sâu tơ, sâu xanh	0.8 lít/ha. Pha từ 24 - 30ml/ bình 20 lít nước.
Hành	Sâu khoang	
Cà chua	Sâu đục quả, sâu xanh	
Đậu tương (đậu nành)	Sâu xanh da láng, nhện đỏ	
Lúa	Sâu cuốn lá	

Lưu ý: Lắc kỹ chai thuốc trước khi sử dụng

Đi chậm, phun đủ lượng nước khuyến cáo.
Không phun khi trời sắp mưa to hoặc khi có gió lớn.
Thời điểm: Phun vào sáng sớm hoặc chiều mát.
Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha, phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ (tuổi 1 - 2) mới xuất hiện gây hại, mật độ khoảng 1 - 5 con/cây.
Thời gian cách ly: 7 ngày sau khi phun.

LEKIMA 100EC

- TIẾP XÚC
- VỊ ĐỘC
- THẤM SÂU

Hoạt chất:
Pyriproxyfen.....100g/L
Special additives...900g/L

Hãng sản xuất:
Shanghai Shengnong Pesticide Co., Ltd.

Đặc tính - Công dụng:

Pyriproxyfen là một loại chất thế hệ mới, có cơ chế gây ức chế quá trình tổng hợp hóc môn của côn trùng, làm cho côn trùng không thể lột xác được, và mất khả năng sinh sản, đặc biệt là giai đoạn ấu trùng và phân hoá. Nó ngăn chặn ấu trùng phát triển đến tuổi trưởng thành, do đó khiến chúng không thể sinh sản và chết đi, làm cho côn trùng mất khả năng đẻ trứng. Pyriproxyfen có hiệu quả rất cao trong phòng trừ: Bọ phấn trắng (rầy phấn), rệp vảy, rệp sáp, sâu vẽ bùa, bọ trĩ, rầy mềm,...

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Sâu hại	Liều dùng
Hoa hồng, rau cải	Bọ phấn, rầy mềm	0.6 lít/ha. Pha từ 25 - 30ml/ bình 20 lít nước.
Cà phê, roi (mận)	Rệp sáp, rệp vảy	
Cam, chanh, bưởi...	Sâu vẽ bùa	
Hồ tiêu, rau cải...	Tuyến trùng	

Lưu ý: Có thể kết hợp thuốc với các gốc lưu dẫn, hoặc xông hơi để nâng cao hiệu quả phòng trừ!

- Lượng nước phun: 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu bọ vừa mới xuất hiện, mật độ khoảng 3-5 con/cây.
- Thời gian cách ly: 7 ngày sau khi phun.

HIỆU QUẢ SAU 24h

BINHTOX 3.8EC GOLD

Đặc trị: Sâu - Rầy - Nhện

Hoạt chất:
Avermectin B1a, B1b (Abamectin) : 38g/lít
Hãng sản xuất:
Bailing Agrochemical Co., Ltd

Đặc tính - Công dụng:

- Hoạt chất Abamectin là thuốc tiếp xúc, nội hấp, lưu dẫn. Đặc trị nhiều loại sâu hại trên nhiều loại cây trồng khác nhau như: Sâu tơ, sâu hành, sâu vẽ bùa, bọ nhảy, sâu xám, sâu keo, bọ nhảy, rầy xanh, rầy phấn, rệp sáp, ốc bươu vàng...

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Sâu hại	Liều dùng
Bắp cải	Sâu tơ, bọ nhảy, sâu xám	Pha 25ml/bình 20 lít. Sâu hành: Pha 50-100ml cho bình 20 lít.
Đậu tương	Sâu đục quả	
Cải thìa	Sâu vẽ bùa, bọ nhảy, sâu tơ	
Bắp (ngô)	Sâu keo, sâu xám	
Lúa	Sâu cuốn lá, đục thân, nhện gié, bọ trĩ	
Hành	Sâu hành	

Lưu ý:

- Sâu cuốn lá: Phun thuốc khi thấy bướm rộ.
- Nhện gié: Phun khi nhện xuất hiện tuổi nhỏ.

Lượng nước: Phun từ 400 - 600 lít/ha.
Thời điểm: Phun khi sâu hại bắt đầu xuất hiện.
Thời gian cách ly: 7 ngày sau khi phun.

Rất độc với Ốc

THUỐC TRỪ SÂU FORTAC 5EC

Hiệu

FAPTANK®

ĐẶC TRỊ: BỌ XÍT, BỌ TRĨ, RỆP, SÂU KHOANG, SÂU CUỐN LÁ...

Hoạt chất:
Alpha-cypermethrin...5%w/w
Special additives.....95%w/w

Hãng sản xuất:
Forward International Ltd (India)

Đặc tính - Công dụng:

Hoạt chất Alpha-Cypermethrin được nhiều công ty đăng ký tên thương mại khác nhau ở Việt Nam dùng để trừ sâu đục thân, cuốn lá, bọ trĩ hại lúa, sâu (giòi) đục quả (đục cuống gây nên thối quả), rệp sáp, sùng khoai, sâu đo (sâu que), bọ xít, bọ nhảy hại vải thiều, nhãn, na, hồng, cam, quýt, rau màu và cây ăn quả.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Sâu hại	Liều dùng
Lúa	Sâu cuốn lá, đục thân, sâu phao, bọ trĩ, bọ xít, sâu keo, muỗi hành...	0.15 - 0.4 lít/ha. Pha 10ml cho bình từ 8 - 10 lít nước.
Cà phê, điều, hồ tiêu, cao su	Kiến, rệp sáp, mọt, bọ xít muỗi, mối, sâu đục quả, rệp muội...	
Lạc (đậu phộng), đậu xanh, khoai lang...	Sâu khoang, sâu xanh, sâu đục quả.	
Đậu tương (đậu nành), bông vải...	Sâu xanh, sâu khoang, sâu đục quả, rệp muội, sâu hồng...	

Lưu ý:

- Phun ướt đều tán lá cả 2 mặt trên và dưới, phun khi sâu còn non tuổi 1 - 2.
- Không phun khi trời sắp mưa to hoặc khi có gió lớn.
- Thời gian cách ly: 10 ngày sau khi phun.
- Lượng nước phun: 400 - 500 lít/ha.

Biperin 100EC

HÀM LƯỢNG CAO - ĐẬM ĐẶC

Hoạt chất:
Cypermethrin.....100g/lít
Phụ gia đặc biệt vừa đủ 1 lít

Hãng sản xuất:
Bioquest International (Ấn Độ)

Đặc tính - Công dụng:

- Biperin 100EC chứa hoạt chất Cypermethrin có cơ chế tiếp xúc, xông hơi, trừ sâu đục thân, sâu cuốn lá, bọ trĩ hại lúa, sâu (giòi) đục quả (đục cuống gây nên thối quả), sâu đo (sâu que), bọ xít, bọ nhảy hại vải thiều, nhãn, na, hồng, cam, quýt, rau màu và cây ăn quả.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Sâu hại	Liều dùng
Cây ăn trái: Cam, quýt, đào, lê, táo...	Rầy mềm, sâu vẽ bùa, sâu đục trái...	Pha 20-40ml/bình 20 lít
Cây dược liệu: Kỷ tử, sâm ngọc linh.	Sâu tơ	Pha 20-40ml/bình 20 lít
Cải các loại: Cải củ, cải dầu, cải thảo.	Sâu tơ	
Rau họ thập tự: Bắp cải, súp lơ, su hào...	Bọ hung, bọ rùa...	

Lưu ý:

- Thời gian cách ly: 14 ngày
- Không phun thuốc khi gió lớn hoặc trời sắp mưa. Lượng nước phun 500 lít/ha.
- Phun thuốc ướt đều lá khi sâu mới nở, sâu còn nhỏ (tuổi 1 - 2), đối với cây non (cây còn nhỏ), cây trồng nhà kính, giảm thuốc khi pha cho thích hợp.

KINH NGHIỆM PHỐI TRỘN CỦA NHÀ NÔNG:

Biperin 100EC + Tosi 30WG (Hoạt chất: Acetamiprid 30% w/w)

Cây trồng	Sâu hại	Liều dùng
Cây ăn trái	Bọ trĩ, rầy mềm (rệp muội), rầy xanh, sâu đục trái...	Biperin 20ml + Tosi 5 - 10g/bình 20 lít

Somethrin 10EC

CHUYÊN PHÁ TỔ SÂU

Hoạt chất:
Cypermethrin.....10%w/w
Phụ gia đặc biệt vừa đủ 1lít

Hãng sản xuất:
Jining City Yimin Chemical Plant

Đặc tính - Công dụng:

- Somethrin 10EC chứa hoạt chất Cypermethrin có cơ chế tiếp xúc, xông hơi, trừ sâu đục thân, sâu cuốn lá, bọ trĩ hại lúa, sâu (giòi) đục quả (đục cuống gây nên thối quả), sâu đo (sâu que), bọ xít, bọ nhảy hại vải thiều, nhãn, na, hồng, cam, quýt, rau màu và cây ăn quả.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Sâu hại	Liều dùng
Cây ăn trái: Cam, quýt, đào, lê, táo	Rầy mềm, sâu vẽ bùa, sâu đục trái	Pha 20-40ml /bình 20 lít
Cây dược liệu: Kỷ tử, sâm ngọc linh	Sâu tơ	Pha 20-40ml /bình 20 lít
Cải các loại: Cải củ, cải dầu, cải thảo		
Rau họ thập tự: Bắp cải, súp lơ, su hào	Bọ hung, bọ rùa	

Lưu ý: Thời gian cách ly 14 ngày .
- Không phun thuốc khi gió lớn hoặc trời sắp mưa. Lượng nước phun 320 lít/ha.
- Phun thuốc khi sâu mới nở, sâu còn nhỏ (tuổi 1-2), đối với cây non (cây còn nhỏ), cây trồng nhà kính, giảm thuốc khi pha cho thích hợp.

KINH NGHIỆM PHỐI TRỘN CỦA NHÀ NÔNG:

Somethrin 10EC + Tosi 30WG (Hoạt chất: Acetamiprid 30% w/w)

Cây trồng	Sâu hại	Liều dùng
Lúa, rau màu, cây ăn trái	Bọ trĩ, rầy mềm, rầy xanh, sâu đục trái...	Somethrin 20ml + Tosi 5-10g/bình 20 lít

BPALATOX 100EC

HÀM LƯỢNG CAO - ĐẬM ĐẶC

Made in India

Hoạt chất:
Alpha-cypermethrin...100g/lít
Phụ gia đặc biệt.....900g/lít

Hãng sản xuất:
Bioquest International (Ấn Độ)

Đặc tính - Công dụng:

- Bpalatox 100EC chứa hoạt chất Alpha-Cypermethrin là một pyrethroid tổng hợp mô phỏng các tính chất của pyrethrum, được chiết xuất tự nhiên từ hoa cúc.
- Hoạt chất Alpha-Cypermethrin có cơ chế xông hơi, tác động đến côn trùng thông qua cơ chế tiếp xúc trực tiếp, chất độc can thiệp vào các tế bào thần kinh của côn trùng, làm tê liệt và ngăn côn trùng thực hiện các chức năng bình thường như ăn, chạy, nhảy. Sau đó côn trùng chết do không thể tự ăn được.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Sâu hại	Liều dùng
Cây ăn trái, quả: Đào, hồng quả, táo...	Rầy mềm, sâu đục trái	Pha 20-40ml /bình 20 lít
Cây có múi: Bưởi, cam, chanh, quýt, tắc	Sâu vẽ bùa	
Cải thảo	Bướm trắng hai chấm, rệp muội	
Cây lương thực: Khoai lang, ngô	Sâu keo mùa thu	
Hoa các loại	Rệp muội	
Rau các loại: Rau diếp, xà lách...	Rầy mềm, rệp muội...	

Lưu ý:
- Thời gian cách ly: 14 ngày
- Không phun thuốc khi có gió lớn hoặc trời sắp mưa to.
- Lượng nước phun 400-500 lít/ha.
- Phun thuốc ướt đều lá khi sâu mới nở, sâu còn nhỏ (tuổi 1 - 2), đối với cây non (cây còn nhỏ), cây trồng nhà kính, giảm thuốc khi pha cho thích hợp.

THUỐC TRỪ SÂU CYMKILL 25EC

CYMKILL 25EC

CYMKILL 25EC

Hoạt chất: Cypermethrin 250g/lít + Phụ gia đặc biệt vừa đủ 1 lít
Hãng sản xuất: Forward International Ltd (Ấn Độ)

SIÊU DIỆT SÂU – RẦY – RỆP

Đặc tính – Công dụng:

- Sản phẩm chứa hoạt chất Cypermethrin có cơ chế xông hơi, tiếp xúc và vị độc, diệt trừ sâu đục thân, sâu cuốn lá, bọ trĩ hại lúa, sâu (giòi) đục quả (đục cuống gây nên thối quả), sâu đục (sâu que), bọ xít, bọ nhảy hại vải thiều, nhãn, na, hồng, cam, quýt, rau màu và cây ăn trái.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Sâu hại	Liều dùng
Bông vải	Sâu khoang	0.16 – 0.4 lít/ha. Cách pha: Pha từ 25 – 30ml/ bình 20 lít nước.
Lúa	Bọ trĩ, rầy nâu, sâu cuốn lá	
Đậu xanh	Sâu xanh, sâu khoang	
Rau cải	Bọ nhảy, sâu ăn lá, rầy mềm	
Khoai lang	Sùng (bọ hà)	
Cà phê	Rệp sáp, sâu đục cành	
Điều	Bọ xít muỗi	

Lưu ý: Thời gian cách ly 10 ngày.
- Lượng nước phun: Phun từ 300 – 500 lít/ha.
- Phun khi sâu, rầy vừa xuất hiện, nên phun lúc sáng sớm hoặc chiều mát để đạt hiệu quả cao nhất.
- Không phun thuốc khi có gió lớn hoặc trời sắp mưa to.

THUỐC TRỪ SÂU FULLKILL 50EC

FULLKILL 50EC | FULLKILL 50EC | Permethrin 500

Hoạt chất: Permethrin 500g/lít + Phụ gia đặc biệt vừa đủ 1 lít
Hãng sản xuất: Forward International Ltd (Ấn Độ)

SÂU GÌ CŨNG TIÊU!

Đặc tính – Công dụng:

- Hoạt chất Permethrin là thuốc trừ sâu có phổ tác dụng rộng, tiếp xúc, vị độc nên trừ được nhiều loại sâu rầy và côn trùng gây hại cho cây trồng: Sâu cuốn lá, bọ trĩ, sâu xanh, rầy nâu, bọ nhảy, sâu ăn lá, sùng (bọ hà), rệp sáp, sâu đục cành, bọ xít muỗi, sâu khoang…

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Sâu hại	Liều dùng
Bông vải	Sâu khoang	0.2 – 0.3 lít/ha. Pha từ 20 – 24 ml/bình 20 lít nước.
Lúa	Bọ trĩ, rầy nâu, sâu cuốn lá	
Đậu xanh	Sâu xanh, sâu khoang	
Rau cải	Bọ nhảy, sâu ăn lá, rầy mềm	
Khoai lang	Sùng (bọ hà)	
Cà phê	Rệp sáp, sâu đục cành	
Điều	Bọ xít muỗi	

Lưu ý: Thời gian cách ly 10 ngày.
Lượng nước phun: Phun từ 400 – 600 lít/ha.
Phun khi sâu, rầy vừa xuất hiện, nên phun lúc sáng sớm hoặc chiều mát để đạt hiệu quả cao nhất.
Không phun thuốc khi có gió lớn hoặc trời sắp mưa to.
Thuốc độc cao với cá, không sử dụng trong khu vực nuôi trồng thủy sản.

THUỐC TRỪ SÂU

Forgon 40EC

Kiếm sĩ ra tay, Chém bay sâu hại

Xông hơi cực mạnh

Hãng sản xuất:

Forward (Beihai) Hepu Pesticide Co., Ltd.

Hoạt chất: Dimethoate 400g/lít + Phụ gia đặc biệt 600g/lít

Đặc tính – Công dụng:

- Forgon 40EC chứa hoạt chất Dimethoate là thuốc trừ sâu thuộc nhóm lân hữu cơ, có cơ chế tác động xông hơi cực mạnh, tiếp xúc, vị độc, trừ sâu phổ rộng, trừ được nhiều loại sâu như: Sâu cuốn lá, sâu đục thân, sâu keo, ruồi vàng, bọ xít, muỗi hành, chuột, bọ phấn trắng, sâu xanh, sâu tơ, bọ nhảy, mọt đục cành, bọ hà, bọ xít muỗi, bọ hung… trên nhiều loại cây trồng khác nhau.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Sâu hại	Liều dùng
Cà phê, hồ tiêu	Rệp sáp, mọt đục cành	Pha 40 – 60ml /bình 20 lít (tưới dưới gốc 500–1000 lít/1000m^2)
Ngô, lúa	Sâu keo, sâu đục thân, bọ xít	
Mía, khoai lang	Bọ hung, bọ hà (sùng)	
Lạc, đậu tương	Sâu ăn lá, sâu khoang, dòi đục lá	
Điều, bông vải	Bọ xít muỗi, bọ trĩ	
Lúa, ngô	Sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ trĩ, bọ xít	
Cây ăn trái	Ruồi vàng	

Lưu ý:

- Thời gian cách ly: 14 ngày.
- Không phun thuốc khi có gió lớn hoặc trời sắp mưa.
- Không phun khi cây đang có hoa, trường hợp nhiều sâu cần phun lặp lại sau 5 – 7 ngày.
- Đối với cây nhạy cảm: dưa, bầu bí và cây ghép: nho ghép, xoài ghép, vải chín sớm, phun bằng máy áp lực cần giảm liều pha cho thích hợp.
- Phun thuốc ướt đều lá khi sâu mới nở, sâu còn nhỏ (tuổi 1 – 2), đối với cây con (cây còn nhỏ), cây trong nhà kính, giảm thuốc khi pha cho thích hợp.
- Lượng nước phun: 400 lít/ha.

KINH NGHIỆM PHỐI TRỘN CỦA NHÀ NÔNG:

1. Forgon + Bassa 50EC (Hoạt chất: Fenobucarb 50%)
2. Forgon + Hosu 10SC (Hoạt chất: Bifenthrin 10%)





Hiệu

JAPASA 50EC

Japan Style

Chết sạch rầy lớn, rầy nhỏ, ung trứng

Hoạt chất:
Fenobucarb 500g/L
Special additives 500g/L

Hãng sản xuất:
Forward International Ltd (Taiwan)

Đặc tính – Công dụng:

Sản phẩm chứa hoạt chất Fenobucarb tác động vào hệ thần kinh côn trùng thông qua tiếp xúc, xông hơi, vị độc gây ức chế hoạt động của enzyme dẫn đến tình trạng giật, tê liệt và chết. Sản phẩm chuyên dùng phòng trừ các loài chích hút, đặc biệt là các loại rầy, rệp, bọ trĩ, bọ xít…

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Sâu hại	Liều dùng
Lúa	Rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu keo…	0.8 – 1.0 lít/ha. Pha từ 40 – 60 ml/bình 16 – 20 lít nước
Bông vải, đậu tương, cà phê, thuốc lá	Rệp, bọ trĩ, rệp vảy…	
Hồ tiêu	Bọ xít, rệp sáp…	

Lưu ý:

- Lượng nước phun: 400 – 500 lít/ha.
- Phun khi rầy mới xuất hiện, tuổi nhỏ, mật độ rầy nhiều, lớn cần phun nhắc lại
- lần 2 sau 5 đến 7 ngày.
- Nên phun vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát để đạt hiệu quả cao nhất.
- Không phun khi trời sắp mưa to hoặc khi có gió lớn.
- Thời gian cách ly: 10 ngày sau khi phun.

THUỐC TRỪ SÂU

BINHFOS 50EC

VUA SÂU

VUA RỆP , SÂU, RẦY

ANH HÙNG SÂU

TRÙM SÂU

Hoạt chất: Profenofos.....500 g/lít + Phụ gia đặc biệt vừa đủ 1 lít

Hãng sản xuất: Bailing Agrochemical Co., Ltd

Đặc tính – Công dụng:

- Binhfos 50EC là thuốc trừ sâu thuộc nhóm lân hữu cơ, tác động xông hơi, tiếp xúc, vị độc. Thuốc diệt trừ nhóm sâu miệng nhai, gặm nhấm và chích hút.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Đối tượng gây hại	Liều dùng
Lúa	Muỗi hành (sâu năn), bọ trĩ (bù lạch), rầy nâu, sâu cuốn lá	- Pha 24 ml/bình 20 lít nước. - Với rệp sáp, sùng, ve sầu: Có thể pha, tưới gốc để diệt trừ hiệu quả hơn. - Lượng nước phun từ 400 – 600 lít/ha.
Điều, bơ, mía, ngô	Bọ xít muỗi, sâu đục cành, sâu đục thân, sâu róm (sâu lông)	
Cà phê	Mọt đục cành, kiến, rệp sáp, ve sầu	
Mãng cầu (na), đu đủ	Rệp sáp	
Khoai lang, đậu phộng	Sùng (bọ hà), siêu nhân, sâu ăn lá	
Sầu riêng, chè	Rệp sáp, rầy xanh, rầy phấn	
Cải thảo, củ cải	Sâu tơ, sâu bay, sâu khoang, rầy mềm, sâu khoang	
Thanh long	Bọ ngâu	
Cam, quýt, chanh	Nhện, sâu vẽ bùa, sâu ăn tạp, rầy xanh, rầy chổng cánh	
Ổi	Ruồi vàng, rệp sáp	

Lưu ý: Thời gian cách ly: 14 ngày sau khi phun.

- Không phun thuốc khi có gió lớn hoặc trời sắp mưa to.
- Phun thuốc vớt đều lá khi sâu mới nở, sâu còn nhỏ (tuổi 1 – 2), đối với cây non
- (cây còn nhỏ) giảm thuốc khi pha cho thích hợp.

THUỐC TRỪ SÂU FORSAN 60EC

FORSAN 60EC

XÔNG HƠI CỰC MẠNH

Xông hơi cực mạnh

Hiệu HORiSAN 75

ĐẶC TRỊ RẦY NÂU HẠI LÚA

Hoạt chất: Phenthoate (Dimethoate): 600 g/lít + Phụ gia đặc biệt: 400 g/lít
Hãng sản xuất: Forward (Beihai) Pesticide Preparations Co., Ltd

Đặc tính – Công dụng:

- Forsan 60EC chứa hoạt chất Phenthoate, thuộc nhóm lân hữu cơ, có cơ chế tác động xông hơi cực mạnh, tiếp xúc, vị độc trừ được nhiều loại sâu hại: sâu cuốn lá, sâu đục thân, sâu keo, ruồi vàng, bọ xít, muỗi hành, chuột, bọ phấn trắng, sâu xanh, sâu tơ, bọ nhảy…

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Sâu hại	Liều dùng
Lúa	Rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu đục thân, muỗi hành, bọ trĩ, bọ xít…	- Sử dụng 0.6 – 0.9 lít/ha. - Pha 20 – 40 ml/bình 20 lít nước. - Phun khi sâu rầy vừa mới xuất hiện.
Khoai lang	Sâu ăn lá, sùng (bọ hà)	
Cà phê	Rệp sáp, mọt đục cành	
Măng cầu, sầu riêng	Rệp sáp, ruồi vàng	
Ngô (bắp)	Rệp muội, bọ phấn, bọ nhảy, đục thân	

Lưu ý:
- Lượng nước phun: 300 – 500 lít/ha.
- Không phun khi có gió lớn hoặc trời sắp mưa to.
- Phun thuốc vớt đều khi sâu còn nhỏ (tuổi 1 – 2).
- Với cây non (cây nhỏ), cây trong nhà kính: giảm lượng thuốc khi pha cho thích hợp
- Thời gian cách ly: 10 ngày.

Rất độc với: CHUỘT, SÓC.

THUỐC TRỪ SÂU INMANDA 100WP

VUA IMIDA

PHƯỢNG HOÀNG LỬA

Institute from Japan (NHẬT BẢN)

Hoạt chất: Imidacloprid 100 g/kg + Phụ gia đặc biệt vừa đủ 1 kg
Hãng sản xuất: Shenzhen Dehao Pesticides Co., Ltd

Đặc tính – Công dụng:

- Hoạt chất Imidacloprid là hoạt chất có cơ chế lưu dẫn, thấm sâu nhanh vào cây trồng; tiêu diệt các loài chích hút gây hại. Imidacloprid được nhiều công ty đăng ký phòng trừ các đối tượng: bọ nhảy, rệp sáp, bọ phấn, bọ trĩ (bọ cánh tơ), bọ xít, rầy nâu, rầy xanh, rầy mềm, bọ ngâu,…

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Sâu hại	Liều dùng
Lúa	Rầy nâu, nhện gié, bọ trĩ, sâu cuốn lá...	Liều lượng: 0.5 kg/ha Pha 10 – 15 g/bình 20 lít, phun cho 1 sào Bắc bộ (360m2) Pha 20 – 25 g/bình 25 lít, phun 1 – 2 bình/1000 m^2)
Cà phê, điều	Rệp sáp, rệp vảy, bọ xít muỗi...	
Cam quýt, bưởi, sầu riêng	Bọ phấn, rầy xanh, rệp sáp, bọ xít...	
Lạc, sắn, ngô, rau cải	Bọ nhảy, rầy mềm, bọ ngâu, sâu xám, sâu khoang, sâu ăn lá...	
Thanh long, hồ tiêu	Bọ ngâu, rệp sáp...	

Lưu ý:

- Phun vớt đều tán lá cây trồng khi sâu hại vừa mới xuất hiện.
- Lượng nước phun: 400 – 500 lít/ha.
- Có thể phối hợp với các loại thuốc BVTV khác trừ chích hút có tính kiềm.
- Thời gian cách ly: 14 ngày sau khi phun.

THUỐC TRỪ SÂU OSCARE 100WP

TRÙM CHÍCH HÚT - TRĨ®

ĐẶC TRỊ: CÔN TRÙNG CHÍCH HÚT

PREMIUM QUALITY – DIỆT SẠCH 100% – GUARANTEED

Hoạt chất:
Pymetrozine 100g/kg
Phụ gia đặc biệt vừa đủ 1kg

Hãng sản xuất:
Biocrop Pte Ltd (Singapore)

SINGAPORE

Đặc tính – Công dụng:

- Hoạt chất Pymetrozine là thuốc lưu dẫn, có tác dụng tiếp xúc, vị độc, lưu dẫn nhanh, cơ chế tác động đến tế bào thần kinh làm côn trùng không thể chích hút và chết. Sản phẩm được nhiều công ty đăng ký phòng trừ: Bọ nhảy, rệp sáp, bọ phấn, bọ trĩ (bọ cánh to), bọ xít, rầy nâu, rầy xanh, rầy mềm, bọ ngâu…

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Sâu hại	Liều dùng
Lúa	Rầy nâu, rầy lưng trắng, bọ xít	- Sử dụng: 0.5 - 1.0 kg/ha. - Pha 10 - 15g/bình 20 lít phun cho 1 sào Bắc bộ (360m^2). - Pha 20 - 25g/bình 25 lít phun 1 - 2 bình/1 công Nam Bộ.
Mía	Rệp bông xơ, rệp sáp	
Cà phê, hồ tiêu	Rầy xanh, rệp sáp	
Điều	Bọ xít muỗi	
Sắn, hoa hồng	Bọ phấn, rệp muội	
Rau màu, cây ăn trái…	Bọ nhảy, bọ phấn, rầy mềm, bọ xít, bọ trĩ, bọ ngâu, rầy xanh…	

Lưu ý: Thời gian cách ly 14 ngày
Phun ướt đều tán lá cây trồng khi sâu hại xuất hiện.
Lượng nước phun: 400 - 500 lít/ha.

THUỐC TRỪ SÂU NOFARA 350SC

Hiệu Recxona® 350SC
Rầy Sữa

HIỆU VUA TRĨ®

Hoạt chất: Thiamethoxam 350 g/L + Phụ gia đặc biệt 650 g/L
Hãng sản xuất: Jiangsu Eastern Agrochemical Co., Ltd.

DIỆT SẠCH CÔN TRÙNG CHÍCH HÚT

LƯU DẪN KÉO DÀI

Đặc tính – Công dụng:

- Hoạt chất Thiamethoxam có tác động tiếp xúc, vị độc và nội hấp mạnh nên ít bị rửa trôi, hiệu lực diệt côn trùng chích hút mạnh và kéo dài. Phổ tác dụng rộng, phòng trừ hiệu quả cao nhiều loại sâu ăn lá và chích hút cho nhiều loại cây trồng.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Sâu hại	Liều dùng
Lúa	Bọ trĩ, rầy nâu, bọ xít	Liều lượng: 0.3 lít/ha. Cách pha: Pha 20 - 24ml/20 lít nước. Lượng nước phun: 320 - 500 lít/ha. Thời điểm: Phun thuốc khi sâu hại vừa mới xuất hiện.
Mía	Rệp bông xơ, rệp sáp	
Cà phê	Rệp sáp, rệp muỗi, sâu đục cành	
Thuốc lá	Rệp sáp	
Điều	Bọ xít, bọ trĩ	
Khoai tây	Rệp đào	
Hoa cúc	Bọ trĩ	

Lưu ý:

- Không phun thuốc khi có gió lớn hoặc trời sắp mưa to.
- Thời gian cách ly: 14 ngày sau khi phun.

THUỐC TRỪ SÂU NOFARA 35WG

Hiệu Recxona® 35WG

HIỆU VUA TRĨ®

Hoạt chất: Thiamethoxam 35% w/w + Phụ gia đặc biệt 65% w/w
Hãng sản xuất: Jiangsu Eastern Agrochemical Co., Ltd.

DIỆT SẠCH CÔN TRÙNG CHÍCH HÚT

LƯU DẪN KÉO DÀI

Đặc tính – Công dụng:

- Hoạt chất Thiamethoxam có tác động tiếp xúc, vị độc và nội hấp mạnh nên ít bị rửa trôi, hiệu lực diệt côn trùng chích hút mạnh và kéo dài. Phổ tác dụng rộng, phòng trừ hiệu quả cao nhiều loại sâu ăn lá và chích hút cho nhiều loại cây trồng.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Sâu hại	Liều dùng
Lúa	Bọ trĩ, rầy nâu, bọ xít	Cách pha: Pha 10 - 15gr/20 lít. Lượng nước phun: 320 - 500 lít/ha. Thời điểm: Phun thuốc khi sâu rầy vừa mới xuất hiện.
Mía	Rệp bông xơ, rệp sáp	
Cà phê	Rệp sáp, rệp muỗi, sâu đục cành	
Thuốc lá	Rệp sáp	
Điều	Bọ xít, bọ trĩ	
Khoai tây	Rệp đào	
Hoa cúc	Bọ trĩ	

Lưu ý:

- Không phun thuốc khi có gió lớn hoặc trời sắp mưa to.
- Thời gian cách ly: 14 ngày sau khi phun.

THUỐC TRỪ SÂU TOSI 30WG

Hoạt chất: Acetamiprid…30% w/w + Phụ gia đặc biệt…70% w/w
Hãng sản xuất: Shandong United Pesticide Industry Co., Ltd

Đặc tính – Công dụng:

- Tosi 30WG chứa hoạt chất Acetamiprid có tác dụng nội hấp cực nhanh, lưu dẫn cực mạnh. Sau khi phun thuốc thấm sâu qua bề mặt lá và lưu dẫn trong toàn bộ cây trồng, tác động lên hệ thần kinh làm côn trùng ngừng ăn và chết.
- Tosi 30WG đặc trị bọ phấn, rầy mềm trên rau màu: bầu bí, cà chua, dưa, bọ trĩ, rầy nâu trên lúa…

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Sâu hại	Liều dùng
Bầu bí, dưa leo, dưa hấu, dưa lê, hoa các loại: Hoa cúc, hoa đồng tiền, hồng…	Bọ phấn, bọ trĩ, rầy mềm…	Pha 10g/bình 16 lít, xịt ướt đẫm cây trồng. Cây non, pha 10g/bình 25 lít, xịt ướt đẫm cây trồng.
Rau họ thập tự: Bắp cải, súp lơ, xu hào...	Bọ phấn, rầy mềm	
Ớt các loại	Bọ trĩ, rầy nâu...	
Cây thuốc: Cam thảo, tía tô, sâm ngọc linh, thủy bồn thảo...	Rệp cải bắp, rệp đào, rệp bông sơ, rệp vảy...	
Bầu bí, dưa chuột, dưa hấu, dưa lê	Bọ phấn, rầy mềm, rệp cá, sâu đục gốc...	Pha 10g/bình 16 lít, xịt ướt đẫm cây trồng. Sâu đục gốc pha 10g/20 lít, đổ 100–200ml nước đã pha/gốc.
Nho	Bọ chấm đen, bọ dừa, rầy xanh...	

Lưu ý: Không phun thuốc khi lúa đã trổ bông

- Không phun thuốc khi có gió lớn hoặc trời sắp mưa to. Phun thuốc khi sâu mới nở, sâu còn nhỏ (tuổi 1–2). Lượng nước phun từ 400–500 lít/ha.
- Thời gian cách ly: 14 ngày. Đối với cây thuốc nam, chè (trà) cách ly 21 ngày.

Hiệu

Suparep 400WP

Diệt sạch Chích hút

Hoạt chất:

Buprofezin …… 150g/kg

Dinotefuran …… 250g/kg

Hãng sản xuất:

Buprofezin: Hebei Veyong Bio-Chemical Co., Ltd.

Dinotefuran: Shandong Shengnong Chemical Co., Ltd.

Đặc tính – Công dụng:

- Suparep 400WP có tác dụng nội hấp cực nhanh, lưu dẫn cực mạnh. Sau khi phun thuốc thấm sâu qua bề mặt lá và lưu dẫn trong toàn bộ cây trồng, tác động lên hệ thần kinh làm côn trùng ngừng ăn và chết.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Sâu hại	Liều dùng
Lúa	Rầy nâu	Liều lượng 80g/ha. Pha 2,5–3 g thuốc/bình 16 lít nước. Phun 3 bình/công (1.000 m^2).

Lưu ý: Thời gian cách ly 7 ngày.

- Lượng nước dùng 400-500 lít/ha.
- Không phun thuốc khi có gió lớn hoặc trời sắp mưa to.
- Phun thuốc khi lúa bị nhiễm rầy cám (tuổi 1 - 2).

KHONGRAY 54WP

DIỆT SẠCH - KHÔNG RẦY

Đặc trị: Bọ trĩ, bọ nhảy, rầy xanh, rệp sáp, muội, bọ phấn trắng.

Hoạt chất:

Buprofezin …… 180g/kg

Dinotefuran …… 120g/kg

Hãng sản xuất:

Beta Chemicals Co., Ltd.

Đặc tính – Công dụng:

Sản phẩm là hỗn hợp 2 hoạt chất Acetamiprid + Buprofezin là thuốc tiếp xúc, lưu dẫn cực mạnh, hiệu quả cao, dùng đặc trị bọ trĩ, bọ nhảy, rầy, rệp muội trắng, muỗi đen, bọ phấn trắng, nhện đỏ hại rau màu, hoa, cây cảnh, lúa, đậu, cà phê, cây ăn quả, cây công nghiệp.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Sâu hại	Liều dùng
Lúa	Rầy nâu, rầy xanh, rầy lưng trắng, bọ trĩ	0.3 – 0.35 kg/ha. Pha 20gr cho bình 25 lít nước
Đậu tương, đậu phộng, rau màu...	Sâu xanh, sâu khoang, bọ nhảy, rệp sáp, bọ phấn, rệp muội, nhện...	
Cà phê	Rệp sáp, rệp vảy	

Lưu ý:

- Lượng nước phun 320 lít/ha.
- Phun thuốc khi rầy cám ra rộ. Phun ướt đều trên cây, nếu mật độ dịch hại nhiều thì phun lại lần 2 sau 5 – 7 ngày.
- Nên phun vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát để đạt hiệu quả cao nhất.
- Không phun khi trời sắp mưa to hoặc khi có gió lớn.
- Tuyệt đối không sử dụng thuốc này kể từ khi lúa trổ.

New CHESSIN 600WP

MẠNH NHẤT - MỚI NHẤT
SẠCH CHÍCH HÚT

SẢN PHẨM TIÊN TIẾN
SẠCH CHÍCH HÚT
PREMIUM QUALITY

Hoạt chất:
Dinotefuran 200g/kg
Pymetrozine 400g/kg

Hãng sản xuất:
Dinotefuran: Zhejiang Well-done Chemical Co., Ltd
Pymetrozine: Shenyang Biochemistry Co., Ltd

Đặc tính – Công dụng:

Sản phẩm là sự kết hợp hoàn hảo của 2 hoạt chất Dinotefuran và Pymetrozine. Có cơ chế tác động kép lên hệ thần kinh khi tiếp xúc qua miệng hoặc da côn trùng chích hút, làm tê liệt cơ quan miệng và ngộ độc dạ dày. Thuốc có khả năng thấm thấu nhanh, lưu dẫn mạnh trong cây nên ít bị rửa trôi, ít ảnh hưởng đến thiên địch và môi trường.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Sâu hại	Liều dùng
Lúa	Rầy nâu, bọ xít	0.15 – 0.20 kg/ha. Pha 10 – 15g cho bình 18 – 20 lít nước
Sắn (khoai mì), cà phê, hồ tiêu, phật thủ	Rệp sáp, bọ phấn, rầy chổng cánh	
Hoa hồng, ngô, đậu tương	Rệp muội	

Lưu ý:

- Lượng nước phun: 400 – 500 lít/ha.
- Phun thuốc khi rầy tuổi 1 – 2.
- Nên phun vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát để đạt hiệu quả cao nhất.
- Không phun khi trời sắp mưa to hoặc khi có gió lớn.
- Thời gian cách ly: 7 ngày sau khi phun.

THUỐC TRỪ SÂU OSCARE 600WG

Hiệu

RAMTỀ THIÊN

TIÊU DIỆT CHÍCH HÚT - HIỆU LỰC KÉO DÀI

Hoạt chất:
Pymetrozine …… 600 g/kg
Chất phụ gia …… 400 g/kg

Hãng sản xuất:
Biocrop Pte., Ltd (Singapore).

DIỆT CẢ TRỨNG
CON LỚN, CON NHỎ
KHÔNG XÓT MỘT CON

Đặc tính – Công dụng:

- Ram Tề Thiên chứa hoạt chất Pymetrozine là hoạt chất thuộc nhóm pyridine azomethines, có tác dụng diệt các loài chích hút mới nhất hiện nay. Thuốc tác dụng tiếp xúc, lưu dẫn kéo dài, làm cho chích hút ngừng ngay chích hút trong vòng 24 giờ sau phun và chết sau đó.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Sâu hại	Liều dùng
Dâu tây, dưa chuột, dưa hấu, chè (trà), thanh long…	Bọ phấn, bọ trĩ, rầy mềm, rầy xanh, bọ ngâu...	75 – 150g/ha. Pha 20 – 25g/bình 25 lít. Cây con, cây trồng trong nhà kính pha liều thấp 15g/bình 25 lít. phun 2 bình cho 1.000m²
Hoa các loại: Hoa cúc, hoa đồng tiền, hoa hồng...		
Rau họ thập tự: Bắp cải, súp lơ, xu hào…	Bọ phấn, rầy mềm, Bọ nhảy...	
Lúa	Bọ trĩ, rầy nâu, rầy xanh	

Lưu ý:

- Lượng nước phun: 400 – 500 lít/ha.
- Thời gian cách ly: 28 ngày sau khi phun.
- Không phun thuốc khi có gió lớn hoặc trời sắp mưa to.
- Phun thuốc khi sâu mới nở, sâu còn nhỏ (tuổi 1 - 2).

THUỐC TRỪ SÂU EXAMI 20WG

EXAMI 20WG

T CHẤT LƯU DẪN - MỚI NHẤT HIỆN NAY
ỆT SẠCH CÁC LOÀI CHÍCH HÚT
HUỐC MÁT - TAN TỐT

Hoạt chất:
Flonicamid ..... 20% w/w
Special Additives ... 80% w/w

Hãng sản xuất:
Yancheng Limin Chemical Co., Ltd

Đặc tính – Công dụng:

- Thuốc Exami 20WG là thuốc dạng cốm cao cấp, chứa hoạt chất lưu dẫn Flonicamid, thế hệ mới nhất tại Việt Nam hiện nay! Flonicamid diệt sạch hữu hiệu các loài chích hút: rầy, rệp, bọ nhảy, rầy nâu hại lúa, nhện lông nhung, bọ trĩ, bọ phấn, bọ ngựa, rầy chổng cánh... Thuốc lưu dẫn, thấm sâu, chuyển vị và làm côn trùng ngừng chích hút tức thì.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Sâu hại	Liều dùng
Lúa, hoa hồng, cam, dâu tây, măng cầu (na), sầu riêng, xoài, thanh long, chè (trà), xà lách, rau cải thìa...	Rầy xanh, rầy nâu, rầy phấn, rầy mềm, rệp sáp, bọ trĩ, bọ xít, bọ nhảy, nhện lông nhung...	0.5 kg/ha. Pha 25g/bình 25 lít. Phun khi rầy rệp xuất hiện, mật độ từ 20-40 con/khóm hoặc từ 2-5 con/dảnh.

Lưu ý:

- Lượng nước phun từ 500 – 600 lít/ha.
- Không phun thuốc khi có gió lớn hoặc trời sắp mưa to.
- Phun thuốc vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát để đạt kết quả cao nhất.
- Thời gian cách ly 7 ngày.

THUỐC TRỪ SÂU MILLION 50WG

MILLION 50WG

TEPENYAKI 50WG

Hoạt chất: Flonicamid 50% w/w + Phụ gia đặc biệt 50% w/w
Hãng sản xuất: Croponosys India PVT., Ltd (Ấn Độ)

MỘT PHÁT LÀ ĐI - LO GÌ RẦY RỆP !
DẠNG CỐM - THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

Đặc tính – Công dụng:

- Sản phẩm là thuốc trừ sâu thế hệ mới nhất, có cơ chế ngăn chặn hoạt động chích hút của sâu rầy làm sâu rầy chết ngay sau đó, thuốc đặc trị hiệu quả các loại côn trùng chích hút trên nhiều loại cây trồng.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Sâu hại	Liều dùng
Lúa	Rầy nâu, rầy lưng trắng, bọ xít	0.16 kg/ha. Pha 25g/bình 25 lít. Phun 2 bình cho 1 công ($1.000m^2$). Phun khi rầy rệp mới xuất hiện, mật độ khoảng 20-40 con/khóm hoặc 2-5 con/dảnh.
Sắn (khoai mì)	Bọ phấn trắng	
Ngô (bắp)	Rệp muội, rệp sáp	
Xoài, thanh long	Rệp sáp, bọ ngâu, rầy xanh, rầy bông	
Thuốc lá	Bọ phấn	
Hoa cúc, hoa hồng	Bọ trĩ, nhện lông nhung	
Rau cải	Rầy mềm, rệp sáp, bọ nhảy, bọ phấn...	
Cây ăn trái	Nhện, rệp sáp, rầy xanh, bọ phấn	

Lưu ý:

- Không phun thuốc khi có gió lớn hoặc trời sắp mưa to.
- Thời gian cách ly: 7 ngày sau khi phun.

KOTO 240SC

GẤU LỬA DIỆT SẠCH CÁC LOẠI CHÍCH HÚT

Benxana® 240SC

Neonicotinoid Active

KOTO 240SC GolD

GIẢI PHÁP 3 TRONG 1

BẢO XÁI

Hoạt chất: Thiacloprid … 240g/lít + Phụ gia đặc biệt … 760g/lít

Hãng sản xuất: Fertiagro Pte., Ltd (Singapore)

Đặc tính – Công dụng:

- Koto chứa hoạt chất Thiacloprid lưu dẫn thế hệ mới, đối kháng với thụ thể Acetyl-choline nicotinic trong hệ thần kinh. Nó làm rối loạn tế bào thần kinh dẫn đến cái chết của côn trùng.
- Thiacloprid có phổ tác động rất rộng, hiệu quả với sâu miệng nhai và chích hút như: Rầy nâu, bọ trĩ, rệp sáp, rầy mềm, bọ nhảy, sâu đục quả, sâu đục cuống, sâu đục thân…

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Sâu hại	Liều dùng
Dâu tây, dưa chuột, dưa hấu…	Bọ phấn, bọ trĩ, rầy mềm…	Pha 25–50ml/bình 25 lít. Cây non, cây trồng trong nhà kính pha liều thấp (25ml/bình 25 lít).
Các loại hoa: hoa cúc, hoa đồng tiền, hoa hồng.	Bọ phấn, rầy mềm…	
Rau họ thập tự: bắp cải, súp lơ, su hào.		
Táo	Sâu lá, rầy mềm…	

THUỐC TRỪ SÂU

Cây trồng	Sâu hại	Liều dùng
Lúa	Sâu đục thân, cuốn lá, bọ trĩ, rầy nâu...	Pha 25-50ml/bình 25 lít
Trà	Bọ xít muỗi , rầy xanh	
Cây rừng: Tràm, thông, tùng	Bọ róm	Pha 25-50ml/bình 25 lít Pha 250ml/phi 200 lít
Cà phê	Rệp sáp, mọt đục cành	Pha 25-50ml/bình 25 lít

Lưu ý: Thời gian cách ly 7 ngày
- Không phun thuốc khi có gió lớn hoặc trời sắp mưa to.
- Lượng nước phun từ 400 lít/ha.
- Phun thuốc ướt đều lá khi sâu mới nở, sâu còn nhỏ (tuổi 1- 2), đối với cây non (cây còn nhỏ), cây trong nhà kính, giảm thuố khi pha cho thích hợp.

THUỐC TRỪ SÂU VOI THAI 3.6EC GOLD

GIÁO SƯ SÂU®

Hoạt chất:
Avermectin B1a, B1b
(Abamectin 36g/l)

Hãng sản xuất:
Jiangxi Machinery & Equipment Import & Export Co., Ltd.

Đặc tính – Công dụng:

- Sản phẩm là thuốc trừ sâu tiếp xúc, nội hấp, lưu dẫn. Đặc trị nhiều loại sâu, nhện trên nhiều loại cây trồng khác nhau như: Sâu cuốn lá, nhện gié, sâu tơ, rệp sáp, nhện đỏ, sâu xanh, bọ phấn, rầy mềm, ruồi vàng, bọ xít...

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Sâu hại	Liều dùng
Rau cải	Sâu tơ	Pha 25-50ml/bình 20 lít
Hành lá	Sâu hành	
Lúa	Sâu cuốn lá	

Lưu ý:
- Phun thuốc khi sâu tuổi còn nhỏ.
- Không phun khi trời sắp mưa to hoặc khi có gió lớn.
- Thời gian cách ly: 7 ngày sau khi phun.

Ecudor 22.4SC

LƯU DẪN 2 CHIỀU × SỨC MẠNH TỐI ĐA

Hãng sản xuất: Guilin Jiqi Group., Ltd.

SUPAREP 22.4 SC

MÁT CÂY - SẠCH CHÍCH HÚT

Hãng sản xuất: Qingdao Haina Biotechnology Co., Ltd.

Hoạt chất:

Spirotetramat…22.4% w/w + Chất phụ gia…77.6% w/w

Đặc tính – Công dụng:

Sản phẩm là thuốc trừ sâu lưu dẫn 2 chiều, hấp thu qua lá, di chuyển cả lên và xuống trong cây gây ức chế sinh tổng hợp lipid, làm côn trùng ngừng phát triển, giảm sinh sản và chết, cơ chế hấp thu nhanh nên ít ảnh hưởng đến thiên địch, hiệu quả trên nhiều cây trồng. Sản phẩm diệt trừ tốt: rệp sáp, rệp vảy, rầy xanh, bọ trĩ, nhện đỏ, rầy phấn, sâu tơ, sâu xanh, rầy chổng cánh…

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Sâu hại	Liều dùng
Khoai tây, cà chua	Bọ phấn, sâu đục quả	0.3 – 0.5 lít/ha. Pha 18 – 20 ml cho bình 20 lít nước.
Dưa chuột, thanh long, bưởi, chè, cà chua, vải, xoài, bắp cải…	Bọ trĩ, sâu đục quả, sâu tơ, nhện	
Cà phê, cam, bưởi, tiêu, sầu riêng	Rệp sáp, rệp muỗi, rầy chổng cánh	
Hoa cúc, hoa hồng...	Nhện đỏ	

Lưu ý:

Lượng nước phun 500 – 600 lít/ha.

Phun thuốc khi sâu, bọ mới xuất hiện, mật độ khoảng 3 – 5 con/lá hoặc khoảng từ 3 – 6 con/ngọn.

- Nên phun vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát để đạt hiệu quả cao nhất.
- Không phun khi trời sắp mưa to hoặc khi có gió lớn.
- Thời gian cách ly: 14 ngày với khoai tây và cà phê, 5 ngày với dưa chuột.

THUỐC TRỪ SÂU

Kyodo 25SC GOLD

Hoạt chất:
Diafenthiuron 250g/lít
Phụ gia đặc biệt vừa đủ

Hãng sản xuất:
Biocrop Pte., Ltd (Singapore)

Đặc tính – Công dụng:

- Kyodo 25SC là thuốc diệt côn trùng thế hệ mới, chuyên dùng đặc trị các loại nhện gây hại trên cây trồng. Thuốc có dạng SC rất mát, có thể phun được ở mọi giai đoạn.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Sâu hại	Liều dùng
Vải, cam, chè, nhãn, bắp cải, hoa hồng, lạc, rau cải, cà tím, su hào	Nhện lông nhung, nhện đỏ, nhện vàng, sâu tơ, sâu xanh, sâu ăn lá, bọ phấn, rệp, rầy xanh, sâu khoang, bọ nhảy	Liều lượng: Pha 22ml/20 lít nước. Mật độ cao: Pha 1.5 gói/20 lít nước. Phun ướt đều để có hiệu quả tốt nhất

Lưu ý:
- Sử dụng thuốc trước khi đậu quả.
- Không phun thuốc khi có gió lớn hoặc trời sắp mưa to.
- Lượng nước phun 400 - 800 lít/ha, khi cây còn non, cây trong nhà kính cần giảm lượng thuốc cho thích hợp.
- Không xịt cho lúa và cây trồng khác, có thể gây ngộ độc cây trồng.
- Không xịt khi trời mưa to hoặc có gió lớn.
- Thời gian cách ly: 7 ngày.

THUỐC TRỪ SÂU

FORZATE 20EW

TRÙM TUYẾN TRÙNG®

THÁNH TUYẾN TRÙNG®
SIÊU SÙNG HÀ!

CUỘC CÁCH MẠ
TUYẾN TRÙNG

Hoạt chất: Fosthiazate.....20% w/w
Hãng sản xuất: Shanxi Hongyang Chemicals Co., Ltd.

Đặc tính – Công dụng:

FORZATE 20EW "Cuộc Cách Mạng Tuyến Trùng" với hợp chất mới phát minh trên thế giới, lưu dẫn mạnh, diệt trừ triệt để tuyến trùng ở tất cả các giai đoạn, kể cả trứng. Thuốc có hiệu lực kéo dài trên 90 ngày sau khi sử dụng. FORZATE 20EW thật sự là món quà vô giá mang lại hiệu quả và sự an tâm cho người nông dân tiên tiến.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Sâu hại	Liều dùng
Cà phê	Tuyến trùng rễ	Pha 24ml / 20 lít nước.

Lưu ý:

- Tưới đều thuốc quanh gốc vào đầu mùa mưa hoặc khi cây có biểu hiện vàng lá do tuyến trùng.
- Đối với cây con và các cây trồng ngắn ngày, xử lý đất bằng thuốc từ 7 - 10 ngày trước khi gieo trồng.
- Không phun khi trời sắp mưa to hoặc khi có gió lớn.
- Thời gian cách ly: 14 ngày sau khi phun.

Ve sầu

Siêu nhân

Sâu đất

Sùng đất

Bọ hà

Lama 50EC

XẠ THỦ TRỪ NHỆN

Hoạt chất:
Hexythiazox.....50g/lít
Phụ gia đặc biệt vừa đủ 1 lít

Hãng sản xuất:
Fertigap Pte., Ltd (Singapore)

Đặc tính – Công dụng:

- Lama 50EC ức chế quá trình lột xác và tác động lên các pha sinh trưởng của nhện như: trứng nhện, ấu trùng và nhện trưởng thành.
- Thuốc có tính nội hấp, hiệu quả cao đối với nhiều loài nhện hại thực vật.
- Đặc trị nhện các loại hại thực vật như: "nhện đỏ, nhện gié, nhện lông nhung và nhện trắng" trên cây có múi, chè, hoa, rau…

Ưu điểm: Diệt nhện, ấu trùng và cả trứng nhện nên hiệu lực kéo dài. Đặc biệt con cái trưởng thành đã nhiễm thuốc khi đẻ trứng, trứng sẽ không nở, không chế được sự bộc phát sau này. Không ảnh hưởng tới côn trùng có ích nên phù hợp với chương trình quản lý dịch hại tổng hợp IPM.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Sâu hại	Liều dùng
Cam, quýt, cây ăn trái…	Nhện đỏ, nhện trắng	Pha 15–20 ml/bình 16–18 lít Phun ướt đẫm lên cây trồng.
Chè (trà), hoa các loại…		
Lúa	Nhện gié	Pha 15–20 ml/bình 16–18 lít

Lưu ý:

- Thời gian cách ly: 7 ngày
- Lượng nước phun 400 – 800 lít/ha.
- Không phun thuốc khi có gió lớn hoặc trời sắp mưa to.

BIPIMAI 150EC

DIỆT SÂU RẦY NHỆN CẤP TỐC

Hoạt chất:
Pyridaben.....150g/lít
Phụ gia đặc biệt vừa đủ 1 lít

Hãng sản xuất:
Sheyang Huanghai Pesticide & Chemical Industry Co., Ltd

Đặc tính – Công dụng:

- Bipimai 150EC chứa hoạt chất Pyridaben kìm hãm sự vận chuyển điện tử trong ty thể của tế bào, làm ảnh hưởng đến quá trình tạo năng lượng, gây tử vong cho sâu, nhện…
- Hoạt chất Pyridaben có tác động tiếp xúc, quật ngã và gây chết nhanh, hiệu lực dài. Tác động đến mọi giai đoạn phát triển của sâu, nhện, đặc biệt là ấu trùng nhện và nhện trưởng thành.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Sâu hại	Liều dùng
Bầu, bí, mướp…	Bọ phấn	Pha 20–40 ml /bình 20 lít
Cây có múi: bưởi, cam, chanh quýt, tắc…	Nhện đỏ, nhện trắng…	
Cà các loại…	Bọ phấn, nhện vàng…	
Rau màu, các loại dưa…	Bọ phấn, bọ nhảy, rầy mềm…	
Hoa hồng…	Nhện đỏ, nhện trắng	
Nho, các loại…	Nhện trắng hai chấm…	

Lưu ý:

- Thời gian cách ly: 14 ngày
- Không phun thuốc khi có gió lớn hoặc trời sắp mưa to.
- Phun thuốc ướt đều lá khi sâu mới nở, sâu còn nhỏ (tuổi 1–2), đối với cây non (cây còn nhỏ), cây trong nhà kính, giảm thuốc khi pha cho thích hợp.

1. Bipimai 150EC + Kyodo 25SC (Hoạt chất: Diafenthiuron 250g/l)

Cây trồng	Sâu hại	Liều dùng
Cây ăn trái, rau màu…	Bọ phấn	Bipimai 20–30ml + Kyodo 20–30ml/bình 20 lít

2. Bipimai 150EC + Tosi 30WG (Hoạt chất: Acetamiprid 30% w/w)

Cây trồng	Sâu hại	Liều dùng
Cây ăn trái, rau màu…	Bọ phấn, bọ nhảy.	Bipimai 20–30ml + Tosi 5–10g/bình 20 lít

Bọ phấn

Bọ nhảy

Nhện đỏ

Nhện hai chấm

THUỐC TRỪ SÂU

Kyodo 25SC

Hoạt chất:
Diafenthiuron.....250g/lít

Kyodo 50WP

Hoạt chất:
Diafenthiuron.....500g/kg

Hãng sản xuất: Fertiagro Pte., Ltd (Singapore)

LO CHI NHIỆN HẠI - NGẠI CHI SÂU KHÁNG

Đặc tính – Công dụng:

- Kyodo tác động tiếp xúc và vị độc, khi thuốc ngấm vào trong cơ thể dịch hại, thuốc chuyển hóa thành hợp chất khử N-Metyl, ức chế hô hấp và kích động quá mức thụ thể Octopamin làm dịch hại bị tê liệt ngừng ăn và chết.
- Kyodo có thể diệt sâu non, sâu trưởng thành và trứng sâu. Đặc trị nhện đỏ, nhện vàng, bọ phấn, rầy xanh, rầy mềm, sâu tơ, sâu xanh...

Hướng dẫn sử dụng Kyodo 25SC:

Cây trồng	Sâu hại	Liều dùng
Cam, quýt, chè, hoa hồng, nho, khoai…	Bọ trĩ, nhện đỏ, nhện trắng, rầy xanh, bọ xít, bọ hà…	Pha 20-30ml/bình 16-18 lít. Phun ướt đẫm cây từ gốc tới ngọn
Hoa các loại	Nhện đỏ, bọ trĩ	Pha 20-30ml/bình 16-18 lít
Rau màu	Sâu xanh, sâu tơ	

Lưu ý:

- Không xịt cho lúa và các cây trồng khác, có thể gây ngộ độc cây trồng.
- Không xịt khi trời mưa to hoặc có gió lớn.

Hướng dẫn sử dụng Kyodo 25SC:

Cây trồng	Sâu hại	Liều dùng
Cam, quýt, chè, hoa hồng, nho, khoai…	Bọ trĩ, nhện đỏ, nhện trắng, rầy xanh, bọ xít, bọ hà…	0.8 kg/ha. Pha 25-30g/bình 16 lít. Phun ướt đều cây trồng
Hoa các loại	Nhện đỏ, bọ trĩ	
Rau màu	Sâu xanh, sâu tơ	

Lưu ý: Sử dụng thuốc trước khi thu hái quả.
- Không phun thuốc lúc trời có gió lớn hoặc sắp mưa to
- Lượng nước phun 400g–500 lít/ha, khi cây còn non, cây trong nhà kính cần giảm lượng thuốc cho thích hợp.
- Thời gian cách ly: 7 ngày.

KINH NGHIỆM PHỐI TRỘN CỦA NHÀ NÔNG:

1.Kyodo 25SC + Ohayo 100SC (Hoạt chất: Chlorfenapyr 100g/lít)

Cây trồng	Sâu hại	Liều dùng
Cam, quýt, chè	Bọ cánh tơ, nhện đỏ, rầy xanh	Kyodo 25ml + Ohayo 25ml /bình 16-18 lít. Phun ướt đẫm lên cây trồng
Hoa các loại	Bọ trĩ, nhện đỏ	
Rau màu	Sâu xanh, sâu tơ	

2. Kyodo 25SC + Ortus 55SC (Hoạt chất: Fenpyroximate 5% w/w)

Cây trồng	Sâu hại	Liều dùng
Cam, quýt, chè	Nhện đỏ, nhện trắng	Kyodo 20ml + Ortus 20ml /bình 16-18 lít. Phun ướt đẫm lên cây trồng
Hoa các loại	Nhện đỏ, nhện trắng	

THUỐC TRỪ SÂU

SETIS 34SC

GIÁO SƯ NHỆN®

ĐẶC TRỊ: NHỆN ĐỎ, NHỆN TRẮNG, NHỆN LÔNG NHUNG...

Hoạt chất:

Spirodiclofen .....34% w/w

Additives .....66% w/w

Hãng sản xuất:

Shandong Zhongxin Kenong Biological Technology Co., Ltd

Đặc tính – Công dụng:

- Sản phẩm chứa hoạt chất Spirodiclofen, là hoạt chất mới và hiếm, chuyên dùng đặc trị nhện và côn trùng chích hút đã kháng thuốc.
- Khả năng lưu dẫn hai chiều, ức chế quá trình tổng hợp và trao đổi chất nên thuốc có khả năng diệt cả ấu trùng và làm ung trứng của đối tượng gây hại, hiệu quả của thuốc diệt trừ cực mạnh và kéo dài.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Sâu hại	Liều dùng
Cam, chanh, bưởi, quýt, chè, dâu tây…	Nhện đỏ	Pha 12–15 ml/20 lít nước.
	Nhện trắng	
	Nhện lông nhung	

Lưu ý: Không thích hợp với hoa hồng và giai đoạn có hoa của cây ăn trái.

- Không phun khi trời sắp mưa to hoặc khi có gió lớn.
- Thời điểm: Phun vào sáng sớm hoặc chiều mát khi nhện vừa mới xuất hiện, mật độ khoảng 3–5 con/lá.
- Thời gian cách ly: 7 ngày sau khi phun.

THUỐC TRỪ SÂU

CÔNG THỨC MỚI
MẠNH GẤP 3
HIỆU QUẢ VƯỢT TRỘI

Búti 43SC®

ANH HÙNG NHỆN

TẬP ĐOÀN DELTA THỤY SĨ



Hoạt chất:

Bifenazate.....43% w/w

Special Additives.....57% w/w

Hãng sản xuất:

Henan Guangnong Pesticide Factory

Đặc tính – Công dụng:

- Sản phẩm là thuốc trừ nhện lần đầu xuất hiện tại Việt Nam, với hoạt chất Bifenazate hoàn toàn mới chưa hình thành tính kháng nên diệt trừ rất hiệu quả các loài nhện nhỏ và nhện trưởng thành, hiệu lực kéo dài gấp 3 lần so với các loại thông thường.
- Thuốc ở dạng SC nên không sợ nóng với đọt non, hoa và trái non.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Sâu hại	Liều dùng
Hoa hồng, cam, chanh, dâu tây, cà chua, bơ, chè (trà), dưa hấu, sắn (khoai mì)…	Nhện đỏ, nhện trắng, rệp sáp bột hồng…	Pha 10–12 ml/20 lít nước.

Lưu ý:

- Không phun khi trời sắp mưa to hoặc có gió lớn.
- Thời điểm: Phun vào sáng sớm hoặc chiều mát khi nhện vừa mới xuất hiện.
- Thời gian cách ly: 7 ngày sau khi phun.
- Lượng nước phun từ 500–600 lít/ha.

THUỐC TRỪ NHỆN ABINSEC 1.8EC

SIÊU DIỆT NHỆN

THẾ HỆ MỚI

Hoạt chất:
Abamectin: 1.8% w/w
(Avermectin b1: 1.8%)

Hãng sản xuất:
Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd

Đặc tính – Công dụng:

- Abinsec nhện mới! Công thức cải tiến, mát với cây trồng, nay có thể dùng với xịt cho hoa hồng và giai đoạn có hoa của cây ăn trái. Có hiệu quả trên cả những vùng nhện đã kháng thuốc mạnh.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Sâu hại	Liều dùng
Cam, quýt, lúa, chè, lạc, cải bắp, đậu tương, dưa hấu, xoài, cà chua,…	Nhện lông nhung, nhện đỏ, nhện vàng, nhện gié, sâu tơ, sâu xanh, sâu ăn lá, bọ phấn, rệp, rầy xanh, sâu khoang, bọ nhảy	Vùng nhện kháng thuốc mạnh, mật độ cao (đã sử dụng trước đó nhiều loại thuốc Tàu; Trung Quốc): Pha thuốc 40ml/ với 25L nước hoặc 30ml/ 20L nước. Tương đương chai 240ml/ phi 150L nước phun ướt đều mặt lá cây trồng. Vùng nhện ít kháng thuốc, mật độ thấp: Pha thuốc 30ml/ với 25L nước hoặc 24ml/ 20L nước. Tương đương chai 240ml/ phi 200L nước phun ướt đều mặt lá cây trồng.

Lưu ý: Thời gian cách ly: 7 ngày

THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG SAM SAN 2.5SC

NHỆN KIM CƯƠNG®

Sau 6 giờ bắt đầu chết
Sau 24 giờ chết sạch

HIỆU LỰC KÉO DÀI

SIÊU SẠCH NHỆN – UNG TRỨNG

Hoạt chất:
Deltamethrin……2,5% w/v
Dung môi và phụ gia…97,5% w/v

Hãng sản xuất:
Jiangsu Yangnong Chemical Co., Ltd

Đặc tính – Công dụng:

Deltamethrin là hoạt chất trừ sâu có tác dụng tiếp xúc và gây độc dạ dày, thuốc làm thay đổi chức năng của hệ thần kinh trung ương của côn trùng, gây tê liệt và tử vong. Tác dụng nhanh, hiệu quả ngay khi trúng thuốc, thời gian tác dụng kéo dài (7–12 ngày). Dạng SC rất mát, sử dụng được mọi giai đoạn.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Sâu hại	Liều dùng
Hoa hồng, hoa cúc	Nhện đỏ, nhện trắng, nhện vàng, nhiện lông nhung	Pha 20–25ml/ 20 lít nước Mật độ cao: Pha 30ml/ bình 20 lít nước.
Dâu tây		
Cam, bưởi, chanh		
Ớt, rau củ		
Các loại đậu		

Lưu ý:

- Lượng nước tưới 400–500 lít/ha.
- Phun thuốc nơi nhện sống tập trung. Phun ướt đều để đạt hiệu quả tốt nhất.
- Không phun khi trời sắp mưa to hoặc có gió lớn.
- Thời điểm: Phun vào sáng sớm hoặc chiều mát khi nhện vừa mới xuất hiện..

DẠNG SC RẤT MÁT
PHUN ĐƯỢC Ở MỌI GIAI ĐOẠN

Chết sạch
Bao Xài

Hiệu

DIỆT NHỆN SẤM SÉT

HIỆU QUẢ SAU 24h

Hoạt chất:
Lambda Cyhalothrin 1% w/v
Special additives .....99% w/v

Hãng sản xuất:
Ascot Pro-G Limited (Anh Quốc)

THẦN SẤM RA TAY - NHỆN CHẾT NGAY

Đặc tính – Công dụng:

- Lambda Cyhalothrin là hoạt chất thuộc nhóm cúc tổng hợp được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp, chăn nuôi, y tế, Lambda Cyhalothrin có phổ diệt côn trùng rộng, tác dụng nhanh, thuốc làm ngộ độc dạ dày của côn trùng và giết chết ngay sau khi tiếp xúc.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Sâu hại	Liều dùng
Hoa hồng, cam, chanh, dâu tây, súp lơ, bắp cải, quýt, đậu cove, hoa ly, hoa đồng tiền, hoa cúc…	Nhện đỏ, nhện trắng, nhện lông nhung, nhện vàng	Pha 24 ml/bình 20 lít. Chai 240 ml pha cho phuy 200 lít nước.

Lưu ý:

- Không phun khi trời sắp mưa to hoặc khi có gió lớn.
- Thời điểm: Phun vào sáng sớm hoặc chiều mát khi nhện vừa mới xuất hiện.
- Thời gian cách ly: 7 – 10 ngày sau khi phun.

CÁC LOẠI NẤM BỆNH

THUỐC TRỪ BỆNH

FORTHANE 80WP

Hãng sản xuất: Forward (Beihai) Hepu Pesticide Co., Ltd.

BỘT XANH BỘT VÀNG

Hoạt chất: Mancozeb 80% w/w + Phụ gia 20% w/w

BYPHAN 800WP

Hãng sản xuất: Shenzhen Dehao Pesticides Co., Ltd.

BỘT XANH BỘT VÀNG

Hoạt chất: Mancozeb 800g/kg + Phụ gia 200g/kg

Đặc tính – Công dụng:

- Forthane 80WP, Byphan 800WP có công dụng trừ nấm bệnh phổ rộng, diệt nấm thông qua cơ chế tiếp xúc trực tiếp, phòng trừ được nhiều loại nấm bệnh trên nhiều loại cây trồng như: đốm lá, thán thư, thối trái trên cây ăn trái: cam, nho, táo… Phòng ngừa bệnh đốm lá, khô đầu lá trên lạc, vừng… Phòng ngừa mốc sương, sương mai trên dưa chuột, dưa hấu và khoai tây…

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Bệnh hại	Liều dùng
Cây ăn trái	Đốm lá, thán thư, thối trái…	Pha 50–100g/bình 20 lít, phun ngừa hoặc phun bằng máy áp lực pha 500g/phi 200 lít, phun 1.000–2.000 lít/ha.
Lạc, vừng	Đốm lá, thối đầu lá…	Pha 50–100g/bình 20 lít, phun ngừa hoặc phun bằng máy áp lực pha 500g/phi 200 lít, phun 600–1.000 lít/ha.
Dưa hấu, hành lá khoai tây…	Mốc sương, sương mai…	Pha 50–100g/bình 20 lít. Cây non pha 50g/bình 20 lít.

Lưu ý:

- Không phun khi cây đang có hoa.
- Trường hợp bệnh nặng cần phun lặp lại sau 5–7 ngày.
- Đối với sân golf, xịt 1 lít nước đã pha loãng cho 1 m^2.
- Thời gian cách ly: 7 ngày sau khi phun.

THUỐC TRỪ BỆNH

SCORTLAN 80WP - M45 ẤN

BỘT XANH BỘT VÀNG

Hiệu

TRÙM NẤM BỆNH

BỘT XANH BỘT VÀNG

Hiệu

GIÁO SƯ BỆNH 4.0

Hoạt chất: Thiram 80% w/w + Phụ gia đặc biệt 20% w/w
Hãng sản xuất: M/S Meenakshi Agro Chemicals (Ấn Độ)

Đặc tính – Công dụng:

- Scortlan 80WP chứa hoạt chất trừ nấm thế hệ mới nhất: Thiram; đây là gốc thuốc trừ nấm tân tiến, phổ tác động rộng. Thuốc thay thế tốt các sản phẩm trừ nấm độc cao như: Mancozeb, Propineb, Zineb, Chlorothalonil để phòng trừ nấm bệnh trên nhiều loại cây trồng.

Thuốc có khả năng phòng trừ nhiều loại nấm bệnh như: Sương mai, mốc xám, thối nâu, đốm lá, đốm nâu, thán thư, thối rễ, héo rũ, phấn trắng, ghẻ sẹo trái, thối nhũn, bệnh do nấm fusarim, phytophthora gây ra…

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Bệnh hại	Liều dùng
Lạc, đậu tương, phong lan, cà phê, xoài, lúa, hoa mai, dưa hấu, cà chua, khoai tây, sầu riêng, cam quýt…	Đốm lá, rỉ sắt, thán thư, cháy lá, nứt thân, chảy nhựa, mốc sương (bã trầu), sẹo trái, thối nhũn, phấn trắng…	2.0 kg/ha. Pha 25g – 30g cho bình 20 lít nước.

Lưu ý:

- Không phun xịt ở giai đoạn cây còn nhỏ, đang ra hoa, ra trái non, lộc non.
- Phun thuốc khi vừa mới xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 5%.
- Lượng nước phun: 400 – 600 lít/ha.
- Thời gian cách ly: 7 ngày.
- Không phun thuốc khi trời sắp mưa hoặc có gió lớn.

THUỐC TRỪ BỆNH NIKO 72WP

NIKO 72WP

Hiệu M8Sing®

BỘT XANH

BỘT VÀNG

Hoạt chất: Cymoxanil 8% w/w + Mancozeb 64% w/w

Hãng sản xuất: Biocrop Pte., Ltd (Singapore)

Đặc tính – Công dụng:

- Niko 72WP vừa là trực tiếp tiêu diệt nấm bệnh, đồng thời kích thích cây trồng kháng bệnh từ bên trong.
- Niko 72WP có khả năng chuyên vị và thấm sâu nên khó bị rửa trôi khi gặp trời mưa và diệt mầm bệnh tận gốc.
- Niko 72WP đặc trị mốc sương và sương mai trên dâu tây, dưa chuột, dưa hấu và khoai tây, nho, vàng lá chín sớm trên lúa, thán thư trên xoài, ớt, chanh dây, thối rễ, chết nhanh trên hồ tiêu,...

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Bệnh hại	Liều dùng
Dâu tây, dưa chuột, dưa hấu, nho, rau chân vịt...	Mốc sương	Pha 50–100g/bình 20 lít, cây non pha 30–50g/bình 20 lít
Cà chua, hành hoa, hành tây, khoai tây, ớt...	Sương mai	Pha 50–100g/bình 20 lít, phun ngừa hoặc phun bằng máy áp lực pha 500g/phuy 200 lít, phun 600–1.000 lít/ha
Lúa	Vàng lá chín sớm	

Lưu ý: Thời gian cách ly 7 ngày sau khi phun.

- Không phun khi cây đang có hoa.
- Trường hợp bệnh nặng cần phun lặp lại sau 5–7 ngày.
- Đối với sân golf, xịt 1 lít nước đã pha loãng cho 1 m^2.

KINH NGHIỆM PHỐI TRỘN CỦA NHÀ NÔNG:

1. Niko 72WP + Thalonil 75WP (Hoạt chất: Chlorothalonil 75% w/w)

Cây trồng	Bệnh hại	Liều dùng
Dâu tây, dưa chuột, dưa hấu, nho, rauchân vịt	Mốc sương	Niko 30–40g + Thalonil 30–40g /bình 25 lít. Cây non pha liều dùng tối thiểu (thấp nhất).
Dưa hấu,cà chua, hành hoa, hành tây, khoai tây, ớt...	Sương mai	Niko 30–40g + Thalonil 30–40g /bình 25 lít, phun ngừa hoặc phun bằng máy phun áp lực pha liều dùng tối thiểu.

Lưu ý:
- Không phun khi cây đang có hoa.
- Trường hợp bệnh nặng nên phun lặp lại sau 5–7 ngày.

2. Niko 72WP + Gekko 20SC (Hoạt chất: Amisulbrom 20% w/w)

Cây trồng	Bệnh hại	Liều dùng
Dâu tây, dưa chuột, dưa hấu, nho, rauchân vịt	Mốc sương	Niko 30–40g + Gekko 15–20ml /bình 25 lít. Cây non pha liều dùng tối thiểu (thấp nhất).
Dưa hấu,cà chua, hành hoa, hành tây, khoai tây, ớt...	Sương mai	Niko 30–40g + Gekko 15–20ml /bình 25 lít, phun ngừa hoặc phun bằng máy phun áp lực pha liều dùng tối thiểu.

Lưu ý:
- Pha thuốc bột trước, thuốc nước sau.
- Không phun khi cây đang có hoa.
- Trường hợp bệnh nặng nên phun lặp lại sau 5–7 ngày.

Sương mai dưa hấu

Mốc sương nho

Sương mai cà chua

Mốc sương cây khoai tây

THUỐC TRỪ BỆNH NEKKO 69WP

Hiệu

Bác Sĩ Nấm Bệnh

Phòng trừ phổ rộng
Tác động lâu dài

Snambenh

Mới

Hoạt chất:
Dimethomorph.....9% w/w
Mancozeb.....60% w/w
Special additives.....31% w/w

Hãng sản xuất: Xi'an MTI Co., Ltd.

Đặc tính – Công dụng:

- Nhờ công nghệ phối chế độc đáo giữa hoạt chất Dimethomorph và Mancozeb, Bác Sĩ Nấm Bệnh trị nhanh và dứt điểm nhiều loại nấm bệnh nguy hại, đặc biệt là bệnh sương mai (mốc sương), nứt thân xì mủ, chết nhanh...
- Thuốc có cơ chế ngăn chặn sự lây lan và tái nhiễm của nấm bệnh, hấp thụ mạnh mẽ cả rễ, thân và lá nên có thể sử dụng hiệu quả khi tưới gốc hoặc phun trên thân, lá giúp bảo vệ toàn diện cây trồng.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Bệnh hại	Liều lượng
Cà chua, dưa hấu, hoa hồng	Sương mai	Sử dụng 1,8 kg/ha. Pha 30–50g/bình 20 lít. Lượng nước phun 400–600 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 5%.
Đậu tương, cà phê, xoài	Thán thư	
Hồ tiêu	Chết nhanh	
Sầu riêng	Thối thân xỉ mủ	
Cao su	Loét sọc mặt cạo	
Cam, chanh, bưởi…	Chảy gôm	

Lưu ý:

- Nên phun khi bệnh vừa chớm xuất hiện, vào sáng sớm hoặc chiều mát.
- Có thể phun lặp lại từ 7 – 14 ngày nếu áp lực bệnh cao.
- Thời gian cách ly: 7 ngày sau khi phun.

THUỐC TRỪ BỆNH FORTAZEB 72WP

BỘT XANH BỘT VÀNG

NAPOLEON

RinhdoThuySi ®

Hoạt chất:
Metalaxyl:.....8%w/w
Mancozeb:.....64%w/w
Additives:.....28%w/w

Hãng sản xuất:
M/s Meenakshi Agro Chemicals (Ấn Độ)

Đặc tính – Công dụng:

- Thuốc có đặc tính thấm sâu nhanh, lưu dẫn mạnh, khả năng trừ bệnh hiệu quả, bảo vệ toàn diện cây trồng ngay cả những phần non mới mọc sau khi phun. Sử dụng linh hoạt như phun lên lá, quét lên vết bệnh… cực kỳ tiện lợi, tiết kiệm công lao động.

Hướng dẫn sử dụng

Cây trồng	Bệnh hại	Cách dùng
Cao su, khoai tây, cà phê, điều, hoa hồng, hồ tiêu, vừng, mắc ca, lạc	Loét sọc mặt cạo, sương mai, rỉ sắt, thán thư, lem lép hạt lúa, phấn trắng, chết nhanh, lở cổ rễ, đốm lá, thối rễ,…	- Pha 25 – 30 gram/bình 20L nước. - Phun xịt lên cây trồng hoặc quét lên vết bệnh.

Chú ý:
- Thời gian cách ly: 07 ngày.
- Phun khi bệnh vừa chớm xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 5 - 10%.

Thán thư, sương mai thối nhũn bắp cải

Xì mủ sầu riêng

Thán thư nho

Mốc sương Cà Chua

Thán thư chanh dây

Thối rễ, chết nhanh hồ tiêu


Đốm lá, héo rũ hành Mốc sương hành

Phấn trắng Dưa Leo

THUỐC TRỪ BỆNH TATSU 25WP

Tatsu 25WP

BỘT XANH BỘT VÀNG

M8 - SINGAPORE MỚI 4.0
SẢN PHẨM THAY THẾ CHO NIKO

Metalaxyl 500

MỚI HƠN - CAO C

Hoạt chất: Metalaxyl……..25% w/w + Phụ gia đặc biệt…75% w/w
Hãng sản xuất: M/s Meenakshi Agro Chemicals (Ấn Độ)

Đặc tính – Công dụng:

- Tatsu 25WP là thuốc trừ bệnh phổ rộng, lưu dẫn 2 chiều. Thuốc được hấp thụ qua lá, thân rễ cây trồng, phun xịt lá, quét lên thân, tưới quanh gốc cây trồng.
- Đặc biệt hiệu quả với bệnh do nấm Phytophthora.
- Hàm lượng hoạt chất cao nhất Delta.
- Thuốc lưu dẫn 2 chiều và thẩm sâu rất mạnh. Phổ trừ bệnh rất rộng.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Bệnh hại	Liều lượng	Cách pha
Đậu tương	Phấn trắng	0.25 - 0.38%	40 g/ bình 16 lít
Ca cao	Thối thân, quả	0.1 - 0.15	100 g/ 100 lít nước
Hồ tiêu	Chết nhanh	0.09%	90 g/ 100 lít nước
Cao su	Vàng rụng lá	0.10%	100 g/ 100 lít nước
Cao su	Loét sọc mặt cạo	15 g/ 1 lít (1.5%), quét thuốc lên miệng cạo	
Sắn	Vàng lá	0.25 kg/ha	20 g/ bình 25 lít
Khoai tây	Sương mai	0.38 kg/ha	25 g/ bình 25 lít
Lạc (đậu phộng)	Chết ẻo	0.25 - 0.38 kg/ha	25 g/ bình 25 lít

Lưu ý:

- Lượng nước phun: 500 - 600 lít/ha.
- Phun ướt đều cây trồng khi bệnh mới xuất hiện hoặc tỷ lệ bệnh khoảng 5%.
- Cao su: Quét dung dịch thuốc đã pha lên mặt miệng cạo.
- Thời gian cách ly: 7 ngày sau khi phun.

Thalonil 75WP

SIÊU DIỆT TRỪ NẤM BỆNH

Hoạt chất:
Chlorothalonil...750 g/kg
Chất phụ gia.....250 g/kg

Hãng sản xuất:
Yunnan Chemical Works, Zhanghe Pesticide Branch.

Đặc tính – Công dụng:

- Thalonil 75WP có tác động tiếp xúc, bám dính tốt, hạn chế bị rửa trôi khi gặp mưa. Hiệu lực trừ bệnh cao, kéo dài, không để lại vết thuốc trên lá và quả.
- Hoạt chất Chlorothalonil được đăng ký trong danh mục thuốc BVTV phòng trừ nấm bệnh phổ rộng như: đốm vòng/cà chua; sương mai/dưa hấu, vải thiều, đốm lá/hành, thán thư/xoài, điều...

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Bệnh hại	Liều dùng
Cam, chanh, bưởi, quất (tắc)	Ghẻ lá, ghẻ trái	Pha 40 - 50g /bình 25 lít.
Đào, dâu tây, hồng quả, nhãn, nho, táo, thanh long, vải...	Đốm lá, thán thư	
Cà chua, cà tím, cà pháo...	Mốc sương, sương mai	
Dưa các loại	Mốc sương, thán thư	
Đậu các loại	Đốm lá, nấm trắng	
Hồ tiêu	Đốm lá	Pha 50 - 75g/bình 20 lít.

Lưu ý:

- Thời gian cách ly: 7 ngày sau khi phun.
- Không phun khi cây đang có hoa.
- Không phun khi trời sắp mưa to.
- Trường hợp bệnh nặng nên phun lặp lại sau 5 – 7 ngày.

Trinong 50WP

Thaythế:CarbemdazTopsin

Hoạt chất:

Prochloraz-Manganese complex 50% w/w
Phụ gia đặc biệt 50% w/w

Hãng sản xuất:

Ace Bioscience Pte Ltd (Singapore)

Đặc tính – Công dụng:

- Trinong 50WP chứa hoạt chất Prochloraz-Manganese complex là thuốc trừ bệnh tiên tiến; duy nhất hiện nay đăng ký tại Việt Nam. Prochloraz-Manganese complex vừa tạo lớp màng bảo vệ vừa lưu dẫn mạnh trong cây, ức chế tổng hợp Ergosterol của nấm bệnh. Thuốc có tác dụng phổ rộng, phòng và trừ nhiều loại nấm bệnh khác nhau trên nhiều loại cây trồng khác nhau.
- Ngoài ra thuốc còn được sử dụng để bảo quản trái cây (trừ thanh long).

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Bệnh hại	Liều lượng và cách dùng
Lúa	Đạo ôn, lem lép hạt, khô vằn, thối thân	Pha 20 g/bình 16–20 L nước. Bệnh nặng pha 30 g/bình Pha 200 g/ 1 phi 200 lít nước
Hành	Đốm lá	
Dâu tây, hoa hồng	Thán thư, phấn trắng, mốc xám (nấm lông chuột)	
Chanh dây	Đốm nâu (bã trầu)	
Cà Chua	Đốm vòng, thán thư	
Cam	Thán thư, thối đầu trái (rụng trái)	
Hoa cúc	Đốm nâu	

Lưu ý:

- Thời gian cách ly: 7 ngày.
- Không phun cho nho ghép, xoài ghép khi cây đang có hoa hoặc trái non.
- Không phun khi trời sắp mưa to.
- Trường hợp bệnh nặng nên phun lặp lại sau 5 – 7 ngày.
- Khi cây còn nhỏ, cây trồng nhà kính, xịt bằng máy áp lực thì pha 10 – 15 g/ bình 20 lít.

KINH NGHIỆM PHỐI TRỘN CỦA NHÀ NÔNG:

1. Trinong 50WP + Downy 650WP (Hoạt chất: Isoprothiolane + Tricyclazole)

Cây trồng	Bệnh hại	Liều dùng
Lúa	Đạo ôn	Trinong 20–30g + Downy 30–50g /bình 20 lít

2. Trinong 50WP + Gone Super 350EC (Hoạt chất: Difenoconazole + Propiconazole + Tebuconazole)

Cây trồng	Bệnh hại	Liều dùng
Lúa	Đạo ôn, lem lép hạt	Trinong 20g + Gone super 5–10ml /bình 20 lít
Dâu tây, rau màu, cây ăn trái, dưa các loại…	Mốc xám, đốm lá, chết dây…	Trinong 20g + Gone super 5–10ml /bình 20 lít

3. Trinong 50WP + Bisomin 2SL (Hoạt chất: Kasugamycin 20g/lít)

Cây trồng	Bệnh hại	Liều dùng
Các loại cây trồng	Mốc xám, khuẩn (Xì mủ)…	Trinong 20g + Bisomin 50–100ml /bình 20 lít

Đốm lá hành

Đốm lá, thán thư hoa hồng

Đốm vòng cà chua

Mốc xám hoa hồng

Đạo ôn

Lem lép hạt

Thán thư dâu tây

Thán thư chanh dây

THUỐC TRỪ NẤM BỆNH, NHỆN

SOCCARB 80WG

BMC SULFUR 80WG

Komulunx 80WG GOLD

Hoạt chất: Sulfur 80% w/w + Phụ gia đặc biệt vừa đủ 1 kg
Hãng sản xuất: M/S Sunrise Agro Industries

Đặc tính – Công dụng:

- Soccarb 80WG chứa hoạt chất Sulfur có tác động tiếp xúc và xông hơi.
- Soccarb 80WG có tác dụng phòng trừ nấm bệnh phổ rộng và các loài nhện gây hại cây trồng như: Phấn trắng trên xoài, đốm lá đậu phộng (lạc), hiệu quả với các loại nhện gié (rụp gié, nhện bạc)… đồng thời bổ sung lưu huỳnh (S) giúp cây phát triển tốt, hạt, trái đẹp, gia tăng năng suất

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Sâu hại	Liều dùng
Bưởi, cam, chanh, quất (tắc)	Ghẻ, nhện đỏ	Pha 50–100g /bình 20 lít
Dâu tây, hoa hồng, ớt	Nhện đỏ, phấn trắng	
Cà phê, hành hoa	Rỉ sắt	
Dâu tằm	Trắng trái	
Nho, Xoài	Phấn trắng	
Đào, nhãn	Phồng lá, xoăn lá	Pha 200–400g/bình 20 lít

Lưu ý:

- Không sử dụng sản phẩm trong nhà kính (chất lưu huỳnh có thể gây hỏng mái).
- Không phun khi có gió lớn hoặc trời sắp mưa to.
- Phun thuốc lúc sáng sớm hoặc chiều mát để đạt kết quả tốt nhất.
- Thời gian cách ly: 7 ngày sau khi phun.

PHA TRỘN SOCCARB 80WG VỚI CÁC SẢN PHẨM SAU ĐỂ GIA TĂNG HIỆU QUẢ PHÒNG TRỪ BỆNH CÂY:

1. Soccarb 80WG + Downy 650WP (Hoạt chất: Isoprothiolane 250g/kg + Tricyclazole 400g/kg)

Cây trồng	Bệnh hại	Liều dùng
Lúa	Đạo ôn	Bacca 25–50g + Downy 25–50g/bình 20 lít

2. Soccarb 80WG + Gone Super 350EC

(Hoạt chất: Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 50g/l + Tebuconazole

Cây trồng	Bệnh hại	Liều dùng
Cây ăn trái, rau màu…	Đốm lá, phấn trắng	Bacca 50–100g + Gone super 5–10ml/bình 20 lít

THUỐC TRỪ NẤM BỆNH, NHỆN

HARUKO 5SC | ZEROANVIL | HoangANHVIL 50SC | MEKONGVIL 5sc

Hãng sản xuất: M/s Meenalshi Agro Chemicals

Hãng sản xuất: Crop Life Science Ltd

Hãng sản xuất: Binapuri Sakti Sdn, Bhd

Hoạt chất: Hexaconazole 5%w/w (50g/lít) + Phụ gia đặc biệt vừa đủ 1lít

ĐẶC TRỊ NẤM BỆNH TRÊN CÂY TRỒNG

Đặc tính – Công dụng:

- Hexaconazole có tính nội hấp lưu dẫn thấm sâu, làm khô nhanh vết bệnh, ngăn ngừa nấm bệnh lây lan. Bảo vệ cây trồng từ gốc tới ngọn, đặc biệt thuốc còn giúp cây có bộ lá xanh hơn.
- Đặc trị: Nấm hồng, phấn trắng, rỉ sắt, thán thư, khô vằn, lem lép hạt, đốm mắt cua, sương mai, cháy bìa lá lúa…

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Bệnh hại	Liều dùng
Cây ăn trái: Dâu tây, nho, táo, xoài	Đốm nâu, đốm trái, rỉ sắt	Pha 20–50ml /bình 20 lít
Cây công nghiệp: Đậu, cao su, chè (trà)	Phấn trắng, thán thư	
Cây rau màu: Khoai tây, ớt	Sương mai, thán thư	
Lúa	Khô vằn, lem lép hạt	

Lưu ý:

- Không phun khi cây đang có hoa và khi trời sắp mưa to.
- Trường hợp bệnh nặng nên phun lặp lại sau 5–7 ngày.
- Thời gian cách ly: 7 ngày trước khi thu hoạch.

KINH NGHIỆM PHỐI TRỘN CỦA NHÀ NÔNG:

1. Hexaconazole + Downy 650WP (Hoạt chất: Isoprothiolane 250g/kg + Tricyclazole 400g/kg)

Cây trồng	Bệnh hại	Liều dùng
Lúa	Đạo ôn, khô vằn	Hexaconazole 25–50ml + Downy 25–50g/bình 20 lít

2. Hexaconazole + Varison 5WP (Hoạt chất: Validamycin 5% w/wl)

Cây trồng	Bệnh hại	Liều dùng
Lúa	Đạo ôn, khô vằn	Hexaconazole 25–50ml + Varison 25–50g/bình 20 lít

3. Hexaconazole + Bp-nhepbun 800WP (Hoạt chất: Zineb

Cây trồng	Bệnh hại	Liều dùng
Lúa, nho, chè, bắp cải, súp lơ, su hào, hoa mai, rau họ thập tự, táo…	Đạo ôn, đốm nâu, đốm vằn, nấm hoa vàng, đốm đen, phồng lá, đốm lá, khô bìa lá	Hexaconazole 40–50ml + Bp-nhepbun 800WP 50–75g /bình 20 lít

THUỐC TRỪ BỆNH

HARIWON 30SL

SỐ 1 TRỊ NẤM BỆNH TRONG ĐẤT

CÔNG NGHỆ NHẬT BẢN

Hoạt chất:
Hymexazol: .....30% w/w
Phụ gia đặc biệt:...70%w/w

Hãng sản xuất:
Weifang Huanuo Biotechnology Co., Ltd.

Đặc tính – Công dụng:

- Hariwon 30SL chứa hoạt chất trừ bệnh trong đất tiên tiến mới nhất hiện nay là Hymexazol. Hymexazol được phát minh tại Nhật Bản, có tác dụng phòng trừ các loại nấm trong đất như Phytium, fusarium, Phytophthora… gây ra bệnh thối rễ, lỡ cổ rễ, chạy dây, chết con, tuyến trùng, héo xanh... Thuốc còn có tác dụng kích thích hạt giống và cây phát triển bộ rễ.

- Ngoài ra, thuốc giúp bà con nông dân xử lý đất, trừ nấm bệnh trước khi gieo trồng, giúp trồng được nhiều vụ rau, hoa lặp đi lặp lại trong năm, cây trồng phát triển tốt không bị bệnh về sau.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Bệnh hại	Liều lượng	Cách dùng
Lúa.	Điều hoà sinh trưởng, ngâm ủ hạt giống	Pha 20ml thuốc cho 500ml nước.	Trộn đều với thóc, sau đó ngâm ủ theo tập quán. Giúp phòng trừ bệnh cho lúa và kích rễ.
Ớt, dưa hấu, dưa leo, hoa cúc, hoa hồng, khoai lang, khoai tây, khoai mì, cà chua, cà tím, mía, đậu nành, dâu xanh, dâu tây.	Héo rũ, chết cây con, héo vàng, thối gốc, lở cổ rễ.	Pha 15 - 20ml /bình 20L nước.	Tưới xử lý đất trước khi gieo trồng cây; hoặc phun, tưới gốc cây khi vết bệnh mới xuất hiện. Lượng nước tưới gốc đảm bảo thấm tới đất mà phần rễ cây trồng phát triển.
Thuốc lá.	Thối thân đen		
Lúa.	Lúa von, thối gốc, héo rũ, chết cây con		
Khoai tây, khoai lang.	Thối đen, ghẻ sẹo		

THUỐC TRỪ BỆNH

Cây trồng	Bệnh hại	Liều lượng	Cách dùng
Gừng, riềng, nghệ, củ cái, tỏi, khoai tây, đậu phộng, cà rốt, khoai lang, khoai sọ, hoa ly, khoai môn, khoai mì, hành	Thối củ	Pha 15 - 20ml /bình 20L nước.	Tưới xử lý đất trước khi gieo trồng cây; hoặc phun, tưới gốc cây khi vết bệnh mới xuất hiện. Lượng nước tưới gốc đảm bảo thấm tới đất mà phần rễ cây trồng phát triển.
Hồ tiêu, cà phê, sầu riêng, cam, quýt, bưởi, cây ăn trái, thanh long, rau màu.	Bệnh nấm rễ, thối gốc, thối rễ, chết nhanh, chết chậm.		
Bắp cải	Đen gốc, lở cổ rễ		
Dâu tây	Mốc xám		
Bãi cỏ	Thối gốc, héo rũ		
Rau màu, cây ăn trái	Bị úng ngập nước gây ra vàng lá, thối rễ	Pha 15 - 20ml /bình 20L nước.	Tưới/phun dưới gốc cây, ngay sau khi nước rút.
Xử lý đất trước khi trồng trọt, diệt trừ mầm bệnh trong đất cho mùa vụ sau		Pha 25 - 50ml /bình 20L nước.	Tưới đều ướt đẫm mặt đất. Gieo trồng sau 7-10 ngày xử lý đất.

Lưu ý:

- Không phun thuốc khi trời sắp mưa hoặc có gió lớn.

- Thời gian cách ly: 7 ngày sau khi phun.

THUỐC TRỪ BỆNH

TOSHIRO 10EC

SẠCH BỆNH XANH CÂY

Hoạt chất:
Penconazole.....10% w/w
Phụ gia đặc biệt....90% w/w

Hãng sản xuất:
Jiangsu henben Biochemical Co., Ltd

Đặc tính – Công dụng:

- Penconazole là thuốc hoạt chất gốc Triazoles mới tiên tiến, thấm sâu, lưu dẫn trong cây trồng, di chuyển hướng ngọn trong mô thực vật, với phổ tác động rộng diệt trừ nhiều loại nấm bệnh khó trị.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Bệnh hại	Cách dùng	Liều lượng
Sầu riêng	Vàng lá, thối rễ, đốm lá	Phun, kết hợp tưới	Pha 20 – 25ml /bình 20 lít. Phun (tưới) khi bệnh vừa mới xuất hiện.
Khoai tây	Mốc sương	Phun xịt ướt đều tán lá cây trồng.	
Chuối	Héo vàng		
Khoai lang	Chết dây		
Hành, tỏi, gừng, riềng, cà rốt	Thối củ, đốm lá		
Dưa hấu, bắp cải, dâu tây	Héo rũ, thối thân, mốc trắng, mốc xám, phấn trắng		
Hoa hồng	Đốm đen lá, phấn trắng		
Lúa	Đạo ôn, khô vằn, thối thân, lem lép hạt.		
Cam, quýt	Ghẻ, sẹo		
Cà phê	Rỉ sắt		
Hoa cúc	Đốm mắt cua		
Điều, dưa hấu	Thán thư		
Thuốc lá	Muội đen, đốm nâu		

Lưu ý:

- Không phun thuốc khi trời sắp mưa hoặc có gió lớn.
- Lượng nước: Phun từ 400 – 500 lít/ha.
- Thời gian cách ly: 7 ngày sau khi phun.

THUỐC TRỪ BỆNH

Shonam® 500SC

Quản lý nấm bệnh phổ rộng

- Hiệu quả cao - Không gây kháng chéo.
- Giải pháp mới - An Toàn hoa trái.

Hoạt chất:
Fluazinam.....500g/L
Special additives....500g/L

Hãng sản xuất:
Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.

Đặc tính – Công dụng:

- Hoạt chất **Fluazinam** là thuốc dùng để quản lý nấm bệnh phổ rộng có tác động tiếp xúc mạnh và thấm sâu nhanh, ức chế tất cả các giai đoạn phát triển của nấm bệnh, bảo vệ cây trồng toàn diện.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Bệnh hại	Liều lượng
Lúa	Đạo ôn, khô vằn	Sử dụng 1,0 lít/ha. Pha 24ml/bình 20 lít nước. Pha 1 chai 240ml/200 lít nước. Lượng nước phun từ 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5%.
Nho	Phấn trắng, mốc sương	
Bắp cải	Sưng rễ	
Dưa hấu	Giả sương mai	
Lạc (đậu phộng)	Đốm lá	
Khoai tây	Mốc sương	

Lưu ý:

- **Thời điểm: Phun khi bệnh chớm xuất hiện vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát.**
- **Thời gian cách ly: 7 ngày sau khi phun.**

THUỐC TRỪ BỆNH, ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG

Hiệu

Paskin® 250

PYROLAX 250EC

Diệt sạch nấm bệnh
Tăng năng suất cây trồng

Hoạt chất:
Pyraclostrobin 250g/L
Special additives.....750g/L

Hãng sản xuất:
Yongnong Bioscience Co., Ltd.

Đặc tính - Công dụng:

- Pyraclostrobin là hoạt chất diệt nấm bệnh, kích thích sinh trưởng cây trồng phổ biến đối với axit methacrylic, có cấu trúc pyrazalo. Hoạt chất làm ức chế ti thể, hô hấp dẫn đến chết tế bào, giúp diệt nấm bệnh phổ rộng, cải thiện sức đề kháng, thúc đẩy quá trình sinh trưởng cây trồng, làm tăng lượng diệp lục tố giúp cây có bộ lá xanh lá hơn.

Hướng dẫn sử dụng trừ bệnh:

Cây trồng	Bệnh hại	Liều lượng
Lúa	Đạo ôn, lem lép hạt	Pha 20-25ml/bình 20 lít. Phun từ 500-800 lít/ha.
Cà chua, dưa leo	Đốm vòng, phấn trắng, thán thư	
Cà phê, hồ tiêu	Thán thư	

- Phun ướt đều 2 mặt lá khi vết bệnh vừa mới xuất hiện, tỷ lệ khoảng 5%.
- Nên phun lúc sáng sớm hoặc chiều mát.

Hướng dẫn sử dụng điều hòa sinh trưởng:

Cây trồng	Bệnh hại	Liều lượng
Ngô	Xử lí hạt giống, điều hòa sinh trưởng	Pha 20ml/bình 20 lít. Phun từ 500-600 lít/ha.
Lúa, hồ tiêu	Điều hòa sinh trưởng	
Lạc (đậu phộng)		
Cà phê, tương đậu		

- Phun cây khi bắt đầu ra hoa và khi cây hình thành củ.
- Nên phun lúc sáng sớm hoặc chiều mát.

Thời gian cách ly: 14 ngày trên Lạc (đậu phộng).
45 ngày trên Cà phê.
7 ngày trên Hồ tiêu.

THUỐC TRỪ BỆNH TOPXIM PRO 30SC

TOPXIM PRO 30SC

Thay thế
CARBENDAZIM

Hoạt chất: Kresoxim-methyl 30% w/w + Phụ gia đặc biệt 70% w/w
Hãng sản xuất: Shaanxi Dongpeng Kaiyuan Agricultural Technology Co., Ltd

Đặc tính - Công dụng:

Sản phẩm là thuốc trừ bệnh phổ rộng thế hệ mới nhất, có tác dụng nội hấp, lưu dẫn phổ rộng phòng từ nhiều loại bệnh hại trên cây trồng, rau màu, cây ăn trái. Hiệu quả cao và kéo dài. Đặc trị các loại bệnh như: Sương mai, đạo ôn, rỉ sắt (nấm cóc), đốm lá, đốm vòng, đốm mắt cua, phấn trắng, mốc xám (nấm lông chuộc), cháy lá, thán thư,...

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Bệnh hại	Liều lượng
Lúa	Đạo ôn, khô vằn, cháy lá	0.75 lít/ha Pha từ 20-25ml cho bình 20-25 lít nước
Xoài, ớt, thanh long, nhãn, nho, hành, đậu côve, đậu đũa, dưa hấu, điều	Thán thư, phấn trắng, đốm lá	
Cà chua, dưa hấu, rau củ	Sương mai, đốm vòng, mốc xám	
Cam, chanh, bưởi, hoa đào, dâu tây	Đốm lá, ghẻ sẹo, đốm đen	
Rau muống, rau dền	Rỉ trắng	
Ớt, mồng tơi, đậu đũa	Đốm mắt cua	
Hồ tiêu	Chết nhanh, đốm lá	

Lưu ý:

- Lượng nước phun từ 500-600 lít/ha. Phun thuốc vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát khi bệnh mới xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 5%.
- Phun ướt đều tán lá cây trồng khi bệnh vừa chớm xuất hiện (nếu bệnh nặng nên tăng liều phù hợp hoặc phun lặp lại sau 7 ngày để đạt hiệu quả cao nhất).
- Thời gian cách ly: 7 ngày sau khi phun.

THUỐC TRỪ BỆNH

IC-TOP 28.1SC
BOÓCDOR

JAS Sản phẩm đạt Tiêu chuẩn hữu cơ Nông nghiệp Nhật Bản

Hoạt chất: Brodeaux mixture 3.7% w/w Cu + Phụ gia đặt biệt...96.3% w/w
Hãng sản xuất: Inoue Calcium Corporation (Japan)

Đặc tính - Công dụng:

- BOÓCDOR là thuốc trừ nấm bệnh vi khuẩn hỗn hợp giữa Đồng và Vôi, sản phẩm có tác dụng tiếp xúc, độ bám dính cao, hạn chế tối đa việc rửa trôi do mưa, nâng cao hiệu quả phòng trừ nấm bệnh và vi khuẩn trên nhiều loại cây trồng.
- Sử dụng BOÓCDOR sau thu hoạch để xả bớt lá già, lá trị bệnh. Đồng thời giúp tẩy sạch rong rêu, tảo đỏ và các loại nấm bệnh trên cây, bảo vệ cây trồng trước khi vào mùa vụ mới.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Bệnh hại	Liều lượng
Lúa, nho, cam, quýt, xoài, nhãn, hành, cà chua, bắp, cải, vải, hoa các loại, cây mơ, tỏi, cà rốt, dâu tây, rau cải, khoai môn, măng tây, dưa hấu, cao su, cà phê, bưởi, khoai tây, măng tây, thanh long, trà (chè), cây đào,...	Bạc lá, đạo ôn, khô vằn, loét vi khuẩn, phấn trắng, mốc sương, sên nhớt, sên vỏ mỏng, đốm lá, đốm nâu, nấm hồng, lở cổ rễ, thán thư, cháy lá, mốc xám, rỉ sắt, đốm mắt cua, sương mai, thối nhũn, nứt thân, ghẻ sẹo, héo rủ, thối củ, xì mủ,...	Cách pha: Pha theo tỷ lệ 1:50-100 (1kg cho 50-100 lít nước). Lượng nước: Phun từ 600-800 lít/ha.

Lưu ý: Không sử dụng trên cây trồng khi đang ra hoa, mầm non, trái non.

- Pha tỷ lệ sẽ căn cứ vào cây trồng, tuổi cây, giai đoạn sinh trưởng, và tình hình dịch bệnh để sử dụng cho thích hợp.
- Sản phẩm sử dụng được trên máy bay Drone.
- Khi cây bị bệnh nặng, hỗn hợp với sản phẩm sau để phòng trừ: Niko 72WP (Mancozeb 64% w/w + Cymoxanil 8% w/w), Tatsu 25WP (Metalaxyl 25% w/w).
- Không phun thuốc khi trời sắp mưa và có gió lớn.
- Thời gian cách ly: 5 ngày sau khi phun.

THUỐC TRỪ BỆNH AFENZOLE 325SC

Afenzole Top 325SC

Asmilka Top® 325SC

Mới
Mạnh hơn

Hoạt chất: Azoxystrobin 200g/lít + Difenoconazole 125g/lít
Hãng sản xuất: Shandong United Pesticide Industry Co., Ltd.

Đặc tính - Công dụng:

Sản phẩm là sự kết hợp 2 hoạt chất trừ bệnh có khả năng lưu dẫn mạnh trong cây trồng giúp phòng trừ các loại nấm bệnh gây hại. Thuốc có tác dụng gây ức chế sự nẩy mầm của bào tử và sự sinh trưởng của sợi nấm.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Bệnh hại	Liều lượng
Lúa	Lem lép hạt, khô vằn, đạo ôn	Sử dụng 0.06%. Pha 25ml/bình 25 lít nước. Lượng nước phun từ 600-800 lít/ha. Phun khi tỷ lệ bệnh mới xuất hiện, tỷ lệ khoảng 5%.
Lạc (đậu phộng)	Chết cây con	
Hoa hồng, dâu tây	Thán thư, phấn trắng	
Cao su	Vàng lá, nứt vỏ	
Cà phê, hồ tiêu	Rỉ sắt, tháng thư	
Ngô (bắp), sầu riêng, xoài	Kho vằn, rỉ sắt, đốm lá	

Lưu ý:

Không phun khi trời sắp mưa to và có gió lớn.
Thời điểm: Phun vào sáng sớm hoặc chiều mát để đạt hiểu quả cao.
Thời gian cách ly: 7 ngày sau khi phun.

Mi Stop 350SC

TỐT HƠN - ĐẬM ĐẶC HƠN
Loại thông thường 325SC

Hoạt chất:
Azoxystrobin.....200g/lít
Difenoconazole.....150g/lít

Hãng sản xuất:
Jiangyin Jianglian Chemical Co., Ltd
Guangxi Hui Feng Biotechnology Co., Ltd

BAO XÀI

Đặc tính - Công dụng:
- Mi Stop 350SC ngăn cản sự tổng hợp Acid amin của tế bào nấm và ức chế tổng hợp Ergosterol.
- Mi Stop 350SC là thuốc trừ bệnh nội hấp, lưu dẫn mạnh để kiểm soát bệnh hại trên cây trồng.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Bệnh hại	Liều lượng
Đào, mơ, nho	Mắt cua, thán thư	0.25 - 0.3 lít/ha. Pha 20 - 25ml bình 20 - 25 lít nước.
Dâu tây, dưa lê, lạc (đậu phộng), vải, hoa hồng, hồng quả, cao su	Phấn trắng, mốc sương, chết cây con, vàng lá,...	
Cà phê, tía tô, tỏi	Thán thư, mốc xám	
Lúa	Lem lép hạt, đạo ôn	Pha 20 - 40ml/bình 20 lít
Ớt	Thối gốc	Pha 20 - 30ml/bình 20 lít

Lưu ý:
- Không phun khi cây đang có hoa, không phun khi trời sắp mưa to, trường hợp bệnh nặng phun lặp lại sau 5 - 7 ngày.
- Đối với cây nhạy cảm: Đủ đủ, dưa, bầu bí và cây ghép: Nho ghép, xoài ghép, vải chín sớm, phun bằng máy áp lực cần giảm liều pha cho phù hợp.

THUỐC TRỪ BỆNH SANBANG 30SC

Hiệu **NATICUR®**

DẠNG SỮA

Hơn cả mong đợi

Hoạt chất:
Tebuconazole 20%w/w
Trifloxystrobin 10%w/w
Special additives..... 70%w/w

Hãng sản xuất:
Shanghai Shengnong Pesticide Co., Ltd.

Đặc tính - Công dụng:

- Sản phẩm là hỗn hợp của 2 hoạt chất Tebuconazole và Trifloxystrobin có tác dụng nội hấp, lưu dẫn mạnh, gây ức chế hô hấp của sợi nấm, ngăn chặn sự hình thành bào tử và phát triển của nấm bệnh.
- Sản phẩm đặc trị Lem lép hạt, khô vằn, đạo ôn/ lúa; rỉ sắt/ cà phê, lạc, đậu tương; thán thư/ hoa hồng, điều, cà phê; đốm lá/ hoa cúc, hồ tiêu; phấn trắng/ hoa hồng; thán thư, bệnh sọc đen/ ca cao; đốm vòng/ khoai tây; khô văng, đốm lá/ ngô,...

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Bệnh hại	Liều lượng
Lúa	Lem lép hạt, khô vằn, đạo ôn	Sử dụng 0.1% Pha 15 - 30ml/ bình 18 - 25 lít nước.
Cà phê, lạc, đậu tương, hoa cúc, tiêu	Rỉ sắt, đốm lá	
Hoa hồng, điều, cà phê	Thán thư, phấn trắng	
Cao cao, khoai tây	Thán thư, sọc đen, đốm vòng	
Ngô (bắp)	Khô vằn, đốm lá	

Lưu ý:

- Lượng nước phun từ 700 - 1.000 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 5%.
- Phun vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát để đạt hiệu quả cao nhất.
- Thời gian cách ly: 7 ngày sau khi phun.

THUỐC TRỪ BỆNH

KING-CIDE JAPAN 460SC

3 TÁC ĐỘNG LỚP BẢO VỆ
- LƯU DẪN
- THẤM SÂU
- SẠCH BỆNH

JAPAN 460

SẠCH BỆNH - SÁNG BÔNG - XANH LÁ

Hoạt chất: Azoxystrobin 200g/L
Hexaconazole 40g/L + Tricyclazole 220g/L

Hãng sản xuất: Guangxi Hui Feng Biotechnology Co., Ltd
King Tech Corporation, Meghmani Organics Ltd

Đặc tính - Công dụng:

Sản phẩm là thuốc trừ bệnh kết hợp từ 3 hoạt chất Azoxystrobin, Hexaconazole và Tricyclazole. Với khả năng lưu dẫn cao và tác động nội hấp mạnh, thuốc có hiệu quả phòng trừ nhiều loại bệnh như đạo ôn, khô vằn, mốc sương, đốm lá, rỉ sắt, thán thư, phấn trắng, bệnh giả sương mai, bệnh nấm hồng,...

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Bệnh hại	Liều lượng
Lúa	Lem lép hạt, khô vằn, đốm nâu,đạo ôn,...	0.4 lít/ha. Pha 20 - 25ml/ bình 20 - 25 lít nước.
Cà phê	Nấm hồng, rỉ sắt, thán thư	
Xoài, sầu riêng	Thán thư	
Cao su	Vàng lá, rụng lá, phấn trắng, nấm hồng	
Cam, quýt, bưởi,...	Ghẻ sẹo	
Hoa cúc, hoa hồng	Đốm lá, phấn trắng	
Dưa leo, ớt, cà chua,...	Đốm vòng, phấn trắng, thán thư,...	

Lưu ý:

- Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun khi lúa trổ lác đác và khi lúa đã trổ đều.
- Phun vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát lúc trời không có gió và mưa to.
- Thời gian cách ly: 14 ngày sau khi phun.

THUỐC TRỪ BỆNH MITOP ONE 390SC

Hiệu

HELLO FUNG 400

Mới

TRỪ BỆNH TỔNG HỢP

SỨC MẠNH 3 HOẠT CHẤT

Hoạt chất: Azoxystrobin 210g/L
Hexaconazole 50g/L + Difenoconazole 130g/L

Hãng sản xuất: Guangxi Hui Feng Biotechnology Co., Ltd
King Tech Corporation, Jiangyin Jianglian Chemical Co., Ltd.

Đặc tính - Công dụng:

- Mitop One 390SC là hỗn hợp thuốc trừ nấm bệnh thế hệ mới có công thức tiên tiến đột phá với 3 thành phần hoạt chất có tính Tiếp xúc, Nội hấp, Lưu dẫn mạnh, đặc trị bệnh đạo ôn, lem lép hạt trên lúa.
- Với cơ chế tác động mới là "Tiêu diệt Nấm bệnh trước khi xâm nhiễm vào cây trồng", ngăn chặn nấm bệnh tiết ra độc tố gây hại cho cây, bông, trái, rễ cây.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Bệnh hại	Liều lượng
Lúa	Lem lép hạt, khô vằn, đạo ôn	0.4 lít/ha. Pha 20 - 25ml/ bình 20-25 lít nước.
Hồ tiêu	Chết nhanh	
Cà phê	Khô cành, khô quả, rỉ sắt, thán thư	
Đậu phộng (lạc)	Đốm lá, rỉ sắt	
Khoai tây	Mốc sương, sương mai	

Lưu ý:

- Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi lúa chuẩn bị trổ và vừa trổ đều hoặc khi bệnh vừa chớm xuất hiện.
- Phun vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát lúc trời không có gió và mưa to.
- Thời gian cách ly: 7 ngày sau khi phun.

THUỐC TRỪ BỆNH SHINAWA 400EC

Hoạt chất:
Flusilazole 400g/L
Dung môi và phụ gia 600g/L

Hãng sản xuất:
Hebei Guanlong Agrochemical Co., Ltd

Đặc tính - Công dụng:

- Shinawa 400EC là thuốc trừ nấm bệnh thế hệ mới thuộc nhóm Triazole, có tính nội hấp mạnh nên ít bị rửa trôi do nước mưa, Thuốc có tác động phổ rộng, phòng trị hiệu quả nhiều loại bệnh hại trên nhiều loại cây trồng như: Lem lép hạt/ lúa, phấn trắng, rỉ sắt, nấm cóc, thán thư, đốm lá, đốm lá Sigatoka (đốm lá, đốm đen)/ lá chuối, ghẻ sẹo/ cam, đốm lá mắt cua,...
- Đặc biệt, thuốc có hiệu quả cao đối với bệnh lem lép hạt. Giữ cho lá lúa màu mỡ gà, dày, đứng, giữ bộ lá đòng xanh đến ngày thu hoạch.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Bệnh hại	Liều lượng
Lúa	Lem lép hạt, khô vằn, đạo ôn,...	Sử dụng 0.03%. Pha từ 6 - 10ml bình 20 lít nước.
Chuối	Đốm lá Sigatoka (Đốm vàng, đốm đen)	
Cà phê, sầu riêng, dâu tây	Rỉ sắt, đốm mắt cua, phấn trắng	
Đậu tương, cà chua, ớt, dưa	Đốm lá, thán thư, phấn trắng	
Hoa đào, hoa cúc, hoa hồng	Thán thư, đốm lá, nấm cóc, phấn trắng	
Cam, chanh, bưởi	Ghẻ sẹo	

Lưu ý:

- Lượng nước phun từ 500 lít/ha.
- Phun thuốc khi lúa bắt đầu trổ, phun lần 2 khi lúa trổ đều.
- Phun vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát lúc trời không có gió và mưa to.
- Thời gian cách ly: 14 ngày sau khi phun.

THUỐC TRỪ BỆNH GONE SUPER 350EC

Gone Super 350EC

Đặc trị:
Lem lép hạt trên lúa
và rỉ sắt trên cà phê

Teen Super® 350EC

Mới Mạnh hơn

Hoạt chất: Difenoconazole 150g/lít + Propiconazole 50g/lít + Tebuconazole 150g/lít
Hãng sản xuất: Hebei Bestar Commerce and Trade Co., Ltd

Bông dày chắc hạt, mùa vụ chắc ăn

Đặc tính:

- Difenoconazole, Propiconazole và Tebuconazole ức chế tổng hợp acid amin, ức chế quá trình hô hấp của nấm bệnh và làm khô vết bệnh nhanh chóng.
- Thuốc ngấm sâu vào bên trong mô lá, hạn chế bị rửa trôi khi trời mưa và có tác dụng kéo dài. Hiệu quả cao đối với một số bệnh lây truyền qua hạt giống.

Công dụng:

- Trị đốm nâu, đốm lá, đốm đen trái trên cây đào, hồng quả, lê-mơ. Trị ghẻ trên cam và ghẻ củ khoai tây. Mốc xám trên nho, thán thư trên ớt. Trị đạo ôn, lem lép hạt trên lúa.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Bệnh hại	Liều lượng
Cây đào, hồng lê, mơ, ớt	Đốm đen, đốm vòng, thán thư	Pha 10-15ml/bình 25 lít. Cây non pha 5-10ml/bình 25 lít.
Cam, khoai tây	Ghẻ cam, ghẻ khoai	
Nho	Mốc xám	
Lúa	Đạo ôn, khô vằn, lem lép hạt, bệnh nấm hoa vàng	Pha 10-20ml/bình 25 lít. Phun ngừa hoặc phun bằng máy áp lực, pha 100ml/phi 200 lít. Phun từ 400-600 lít/ha.
Cà phê	Rỉ sắt	

Lưu ý: Thời gian cách ly 7 ngày sau khi phun.

- Không phun khi cây có hoa.
- Trường hợp bệnh nặng nên phun lặp lại sau 5 - 7 ngày.

THUỐC TRỪ BỆNH

Bretil Super

Thụy Sĩ Inspiration + 300 EC

Hoạt chất:
Difenoconazole:.....150g/lít
Propiconazole:.....150g/lít
Phụ gia và dung môi:.....700g/lít

Hãng sản xuất:
Jiangyin Jianglian Chemical Co., Ltd

Đặc tính - Công dụng:

- Bretil Super 300EC ức chế hoạt tính của Enzyme cần thiết cho quá trình khử các Alpha-Methyl,... thành Ergosterol là Sterol chính của tế bào nấm. Lượng Ergosterol bị giảm sẽ làm thay đổi tính chất và chức năng của tế bào nấm.
- Bretil Super 300EC có tác dụng diệt nấm trực tiếp lên trên màng tế bào của nấm bệnh.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Bệnh hại	Liều lượng
Hành hoa, hành tây	Thối gốc	Pha 20-30ml/bình 20 lít
Lúa	Đốm vằn, nấm hoa vàng	Pha 20-40ml/bình 20 lít
Mơ	Nấm mốc nâu	
Ngô	Nấm hạt, tiêm lửa	
Ớt	Thối gốc	Pha 20-30ml/bình 20 lít

Lưu ý:

- Thời gian cách ly: 14 ngày sau khi phun.
- Không phun khi cây đang có hoa, không phun khi trời sắp mưa to, trường hợp bệnh nặng phun lặp lại sau 5 - 7 ngày.
- Đối với cây nhạy cảm: Đu đủ, dưa, bầu bí và cây ghép: nho ghép, xoài ghép, vải chín sớm, phun bằng máy áp lực cần giảm liều pha cho phù hợp.

THUỐC TRỪ BỆNH DOWNY 650WP

Downy 650WP

Hiệu ĐÙM XPRO 650WP

Hoạt chất: Isoprothiolane 250g/kg + Tricyclazole 400g/kg
Hãng sản xuất: CMI (UK) Pte Ltd (Singapore)

ĐẶC TRỊ: ĐẠO ÔN LÁ, ĐẠO ÔN CỔ BÔNG, THỐI CỔ GIÉ,...

Đặc tính - Công dụng:

- Sản phẩm là thuốc trừ nấm bệnh cao cấp ngăn chặn sự tổng hợp Ergosterol, ức chế quá trình hô hấp của nấm bệnh làm khô vết bệnh nhanh chóng.
- Hoạt chất Isoprothiolane và Tricyclazone có tác dụng nội hấp, không sợ bị rửa trôi hoặc giảm hiệu lực nếu gặp phải trời mưa, thuốc phòng trừ diệt bệnh đạo ôn (đạo ôn lá, cháy lá, thối cổ gié, đạo ôn cổ bông,...) hại lúa.
- Đặc biệt thuốc còn giúp mát lúa, xanyh lá đòng, cho năng suất vượt trội.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Bệnh hại	Liều dùng	Thời điểm phun
Lúa	Đạo ôn lá (cháy lá)	Pha 16 - 20g/bình 16 lít nước, phun cho 360m^2, phun 3 bình cho 1.000m^2. Pha 25 - 30g/bình 25 lít, phun 2 bình cho 1.000m^2.	Phun ngừa hoặc khi bệnh vừa chớm xuất hiện
	Đạo ôn cổ bông (Thối cổ gié)	Pha 20 -25g/bình 16 lít nước, phun cho 360m^2, phun 3 bình cho 1.000m^2. Pha 30 - 35g/bình 25 lít, phun 2 bình cho 1.000m^2.	Phun trước lúc trổ và sau khi trổ 7 ngày.

Lưu ý:

- Không phun khi trời sắp mưa, trường hợp bệnh nặng nên phun lặp lại sau 5 - 7 ngày.
- Thời gian cách ly: 14 ngày sau khi phun.

ACO ONE 400EC

ĐẶC TRỊ ĐẠO ÔN TRÊN LÚA

NHẬT BẢN

Hoạt chất:
Isoprothiolane 400g/lít
Phụ gia đặc biệt vừa đủ 1 lít

Hãng sản xuất:
ZheJiang Linghua Chemicals Group Co., Ltd

Đặc tính - Công dụng:

- ACO ONE 400EC có tác động nội hấp (lưu dẫn) mạnh, ức chế sự xâm nhập của nấm bệnh, đặc trị đạo ôn (Piricularia.Oryzae) trên lúa.
- ACO ONE 400EC đặc trị bệnh đạo ôn lá gây cháy lá và đạo ôn cổ bông gây thối cổ gié, cổ bông trên lúa. Giúp cho bộ rễ phát triển tốt, cây lúa khỏe, phục hồi nhanh, xanh lá, hạt chắc, sáng màu - gạo đẹp, góp phần tăng năng suất.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Bệnh hại	Liều dùng
Lúa	Đạo ôn lá, đốm nâu, bạc lá,...	1.5 lít/ha. Pha 40 - 50ml/bình 16 lít. Hoặc phun 2 - 3 bình/1000m^2 Phun trên lá, thân khi bệnh mới xuất hiện.
	Đạo ôn cổ bông, thối cổ gié,...	1.5 lít/ha. Pha 40 - 50ml/bình 16 lít. Hoặc phun 2 - 3 bình/1000m^2 Phun vào gia đoạn 7 ngày trước khi trổ, phun lại lần 2 khi lúa đã trổ đều.
Rau màu, cây ăn trái,...	Các loại nấm bệnh	1.5 lít/ha. Phun khi nấm bệnh chớm xuất hiện.

Lưu ý:

- Thời gian cách ly: 15 ngày sau khi phun.
- Không phun khi trời sắp mưa to hoặc khi có gió lớn.
- Trường hợp bệnh nặng phun lặp lại sau 5 - 7 ngày.

KINH NGHIỆM PHỐI TRỘN CỦA NHÀ NÔNG:

1. Downy 650WP hoặc Đùm Xpro + MiStop 350SC hoặc Bisomin 2SL

Cây trồng	Bệnh hại	Liều dùng
Lúa	Bạc lá, đạo ôn, đốm nâu, đốm vằn, nấm hoa vàng.	Downy 650WP hoặc Đùm Xpro 50g + Mi Stop hoặc Bisomin 50ml/bình 25 lít.

2. Downy 650WP hoặc Đùm Xpro + Haruko 5SC *(Hoạt chất: Hexaconazole 5% w/w)*

Cây trồng	Bệnh hại	Liều dùng
Lúa	Đạo ôn lá, khô vằn, đốm nâu, nấm hoa vàng.	Downy 650WP hoặc Đùm Xpro 50g + Haruko 100ml/bình 25 lít.
	Lúa von, thối hạt	Downy 650WP hoặc Đùm Xpro 50g + Haruko 75ml/1 lít nước trộn với 5kg lúa giống.

Lưu ý: Pha thuốc bột trước, thuốc nước sau.

THUỐC TRỪ BỆNH PIM.PIM 75WP

Hiệu **BAEMSing® 75WP**

THÁNH ĐẠO ÔN® 75 WP

Hoạt chất: Tricylazole 75% w/w + Phụ gia đặc biệt 25% w/w
Hãng sản xuất: Jining City Yimin Chemical Plant

ĐẶC TRỊ: ĐẠO ÔN LÁ - ĐẠO ÔN CỔ BÔNG

Đặc tính - Công dụng:

- Pim.pim là thuốc trị bệnh Đạo ôn cổ bông và Đạo ôn lá (cháy lá) trên lúa. Ngoài ra, thuốc còn dùng xử lý hạt giống giúp trừ bệnh lúa von. Sản phẩm rất an toàn cho lúa, đặc biệt trong giai đoạn lúa đang trổ bông.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Bệnh hại	Liều pha	Cách dùng
Lúa	Đạo ôn lá (cháy lá)	25g/bình 20 lít	Phun khi bệnh vừa chớm xuất hiện.
	Đạo ôn cổ bông	35g/bình 20 lít	Phun 7 - 10 ngày trước và sau trổ.

Lưu ý:

- Sử dụng 0,3 - 0,4 kg/ha.
- Lượng nước phun: 400 - 500 lít/ha. Khuấy đều thuốc trước khi phun.
- Phun thuốc khi tỉ lệ bệnh từ 5 - 10%.
- Thời gian cách ly: Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 7 ngày.

THUỐC TRỪ BỆNH

Bisomin 2SL

ĐẶC TRỊ: VI KHUẨN - NẤM BỆNH

KASU ẨN 2SL

NƯỚC XANH TRỪ KHUẨN

Hoạt chất: Kasugamycin.....20g/l + Phụ gia đặc biệt vừa đủ 1 lít
Hãng sản xuất: Bailing Agrochemical Co., Ltd

Đặc tính - Công dụng:

- Bisomin 2SL là thuốc trừ nấm bệnh và vi khuẩn phổ rộng, trên nhiều oại cây trồng. Do đặc tính là chất kháng sinh gốc thực vật, làm ức chế sự hình thành Acid amin trong cơ thể vi khuẩn, ngăn quá trình tổng hợp protein trông cơ thể nấm, không gây phản ứng hóa học. Thuốc có cơ chế lưu dẫn, giúp quá trình dịch chuyển của thuốc vào cây trồng nhanh.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Bệnh hại	Liều dùng
Lúa	Đạo ôn, đốm nâu, lem lép hạt, bạc lá,...	Pha 20-30ml/bình 20 lít. Phun thuốc khi lúa bắt đầu đẻ nhánh.
Dưa chuột, dưa hấu, lạc, bắp cải, cải củ, cải thảo, dâu tây, hoa cúc, cam, khoai tây, súp lơ, thuốc lá,...	Ghẻ, thối nhũn, đốm lá, đốm nâu, sương mai, thán thư, vi khuẩn, sẹo quả, phấn trắng,...	Pha 20-30ml/bình 20 lít. Phun thuốc khi bệnh vừa chớm xuất hiện.
Cà rốt, cải brussel, cần nước, cần tây, cải thìa, dền đỏ, hành hoa, tần ô, xà lách,...		

Lưu ý:

- Không phun khi cây đang có hoa, không phun khi trời sắp mưa to hoặc gió lớn.
- Trường hợp bệnh nặng nên phun lặp lại sau 5 - 7 ngày.
- Thời gian cách ly: 14 ngày sau khi phun.

KINH NGHIỆM PHỐI TRỘN CỦA NHÀ NÔNG:

1. Bisomin 2SL + Thalonil 75WPt

Cây trồng	Bệnh hại	Liều dùng
Các loại cây trồng	Thán thư, vi khuẩn	Bisomin 50 - 100ml + Thalonil 50 - 75g/bình 20 lít.

2. Bisomin 2SL + Downy 650WP

Cây trồng	Bệnh hại	Liều dùng
Lúa	Đạo ôn	Bisomin 50 - 100ml + Downy 30 - 50g/bình 20 lít.

3. Bisomin 2SL + Dong coc 85WP

Cây trồng	Bệnh hại	Liều dùng
Các loại cây trồng	Nấm bệnh, vi khuẩn	Bisomin 50 - 100ml + Dong coc 50 - 75g/bình 20 lít. Phun phòng ngừa hoặc trừ bệnh.

Lưu ý:
- Không phun khi cây đang có hoa.
- Không phun khi trời sắp mưa to.
- Trường hợp bệnh nặng nên phun lặp lại sau 5-7 ngày.

KASUHAN 4WP

TRÙM KHUẨN®

Hoạt chất:
Kasugamycin.....4%w/w
Phụ gia đặc biệt ...96%w/w

Hãng sản xuất:
Rushan Hanwei Biotechnology Co., Ltd.

Đặc tính - Công dụng:

- Sản phẩm là thuốc trừ nấm bệnh vi khuẩn trên nhiều loại cây trồng khác nhau. Thuốc có cơ chế lưu dẫn, phổ tác dụng rộng, quá trình dịch chuyển của thuốc vào cây trồng nhanh.
- Thuốc phòng trừ tốt các loại bệnh như: Bạc lá, vàng lá, thối gốc vi khuẩn, thán thư, đốm nâu, đốm đen, phấn trắng, rỉ sắt, sương mai, thối quả, héo rủ,...

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Bệnh hại	Liều dùng
Lúa, cam, quýt, vải, xoài, nhãn, hành, cà chua, bắp cải, nho, hoa hồng,...	Bạc lá, đạo ôn, phấn trắng, vàng lá, thán thư, héo rủ, thối quả, thối nhũn, lở cổ rễ, thối gốc vi khuẩn,...	Sử dụng: 1.0kg/ha. Cách pha: 20 - 30g/bình 20 lít. Lượng nước phun: 500 lít/ha.

Lưu ý:

- Thời điểm: Phun thuốc ngay khi bệnh vừa mới xuất hiện, tỷ lệ khoảng 5 - 7%.
- Lượng nước: Phun từ 500 lít/ha.
- Thời gian cách ly: 7 ngày.
- Không phun thuốc khi trời sắp mưa hoặc có gió lớn.

BISOMIN 6WP

GIÁO SƯ KHUẨN®

SẢN PHẨM TIÊN TIẾN
SẠCH NẤM BỆNH
PREMIUM QUALITY

Hoạt chất:
Kasugamycin.....6%w/w
Phụ gia đặc biệt ...94%w/w

Hãng sản xuất:
Bailing Agrochemical Co., Ltd

Đặc tính - Công dụng:

- Bisomin 6WP là thuốc trừ nấm bệnh vi khuẩn trên nhiều laoij cây trồng khác nhau. Thuốc có cơ chế lưu dẫn, phổ tác dụng rộng, quá trình dịch chuyển của thuốc vào cây trồng nhanh, Thuốc phòng trừ tốt các loại bệnh như: Bạc lá, vàng lá, đạo ôn, loét vi khuẩn, thán thư, đốm nâu, đốm đen, phấn trắng, rỉ sắt, sương mai, héo rủ,...

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Bệnh hại	Liều dùng
Lúa, nho, cam, quýt, xoài, nhãn, hành, cà chua, bắp cải, vải, hoa hồng,...	Bạc lá, đạo ôn, phấn trắng, vàng lá, thán thư, héo rủ, thối quả, thối nhũn, lở cổ rễ, thối gốc vi khuẩn,...	Sử dụng: 0.8 - 1.0 kg/ha. Cách pha: 20 - 30g/bình 20 lít. Lượng nước phun: 500 lít/ha.

Lưu ý:

- Thời điểm: Phun thuốc ngay khi bệnh vừa mới xuất hiện.
- Lượng nước: Phun từ 400 - 600 lít/ha.
- Thời gian cách ly: 7 ngày đối với nho, 14 ngày đối với cây trồng khác.
- Không phun thuốc khi trời sắp mưa hoặc có gió lớn.

THUỐC TRỪ BỆNH FUJIBOSS 30SC

FUJIBOSS 30SC

BOSS RA TAY
ĐÁNH BAY NẤM BỆNH

Hoạt chất:
Boscalid .....20% w/w
Pyraclostrobin...10% w/w

Hãng sản xuất:
Shandong Sinomey Co., Ltd.

Đặc tính - Công dụng:

- Fujiboss 30SC là phát minh kết hợp hàng đầu giữa 2 hoạt chất tân tiến nhất hiện nay, cao cấp: Pyraclostrobin và Boscalid. Thuốc vừa trừ bệnh vừa kích thích sinh trưởng cho cây trồng. Thuốc có tác động lưu dẫn và thấm sâu nhanh sau khi phun, phòng trừ tổng hợp nhiều chủng nấm khó trị: phấn trắng, rỉ sắt, nấm cóc, đốm lá, đốm trái, thối trái, cháy lá, vàng lá, mốc xám (nấm lông chuột); ….

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Bệnh hại	Liều lượng
Nho	Sương mai	Pha 24-30ml cho bình 20 lít nước
Hoa hồng	Phấn trắng	

Lưu ý:

Không phun khi trời sắp mưa to hoặc khi có gió lớn.
Thời gian cách ly: 7 ngày

THUỐC TRỪ BỆNH SHOWBIZ 16SC

SHOWBIZ 16SC

DÙNG KHI HẾT THUỐC TRỊ



Hoạt chất:
Cyazofamid.....16%w/w
Phụ gia đặc biệt.....84%w/w

Hãng sản xuất:
Cropsnoys India Private Limited.

Đặc tính - Công dụng:

- Showbiz 16%SC chứa hoạt chất Cyazofamid được phát minh từ Nhật Bản, trừ nấm phổ rộng có tính nội hấp, lưu dẫn diệt trừ nhiều chủng loại nấm: Phytophthora spp; Pythium spp; Peronospora, Plasmopara. Thuốc ức chế tất cả các giai đoạn trong vòng đời của nấm: bào tử, ống mầm, sợi nấm.
- Showbiz là sản phẩm trừ nấm bệnh mới nhất tại Việt Nam, được chế tác dưới dạng SC, làm cho sản phẩm có đặt tính "mát" cây. Thuốc có khả năng trừ tốt các loài nấm bệnh đã kháng hoạt chất; Chlorothalonil; Metalaxyl; Cymoxanil , Dimethomorph.

Hướng dẫn sử dụng:

Bệnh hại	Cây trồng	Liều lượng
Phấn trắng	Đậu tương	- Liều dùng: 15-20ml/20L nước, phun khi vết bệnh mới chớm xuất hiện. Đối với cây con dưới 20 ngày tuổi, nên sử dùng liều thấp 10ml/20L nước
Thối thân, quả	Ca cao	
Chết nhanh	Hồ tiêu	
Vàng rụng lá, loét sọc mặt cạo	Cao su	
Vàng lá	Sắn	
Sương mai	Khoai tây	
Mốc sương	Cà chua	
Sương mai, thối rễ, héo rũ chết cây con	Dưa hấu, dưa chuột, bắp cải	
Nứt thân, xì mủ, thối trái	Sầu riêng	
Chết cây con	Thuốc lá, lạc	

Lưu ý:

Không phun khi trời sắp mưa to hoặc khi có gió lớn.
Thời gian cách ly: 7 ngày

THUỐC TRỪ BỆNH SUPERMARIO 70SC

SUPERMARIO 70SC

ĐẶC TRỊ: SƯƠNG MAI, GIẢ SƯƠNG MAI, MỐC XƯƠNG, NỨT THÂN, XÌ MỦ, VÀNG LÁ, THỐI RỄ,...

Hoạt chất:

Fluopicolide.....7% w/w
Propamocarb HCl...63% w/w

Thay thế:

Chlorothalonil; Metalaxyl; Metalaxyl-M; Cymoxanil; Iprovalicarb; Dimethomorph, ….

Đặc tính - Công dụng:

- Supermario là sản phẩm thế hệ mới nhất chứa 2 hoạt chất tiên tiến Fluopicolide và Propamocarb HCL đặc trị các loại nấm đã kháng thuốc như: Phytophthora (gây ra bệnh sương mai, bệnh thối rễ, ngọn và thối mầm, chết nhanh, thối trái, nứt thân, xì mủ). Pythium (vàng lá, chết thân, cành, thối rễ, chết cây con). Sương mai, mốc sương, giả sương mai

Hướng dẫn sử dụng:

Bệnh hại	Cây trồng	Liều dùng
Phấn trắng	Đậu tương	Liều dùng: Pha 24ml/ 20L nước, phun xịt hoặc tưới rễ. Thuốc có thể dùng để phun xịt hoặc tưới gốc đều tốt.
Thối thân, quả	Ca cao	
Chết nhanh	Hồ tiêu	
Vàng rụng lá Loét sọc mặt cạo	Cao su	
Vàng lá	Sắn	
Sương mai	Khoai tây	
Mốc sương	Cà chua	
Sương mai, thối rễ, Héo rũ chết cây con	Dưa hấu, dưa chuột, bắp cải	
Nứt thân, xì mủ, thối trá	Sầu riêng	
Chết cây con	Thuốc lá, lạc	

Lưu ý:

- Không phun khi trời sắp mưa to hoặc khi có gió lớn.
- Thời gian cách ly: 7 ngày

Probicol 200WP
KHUẨN VƯƠNG
ĐẶC TRỊ NẤM BỆNH VI KHUẨN

Hoạt chất:
Bisomerthiazol 190g/kg
Kasugamycin.....10g/kg
Special additives.....800g/kg

Hãng sản xuất:
Guangxi Hui Feng Biotechnology Co., Ltd.

Đặc tính - Công dụng:
- Probicol 200WP chứa 2 hoạt chất Bisomerthiazol và Kasugamycin có tác động nội hấp mạnh.
- Probicol 200WP phòng trừ được các loại nấm bệnh do vi khuẩn gây hại cây trồng như: Bạc lá, vàng lá, loét vi khuẩn, thán thư, đốm nâu, đốm đen, phấn trắng, rỉ sắt, sương mai, héo rủ, thối gốc vi khuẩn, nấm hồng,...

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Bệnh hại	Liều dùng
Lúa	Thối gốc vi khuẩn	Phun 1.0 - 1.2kg/ha (40 - 50g/bình 20 lít nước)
	Bạc lá (cháy bìa lá)	
Cam	Loét vi khuẩn	
Bắp cải	Thối đen, thối nhũn	
Cà chua, hành, đậu tương (đậu nành)	Đốm lá vi khuẩn	
Khoai lang, ớt	Héo rủ, héo xanh	
Hoa hồng	Phấn trắng	
Cà phê	Thán thư, nấm hồng	
Xoài	Đốm đen, xì mủ	

Lưu ý:
- Thời gian cách ly: 10 ngày trước khi thu hoạch.
- Không phun thuốc khi có gió lớn hoặc trời sắp mưa to.
- Phun thuốc khi vết bệnh chơm xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 5 - 10%.

Xiexie 200WP
ANH HÙNG KHUẨN

Hoạt chất:
Bismerthiazol (Sai ku zuo) 200g/kg
Special additives..... 800g/kg

Hãng sản xuất:
Shenzhen Dehao Pesticides Co., Ltd.

Đặc tính - Công dụng:

- Xiexie 200WP là thuốc trừ nấm bệnh do vi khuẩn, có tác động nội hấp mạnh. Thuốc được dùng phòng trừ các loại bệnh do vi khuẩn gây hại cây trồng như: Bạc lá, vàng lá, loét vi khuẩn, thán thư, đốm nâu, đốm đen, phấn trắng, rỉ sắt, sương mai, héo rủ,...

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Bệnh hại	Liều dùng
Lúa	Thối gốc vi khuẩn	Phun 1.5kg/ha (Pha 30 - 50g/bình 20 lít nước) Phun thuốc khi vết bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun từ 500 lít/ha.
	Bạc lá (cháy bìa lá)	
Cam, chanh	Loét vi khuẩn, ghẻ	
Bắp cải, xoài	Thối đen, thối nhũn	
Cải, cà chua, hành, sầu riêng, đậu tương (đậu nành)	Đốm lá vi khuẩn	
Khoai lang, ớt, dưa hấu, dưa lưới, dưa leo.	Héo rủ, héo xanh	
Hoa hồng	Phấn trắng	
Xoài	Đốm đen, xì mủ	

Lưu ý:

- Không phun khi trời sắp mưa to hoặc khi có gió lớn.
- Thời điểm: Phun vào sáng sớm hoặc chiều mát để đạt hiệu quả cao.
- Thời gian cách ly: 7 ngày sau khi phun.

THUỐC TRỪ BỆNH

Emycin 4WP

Công nghệ Nhật Bản

Hoạt chất:
Zhongshengmycin...2%w/w
Kasugamycin.....2%w/w

Hãng sản xuất:
Fujian Kaili Bio-product Co., Ltd

Đặc tính - Công dụng:

- Emycin 4WP là thuốc trừ nấm bệnh vi khuẩn được kết hợp giữa 2 hoạt chất Zhongshengmycin và Kasugamycin, thuốc ức chế quá trình tổng hợp protein của vi khuẩn, ngăn chặn sự hình thành và sự phát triển của chúng.
- Emycin 4WP dùng điều trị bệnh do nấm bệnh vi khuẩn như: Bạc lá lúa, cháy bìa lá, thối nhũn, đốm lá vi khuẩn, ghẻ sẹo trên cam, quýt, bưởi và nhiều cây trồng khác.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Bệnh hại	Liều dùng
Lúa	Thối gốc vi khuẩn	2.0kg/ha hoặc 0.3%. (Pha 40-50g/bình 20 lít nước) Lượng nước phun: 400-800 lít/ha. Phun thuốc 2 lần cách nhau 7 ngày, lần đầu khi bệnh mới xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 5-7%.
	Bạc lá (cháy bìa lá)	
Cam	Loét vi khuẩn, ghẻ sẹo	
Bắp cải	Thối đen, thối nhũn	
Cà chua, hành, đậu tương (đậu nành)	Đốm lá vi khuẩn	
Khoai lang, ớt	Héo rủ, héo xanh	
Hoa hồng	Phấn trắng	
Xoài	Đốm đen, xì mủ	

Lưu ý:

- Phun vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát lúc trời không có gió và mưa to.
- Thời gian cách ly: 3 ngày sau khi phun.

THUỐC TRỪ BỆNH

Cocosieu 15.5WP



Zinc++

Phấn trắng

Khô vằn

Nấm cóc

Chết cây con

Hoạt chất:
Triadimefon 9.3%w.w
Jingangmycin(Validamycin) 6.2%w/w

Hãng sản xuất:
Zhejiang Pinghu Pestricide Factory

Đặc tính - Công dụng:

- Sản phẩm là thuốc trừ bệnh phổ tác dụng rộng. Vừa diệt nấm vừa trừ khuẩn! Bảo vệ toàn diện cây trồng. Đặt trị nhiều loại nấm bệnh trên nhiều cây trồng như: Phấn trắng/ hoa hồng; đạo ôn, khô vằn/ lúa; thối nhũn, cháy lá do vi khuẩn/ bắp cải; khô đầu lá/ hành; đốm nâu, đốm vòng, thán thư/ ớt; sương mai/ dưa leo; rỉ sắt, nấm cóc/ hoa cúc; rỉ sắt/ cà phê; nấm lông chuột (mốc xám)/ dâu tây, cà chua; đốm lá/ cà chua; thối rễ, héo rũ cây con/ đậu phộng,...

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Bệnh hại	Liều dùng
Hoa hồng, lúa, bắp cải, hành, ớt, dưa leo, hoa cúc, cà phê, dâu tây, cà chua, đậu phộng,...	Phấn trắng, đạo ôn, khô vằn, thối nhũn, cháy lá do vi khuẩn, khô đầu lá, đốm nâu, đốm vòng, thán thư, sương mai, rỉ sắt, nấm cóc, nấm lông chuột (mốc xám), đốm lá, thối rễ, héo rũ cây con.	Sử dụng 0.24%. Pha 24 - 30g/ bình 20 lít nước.

Lưu ý:

- Lượng nước phun từ 600 - 800 lít/ha.
- Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 5 - 6%.
- Phun vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát lúc trời không có gió và mưa to.
- Thời gian cách ly: 7 ngày sau khi phun.

NAKANO 50WP

Đặc trị:
PHẤN TRẮNG, MỐC XÁM, GHẺ SẸO, SƯƠNG MAI, THÁN THƯ, ĐỐM LÁ...

Hoạt chất:
Dithianon 50%w/w
Special additives..50%w/w

Hãng sản xuất:
Hailir Pesticides and Chemicals Group Co., Ltd

Đặc tính - Công dụng:

- Dithianon là hoạt chất trừ bệnh thế hệ mới, dạng tiếp xúc, thấm sâu thuộc nhóm Quinone. Thuốc có phổ phòng bệnh rộng, ít gây kháng thuốc nhờ cơ chế đa điểm. Thuốc bám tốt trên bề mặt lá và trái, hiệu quả phòng bệnh trên lá và trái cây cực kỳ tốt.
- Dithianon ức chế nhiều quá trình sinh lý của tế bào nấm (đa điểm), giúp phòng ngừa hiệu quả các bệnh như: Ghẻ sẹo, sương mai, thán thư, đốm lá,...

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Bệnh hại	Liều lượng
Lạc (đậu phộng), rau cải	Đốm lá	1.5 kg/ha. Pha từ 10 - 20g/ bình 20 lít nước.
Khoai tây, hoa hồng, dưa leo	Sương mai	
Cà phê, ớt, dâu tây, dưa hấu	Thán thư	
Cam, quýt, bưởi, xoài	Ghẻ sẹo, nám quả	

Lưu ý:

- Lượng nước phun từ 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 5%.
- Phun vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát để đạt hiệu quả cao nhất.
- Thời gian cách ly: 14 ngày sau khi phun.

SANTOSO 100SC

CHIM SÂU

Hoạt chất:
Alpha Cypermethrin 10%w/v
Phụ gia đặc biệt 90%w/v

Hãng sản xuất:
Modern Insecticides Limited (Ấn Độ)

Đặc tính - Công dụng:

- SANTOSO 100SC là thuốc diệt côn trùng tổng hợp, có cơ chế tiếp xúc vị độc, xông hơi, thấm sâu nhanh, hoạt chất ức chế thần kinh làm cho côn trùng ngừng thở và chết nhanh, hiệu quả nhanh chóng hiệu lực kéo dài. Diệt trừ các loại côn trùng gây hại.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Đối tượng	Liều dùng
Lúa	Sâu phao, sâu đục bẹ, bọ trĩ, bọ xít, sâu cuốn lá, sâu đục thân	- Pha 10-30ml cho bình 18 lít nước. - Thời điểm phun: Vào sáng sớm hoặc chiều mát để đạt hiệu quả cao.
Cà phê	Rệp sáp, kiến, mối	
Hồ tiêu	Rệp sáp, rệp muội	
Sắn	Bọ phấn trắng	
Điều	Bọ xít muỗi	
Lạc	Sâu khoang	
Khoai lang	Sâu khoang, bọ hà	
Đậu tương	Sâu đục quả, rệp	
Cây ăn trái	Ruồi vàng	

Lưu ý: Không phun khi trời sắp mưa to hoặc khi có gió lớn.

TAMIKO 50EC

TỔ CHIM SÂU

Hoạt chất:
Pemethrin 50%w/v
Phụ gia đặc biệt: 50%w/v

Hãng sản xuất:
Modern Insecticides Limited (Ấn Độ)

Đặc tính - Công dụng:

- TAMIKO 50EC là thuốc diệt côn trùng tổng hợp, có cơ chế tiếp xúc, vị độc, xông hơi, thấm sâu nhanh, hoạt chất ức chế thần kinh làm cho côn trùng ngừng thở và chết nhanh, hiệu quả nhanh chóng hiệu lực kéo dài.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Đối tượng	Liều dùng
Lúa	Sâu đục thân, sâu keo, sâu cuốn lá, sâu phao, bọ trĩ, rầy nâu	- Pha 10-20ml cho bình 18 lít nước. - Phun vào sáng sớm hoặc chiều mát để để đạt hiệu quả cao.
Cà phê	Mọt đục cành, rệp sáp	
Đậu tương Lạc	Sâu khoang, sâu xanh sâu đục quả, dòi đục lá	
Mía	Sâu đục thân	
Điều	Sâu róm, sâu xanh, bọ xít muỗi	
Bắp (ngô)	Sâu keo mùa thu	

Lưu ý: Không phun khi trời sắp mưa to hoặc khi có gió lớn.

PHONIX DRAGON 20EC

Tận Diệt CÔN TRÙNG Gây Hại

thay thế Chlorpyrifos, Fipronil

Hoạt chất:

Phoxim 18.5%w/w

Beta-Cypermethrin 1.5%w/w

Hãng sản xuất:

Shanghai E-Tong Chemical Co

Đặc tính - Công dụng:

- Phonix Dragon 20EC là thuốc diệt côn trùng tổng hợp có cơ chế tiếp xúc, vị độc, xông hơi, thấm sâu nhanh, hoạt chất ức chế thần kinh làm cho côn trùng ngạt, ngừng thở và chết nhanh.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Đối tượng	Liều dùng
Lúa	Rầy lưng trắng, bọ trĩ, sâu cuốn lá, rầy nâu, sâu đục thân, bọ xít	- Pha 30-50ml cho bình 20 lít. - Phun xịt ướt đều hoặc tưới.
Lạc	Sâu khoang	
Cà phê	Rệp sáp	
Cây ăn trái	Ruồi vàng	

Lưu ý: Không phun khi trời sắp mưa to hoặc khi có gió lớn.

THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG UCHONG 40EC

Mới

Wusso

Hoạt chất:
Chlorpyrifos Methyl.....40%w/v
Phụ gia đặc biệt vừa đủ

Hãng sản xuất:
Hemani Industries Ltd

Đặc tính - Công dụng:

- Hoạt chất Chlorpyrifos Methyl là thuốc diệt côn trùng tổng hợp có cơ chế tiếp xúc, vị độc, xông hơi, thấm sâu nhanh, hoạt chất ức chế thần kinh làm cho côn trùng ngạt, ngừng thở và chết nhanh.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Đối tượng	Liều dùng
Lúa, cà phê, ngô, đậu tương, khoai lang, lạc, hành, chè, cam	Sâu đục thân, ve sầu, sâu xanh da láng, bọ hà, sâu vẽ bùa, rầy nâu, muỗi hành, sâu đục ngọn, rệp sáp, rệp muội	Pha 20-25ml/bình 16-25 lít để phun xịt hoặc tưới lên côn trùng.

Lưu ý: Không phun khi trời sắp mưa to hoặc khi có gió lớn.

THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG

TOPXAPY 30SC

Mới

DẠNG SC RẤT MÁT, KHÔNG GÂY NÓNG

Hoạt chất:
Chlorfenapyr.....20%w/v
Pyriproxyfen.....10%w/v
Phụ gia đặc biệt 70%w/v

Hãng sản xuất:
Shanghai E-Tong Chemical Co., Ltd

Đặc tính - Công dụng:

- Topxapy 30SC là thuốc diệt trừ côn trùng tổng hợp, có cơ chế tiếp xúc mạnh, vị độc, diệt trứng (làm cho trứng côn trùng không nở được), tiêu diệt cả con non và côn trùng lớn. Hiệu lực kéo dài.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Đối tượng	Liều dùng
Lúa	Nhện gié, sâu cuốn lá, rầy nâu, sâu đục thân, bọ trĩ, sâu đục bẹ	- Pha 24ml cho bình 20 lít nước hoặc 30ml cho bình 25 lít nước. - Phun xịt ướt đều.
Đậu tương	Sâu xanh	
Lạc, đậu xanh	Sâu xanh da láng	
Hoa hồng	Nhện đỏ	
Hoa mai	Bọ trĩ	
Rau màu	Sâu xanh, sâu tơ	

Lưu ý: Không phun khi trời sắp mưa to hoặc khi có gió lớn.

THUỐC TRỪ SÂU MATSCOT 50SP

MATSCOT 500
50SP

NEWTONGARD 75

Hoạt chất: Cyromazine 50%w/w + Special Additives 50%w/w
Hãng sản xuất: Jiangsu Pesticide Research Institude Company Ltd.

Đặc tính - Công dụng:

- Sản phẩm là thuốc trừ sâu thế hệ mới, có tính nội hấp, lưu dẫn và chuyển vị mạnh. Sản phẩm làm biến dạng, ngăn cản quá trình nở trứng, lột xác của ấu trùng (dòi) và hóa nhộng của côn trùng, làm cho sâu chết nhanh nhất. Hiệu quả rất cao đối với sâu vẽ bùa, dòi đục lá ngay cả trong trường hợp đã kháng các loại thuốc gốc lân và cúc tổng hợp.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Sâu hại	Liều dùng
Cà chua, cam, quýt, hành, mướp, khổ qua, bầu, bí, tỏi, dưa leo, ớt, cải thìa, hoa cúc, dưa hấu, đậu đen, đậu xanh, đậu tương, khoai tây,...	Sâu vẽ bùa	- Sử dụng 150g/ha. - Pha 15-25g/bình 20 lít. - Phun khi dòi đục lá (tuổi 1-2) mới xuất hiện gây hại. - Phun ướt đều 2 mặt lá khi sâu còn nhỏ.
	Dòi đục lá	

Lưu ý: Thời gian cách ly 5 ngày.
- Lượng nước phun từ 400 - 600 lít/ha.
- Không phun thuốc khi có gió lớn hoặc trời sắp mưa to.
- Phun vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát để đạt kết quả cao nhất.

THUỐC ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG ATOMMIN 15WP

Atomin 15WP

Hiệu **Bôngra sai 150**

Hoạt chất: Paclobutrazol 15% w/w + Phụ gia đặc biệt 85% w/w
Hãng sản xuất: Yancheng Huafeng Chemical Factory

Đặc tính - Công dụng:

- Hoạt chất Paclobutrazol là chất điều hòa sinh trưởng thực vật triazole được cây hấp thụ nhanh qua lá, thấn, cành, rễ.
- Thuốc có công dụng ức chế sinh tổng hợp gibberellin trong cây, kiểm soát sự phát triển của thân cây trồng, rút ngắn thời gian trồng trọt của cây, thúc đẩy cây nhanh ra hoa, ra lá non, đâm chòi và phát triển bộ rễ, tăng tỷ lệ đậu trái non, hạn chế sượng trái, ra rễ nhanh, chống đổ ngã, hạn chế khô bông, rụng trái non.
- Thuốc có khả năng thúc đẩy quá trình phân hóa mầm hoa, kích thích cây ra hoa sớm đồng loạt.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Tác dụng	Liều lượng	Cách dùng
Lúa	Kích thích sinh trưởng	0.5 - 0.6 Kg/ha	Phun với 400 lít nước/ha Phun thuốc sau khi sạ 20 ngày
Lạc (đậu phộng)			Phun 400 - 600 lít/ha. Phun khi lạc đang trổ hoa đều
Sầu riêng, khoai lang, thanh long, xoài	Kích ra hoa, rễ	100-120g/bình 16 lít nước	Phun 400 - 600 lít/ha. Phun lúc lá non có màu xanh trắng (lá lụa). Phun ướt đều tán lá

Lưu ý:

- Không phun thuốc khi có gió lớn hoặc trời sắp mưa to.
- Không sử dụng đối với cây đang bị bệnh, bị suy.
- Thời gian cách ly: 7 ngày sau khi phun.

Dolping 40EC

DOLPING NHANH ĐẾN KHÔNG NGỜ



Hoạt chất:
Gibberellic acid 40g/lít
Phụ gia đặc biệt vừa đủ 1 lít

Hãng sản xuất:
Fertiagro Pte., Ltd (Singapore)

Đặc tính - Công dụng:

- Dolping 40EC tác động vào mô tế bào, làm mô tế bào dài ra.
- Dolping 40EC làm tăng chiều dài của cây trồng.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Hiệu quả	Liều dùng
Bắp cải, cải thảo, cần tây	Tăng năng suất và tăng chất lượng	Pha 5 - 10 ml/bình 16 lít. Xịt 2 lần/vụ.
Cà chua, cà rốt	Giúp cây tốt tươi	
Cà phê	Tăng đậu trái	Pha 5 - 10 ml/bình 16 lít. Xịt 2 - 3 lần/vụ. Phun thuốc khi cây ra nụ và sau khi đậu trái.
Lúa	Giúp lúa trổ thoát, bông dài	Pha 5ml/bình 16 - 25lít. Xịt Drone: Pha 50 - 60 ml/ha. Phun trước khi lúa đẻ nhánh 7 ngày hoặc 2 - 3 ngày trước khi lúa trổ bông.
Nho	Tăng đậu trái	Pha 5 - 10 ml/bình 16 lít. Xịt 2 - 3 lần/vụ. Phun thuốc khi cây ra nụ và sau khi đậu trái.
Thanh long	Dài tai, bóng trái	Pha 50 - 100 ml/1 lít nước. Vuốt tai và xịt trái.

Lưu ý:
- Thời gian cách ly: 14 ngày.
- Không phun thuốc khi có gió lớn hoặc trời sắp mưa to.
- Không phun thuốc khi nhiệt độ thấp dưới 15°C.
- Lượng nước: Phun từ 250 - 300 lít/ha.

JINHE-BRASS 0.01SL

Nhân Sâm Cho Cây Trồng

Hoạt chất:
24-Epibrassinolide 0.01%w/w
Phụ gia đặc biệt vừa đủ..... 1 lít

Hãng sản xuất:
Heibei Lansheng Biotech Co., Ltd.

Đặc tính - Công dụng:

- Jinhe-Brass 0.01SL chứa 100% chất điều hòa sinh trưởng thực vật, là thành tựu mới nhất trên thế giới, thể hiện nhiều ưu điểm vượt trội so với các chất điều hòa sinh trưởng mà con người tìm thấy trước đây.
- Jinhe-Brass 0.01SL có vai trò hiệu chỉnh một số tiến trình sinh lý, là chất cường lực cho cây trồng ở nhiều giai đoạn phát triển khác nhau, giúp cho cây chống chịu lại những điều kiện khắc nghiệt của môi trường (stress phi sinh học) như: hạn, mặn, lạnh, ngộ độc hữu cơ,...hoặc tổn thương do dịch hại tấn công (stress sinh học) như: sâu, bệnh,...

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Tác dụng	Liều dùng
Lúa, sầu riêng, ớt,...	Kích thích sinh trưởng	Sử dụng 0.3%. Pha 20ml cho bình 20 lít
Cam, thanh long, xoài, hồ tiêu,...		

Lưu ý:

- Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha (xoài), 500 - 700 lít/ha (hồ tiêu).
- Phun thuốc 2 lần, lần đầu khi cây phân hóa mầm hoa, lần 2 khi cây hình thành quả.
- Phun vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát để đạt hiệu quả cao nhất.
- Thời gian cách ly: 01 ngày sau khi phun.

HẠT GIỐNG NẢY MẦM ĐỀU, KHỎE, CÂY CON SINH TRƯỞNG TỐT, RA RỄ MẠNH, SUNG CHỒI, MAU LỚN, TĂNG THỤ PHẤN, QUANG HỢP, VÀO GẠO NHANH, CHẮC CẬY, TĂNG ĐỀ KHÁNG, TĂNG MIỄN DỊCH, HỖ TRỢ RA HOA, ĐẬU TRÁI, TO CỦ, CHỐNG SỐC NHIỆT (NÓNG, LẠNH), CHỐNG STRESS, CHỐNG NGỘ ĐỘC HỮU CƠ, PHÂN, THUỐC BVTV, MÚA ĐỘC

CHOWON 550SL

THẦN DƯỢC

SỐ 1 CHẤT LƯỢNG

CỨNG CÂY, XANH LÁ, RỄ TO DÀI, CHỐNG ĐỔ NGÃ
NHIỀU LÔNG HÚT, PHÁT TRIỂN CHỒI BÊN
TĂNG ĐỀ KHÁNG, TIẾT KIỆM PHÂN BÓN
CHỐNG RỤNG BÔNG VÀ TRÁI NON HIỆU QUẢ
LÀM GIÀ NHANH ĐỌT NON SẦU RIÊNG

Hoạt chất: Chlormequat .....550 g/L
Dung môi và phụ gia 450g/L

Hãng sản xuất:
Chongqing Shuangfeng Chemical Co., Ltd

Đặc tính - Công dụng:

- Sản phẩm là chất điều hòa sinh trưởng thực vật thế hệ mới, có tác dụng ức chế sự kéo dài tế bào, từ đó làm thân cây ngắn lại và chắc khỏe hơn, giúp cây cứng cáp hơn. Đồng thời, chất này cũng ảnh hưởng đến chu kỳ phát triển của cây, thúc đẩy ra hoa và tăng năng suất thu hoạch.
- Ngoài ra, còn có thể làm tăng hình thành diệp lục, phát triển bộ rễ, ngăn đọt, già lá, làm ngắn thân cây, thân mập hơn, giúp ngăn đổ ngã cây, giúp lá đẻ nhiều nhánh, thúc đẩy ra hoa, đậu quả, ngăn rụng quả, làm già nanh đọt non sầu riêng, làm dày lá, xanh lá giúp cây tập trung nuôi củ.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Tác dụng	Liều dùng
Lúa, ớt, thanh long, đậu phộng, sầu riêng, dưa, bầu, bí, cà chua, bắp, khoai lang, cam, quýt, rau cải...	Kích thích sinh trưởng	1.0 lít/ha. Pha 20 - 25ml cho bình 20 lít nước.

Lưu ý:

- Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha.
- Không dùng sản phẩm khi cây đang còi cọc, chậm phát triển, không pha chung với các loại thuốc có tính kiềm.
- Phun vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát khi trời không có gió và không có mưa.
- Thời gian cách ly: 14 ngày sau khi phun.



ONEHOPE 480SL

KÍCH THÍCH MỦ CAO SU

An toàn - Tiết kiệm

- ✅ **XỬ LÝ TRÁI CHÍN SAU THU HOẠCH (MÍT, KHÓM, SẦU RIÊNG)**
- ✅ **XỬ LÝ TRÁI TRƯỚC KHI THU HOẠCH (ĐỐI VỚI TRÁI GIÀ, ÈO ỌT)**
- ✅ **XỬ LÝ TRÁI CHÍN ĐỒNG LOẠT, KÍCH THÍCH MỦ CAO SU...**

Hoạt chất: Ethephon 480g/Lít
Dung môi và phụ gia.....520g/Lít

Hãng sản xuất: Anyang Quanfeng Biological Technology Co., Ltd

Đặc tính - Công dụng:

- Onehope 480SL là thuốc điều hòa sinh trưởng cho cây trồng, giúp một số cây trồng phân hóa mầm hoa, giúp cây ra hoa sớm vụ và trái vụ. Ngoài ra còn có khả năng kích thích mủ cho cây cao su.
- Ethephon 480g/lít là chất kích thích mủ cao su, có tác dụng gia tăng vùng huy động mủ và giúp duy trì tốc độ của dòng chảy.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Tác dụng	Liều dùng
Cao su, mít, khóm, xoài, chuối, sầu riêng, cam, dâu tây,...	Kích thích mủ cao su, xử lý trái trước và sau khi thu hoạch...	3.0%. Pha 30ml cho 1 lít nước.

Lưu ý:

- Kích thích mủ cao su: Quét thuốc vào sáng sớm cách 48 giờ trước khi cạo mủ. Quét 1 lớp mỏng lên bề mặt vỏ tái sinh ngay phía trên miệng cạo, chiều rộng lớp quét 1 cm.
- Không nên sử dụng thuốc khi thời tiết quá nóng.
- Thuốc đã pha nên dùng ngay, không được để quá 12 tiếng.
- Thời gian cách ly: Không xác định.

BACILLUS SUV

- BACILLUS CÓ TÁC DỤNG PHÒNG TRỪ BỆNH
- BACILLUS HỖ TRỢ DIỆT TRỪ SÂU TƠ, SÂU XANH
- TĂNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHÂN BÓN
- GIÚP TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG, CHỐNG CHỊU HẠN
- TĂNG RA HOA, ĐẬU QUẢ, CHỐNG RỤNG HOA, TRÁI NON
- DƯỠNG HOA, QUẢ, CỦ, TĂNG NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG

Hoạt chất:
Bacillus subtilis 5 x 10^9 CFU/g
Độ ẩm.....5%; pHH2O 5

Đơn vị đăng ký: Công ty cổ phần BMC Việt Nam

Đặc tính - Công dụng:

Sản phẩm là phân bón lá vi sinh vật chúa Bacillus có tác dụng phòng trừ bệnh, hỗ trợ diệt sâu tơ, sâu xanh, giúp cây trồng tăng hiệu quả sử dụng phân bón, tăng sức đề kháng cho cây, giúp cây chống chịu hạn, tăng tỉ lệ ra hoa, đậu quả, chống rụng hoa, rụng trái non. Giúp dưỡng hoa, quả, củ làm tăng năng suất cây trồng cải thiện chất lượng nông sản.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Liều dùng
Rau cải, lúa, ớt, thanh long, sầu riêng, dưa, bầu, bí, cà chua, cam, quýt, bưởi,...	Pha từ 40 - 50g cho bình 20 lít nước

Lưu ý:

- Phun vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát để đạt hiệu quả cao nhất.
- Không phun khi trời có gió hoặc sắp mưa to.
- Không pha chung với các dòng nấm, khuẩn hóa học sẽ làm giảm hoặc mất tác dụng của thuốc trừ nấm, khuẩn hóa học.

THUỐC DIỆT CHUỘT FORWARAT 0.005% WAX BLOCK

Hiệu

Siêu Diệt Chuột

Thuốc diệt chuột thế hệ mới

- ✓ Không cần trộn thêm mồi
- ✓ Diệt chuột ngay trong lần ăn bả đầu tiên
- ✓ Hiệu lực diệt chuột cao, kể cả những loài kháng thuốc

Hoạt chất:
Brodifacoum...0.005% w/w

Hãng sản xuất:
Forward International., Ltd

Đặc tính - Công dụng:

- Siêu Diệt chuột là bả trừ chuột chống đông máu thế hệ mới, diệt chuột rất hiệu quả chỉ sau 1 lần ăn mồi. Chuột sẽ chết trong vòng từ 3 - 6 ngày sau khi ăn phải bả.
- Dùng để diệt chuột ngoài đồng ruộng, vườn cây ăn trái, trong nhà, trại chăn nuôi, nhà máy xay xát, kho tàng, khách sạn, nhà hàng, bệnh viện...
- Sử dụng Siêu Diệt chuột không cần trộn thêm thức ăn khác để làm mồi.

Hướng dẫn sử dụng:

• Đặt bả Siêu Diệt chuột tại các nơi sau đây:
- Trước miệng hang chuột: mỗi nơi 1 viên.
- Dọc đường chuột chạy và nơi chuột cắn phá: cách 5 - 10 mét đặt 1 - 2 viên.
- Cách 7 ngày, kiểm tra các điểm đặt bả 1 lần để bổ sung bả ở các nơi chuột đã ăn. Thường chỉ khoảng 14 - 21 ngày cho mỗi đợt chuột (2 - 3 lần đặt bả).

• Thời gian cách ly: Không xác định.

• Cách lấy Siêu Diệt Chuột ra khỏi túi đúng cách:
Không dùng tay trần chạm vào thuốc vì chuột sẽ không ăn thuốc có hơi người.

BÁM DÍNH BMC

Bám dính cực mạnh, loang trải thấm sâu lên cây trồng.

Hoạt chất:
C10 Alcohol Ethoxylate
Chất phụ trợ vừa đủ 100%

Hãng sản xuất:
Akzo Nobel Surface Chemistry Pte., Ltd (Singapore)

Đặc tính - Công dụng:

- Bám dính BMC có tác dụng bám dính, loang trải nước thuốc trên bề mặt lá cây trồng, dẫn thuốc thấm nhanh vào biểu bì lá, giúp các loại thuốc thấm ướt, trải đều trên mặt lá, bám dính tốt và tác dụng lâu hơn, giảm bị rửa trôi khi gặp trời mưa hoặc khi tưới nước, làm giảm thoát hơi nước trên lá vào mùa khô hạn giúp giảm bớt hiện tượng khô lá.
- Bám dính BMC tiết kiệm công sức do giảm số lần phun và giảm chi phí đầu tư, giúp tăng hiệu quả của nông dược trên các đối tượng khó diệt trừ như: Cỏ dại, sâu hại (rầy, rệp, sâu cuốn lá, sâu xanh da láng,...) và các loại bệnh hại cây trồng.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Công dụng	Liều dùng
Lúa, rau màu và các loại cây trồng...	Giúp bám dính, loang trải, thấm sâu thuốc vào lá, cây trồng.	Pha 5 - 10ml cho bình 18-20 lít nước.

Lưu ý:

- Không phun khi có gió lớn hoặc trời sắp mưa to.
- Phun xịt bằng máy bay điều khiển, nên sử dụng bám dính BMC để tăng hiệu lực thuốc BVTV.
- Không dùng chất bám dính khi thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao dễ gây ngộ độc cây trồng.

THUỐC TRỪ ỐC OOSAKA 700WP

Oosaka 700WP

Hiệu Snail Delta Thụy Sĩ

Hoạt chất: Niclosamide 700g/kg + Phụ gia đặc biệt 300g/kg
Hãng sản xuất: Ace Bioscience Pte., Ltd (Singapore)

Đặc tính - Công dụng:

- Sản phẩm chứa hoạt chất Niclosamide làm ức chế men hô hấp và trao đổi chất trong cơ thể ốc.
- Sản phẩm là thuốc trị ốc bươu vàng có tác động tiếp xúc, vị độc, và lan tỏa nhanh trong môi trường nước, diệt hầu hết các loại ốc, ngay cả ốc to và ốc nhỏ.
- Sản phẩm hiệu quả diệt ốc nhanh và cao giúp giảm thiệt hại ngay từ đầu.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Dịch hại	Liều dùng
Lúa	Ốc bươu vàng	0.4 kg/ha Pha 16g/bình 16 lít. Phun 3 bình cho 1.000m² (1 công). Pha 25g/bình 25 lít. Phun 2 bình cho 1.000m² (1 công).

Lưu ý:

- Phun thuốc lúc sáng sớm hoặc chiều mát.
- Không phun thuốc khi ruộng vừa sạ lúa.
- Ở vùng nước phèn, mặn cần tăng liều thích hợp.
- Thời gian cách ly: Không xác định.

PILOT 15AB

SIÊU DIỆT ỐC ẤN ĐỘ

Hoạt chất:
Metaldehyde..... 15% w/w
Chất dẫn dụ và phụ gia..... 85% w/w

Hãng sản xuất:
Search Chem, Ind, Ltd. (Ấn Độ)

Đặc tính - Công dụng:

- Pilot 15AB là thuốc dạng bả mồi , đặc trị các loại ốc tiên tiến nhất hiện nay.
- Pilot 15AB sản xuất với công nghệ cải tiến, kích thước hạt nhỏ, nhiều hạt hơn nên rải đều hơn. Diệt sạch ốc lớn và ốc nhỏ, dễ dàng trộn với giống để rải
- Pilot 15AB ngoài thành phần diệt ốc còn chứa chất dẫn dụ nên diệt ốc rất triệt để.
- Pilot 15AB không độc đối với cá, ít ảnh hưởng đến môi trường và con người.
- Pilot 15AB dạng bả mồi nên rất ít giảm hiệu lực khi trời mưa to.
- Pilot 15AB dễ sử dụng, có thể rải trước khi sạ, trộn giống hoặc rải sau khi sạ.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Dịch hại	Liều dùng
Cây ăn trái	Ốc sên, ốc nhớt	Sử dụng 2 - 4 kg/ha Dùng để rải
Cây công nghiệp		
Cải thảo, súp lơ	Ốc nhớt	
Dâu tây		
Lúa	Ốc bươu vàng	
Sâm ngọc linh	Ốc nhớt, ốc sên	

Lưu ý:

- Đối với lúa, rải thuốc lúc chiều tối, rải thành từng cụm ở những nơi ốc tập trung sinh sống, dọc theo mương xả phèn, chổ trũng, xung quanh bờ ruộng.
- Đối với các cây trồng khác, rải thuốc lúc chiều tối, rải thành từng cụm ở những nơi ốc thường sống tập trung.
- Có thể kết hợp Pilot với Abamectin 3.6 để vừa rải gốc, vừa xịt lên cây rau, hoa, cây ăn trái để trừ ốc sên, ốc ma, ốc nhớt,...

Hiệu

ỐC LÝ TIỂU LONG 18GR

HOÀN TOÀN KHÁC BIỆT

SIÊU DIỆT ỐC MALAYSIA

Hoạt chất:
Metaldehyde.....18% w/w
Chất dẫn dụ và phụ gia...82% w/w

Hãng sản xuất:
Binapuri Sakti Sdn. Bhd (Malaysia)

Đặc tính - Công dụng:

- Ốc Lý Tiểu Long 18GR là thuốc dạng bả mồi , đặc trị các loại ốc tiên tiến nhất hiện nay.
- Ốc Lý Tiểu Long 18GR sản xuất với công nghệ cải tiến, kích thước hạt nhỏ, nhiều hạt hơn nên rải đều hơn. Diệt sạch ốc lớn và ốc nhỏ, dễ dàng trộn với giống để rải
- Ốc Lý Tiểu Long 18GR ngoài thành phần diệt ốc còn chứa chất dẫn dụ nên diệt ốc rất triệt để.
- Ốc Lý Tiểu Long 18GR không độc đối với cá, ít ảnh hưởng đến môi trường và con người.
- Ốc Lý Tiểu Long 18GR dạng bả mồi nên rất ít giảm hiệu lực khi trời mưa to.
- Ốc Lý Tiểu Long 18GR dễ sử dụng, có thể rải trước khi sạ, trộn giống hoặc rải sau khi sạ...

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng	Dịch hại	Liều dùng
Cây ăn trái	Ốc sên, ốc nhớt	Sử dụng 3 - 5 kg/ha Dùng để rải
Cây công nghiệp		
Cải thảo, súp lơ	Ốc nhớt	
Dâu tây		
Lúa	Ốc bươu vàng	
Sâm ngọc linh	Ốc nhớt, ốc sên	

Lưu ý:

- Đối với lúa, rải thuốc lúc chiều tối, rải thành từng cụm ở những nơi ốc tập trung sinh sống, dọc theo mương xả phèn, chổ trũng, xung quanh bờ ruộng.
- Đối với các cây trồng khác, rải thuốc lúc chiều tối, rải thành từng cụm ở những nơi ốc thường sống tập trung.
- Có thể kết hợp Ốc Lý Tiểu Long 18GR với Abamectin 3.6 để vừa rải gốc, vừa xịt lên cây rau, hoa, cây ăn trái để trừ ốc sên, ốc ma, ốc nhớt,...

HƯỚNG DẪN AN TOÀN KHI SỬ DỤNG

1 Đọc kỹ nhãn thuốc trước khi sử dụng.



2 Mặc quần áo bảo hộ khi phun thuốc, đeo khẩu trang, tấm che mặt, kính bảo vệ mắt và mang ủng cao su.

3 Khi phun, rải thuốc cần tránh không hít phải bụi thuốc, không để dính vào da, không phun thuốc ngược chiều gió. Nếu thuốc dính vào da, vào mắt cần rửa kỹ ngay nhiều lần bằng nước sạch.

4 Sau khi làm việc với thuốc phải thay quần áo và tắm rửa sạch sẽ rồi mới ăn uống, hút thuốc.



5 Bảo quản thuốc trong bao bì kín, để xa thực phẩm, xa trẻ em và gia súc, để nơi khô ráo thoáng mát.

6 Không để trẻ em tiếp xúc với dụng cụ phun thuốc.

7 Không rửa bình cịt và đổ thuốc thừa xuống ao nuôi cá và các nguồn nước sinh hoạt. Không dùng bao bì đựng thuốc vào bất kỳ mục đích nào (để lương thực, nước uống và các đồ dùng khác...)

8 Khi có triệu chứng ngộ độc cần tiến ành các biện pháp sơ cứu rồi đưa ngay bệnh nhân đến bệnh viện. Khi đưa đến bệnh viện cần mang theo chai thuốc và nhãn thuốc đã gây ra ngộ độc.

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI SỬ DỤNG THUỐC BVTV

A. Thực hiện theo nguyên tắc 4 đúng: Nguyên tắc 4 đúng giúp quản lý tốt dịch hại, sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả:

1. Đúng thuốc: Căn cứ vào loại dịch hại cần diệt trừ và cây trồng cần bảo vệ để chọn đúng loại thuốc và dạng thuốc cần sử dụng.

2. Đúng lúc: Dùng thuốc khi sinh vật ở diện hẹp và ở các giai đoạn dễ mẫn cảm với thuốc: thời kỳ sâu non, bệnh chớm xuất hiện, trước khi bùng phát dịch. Phun trễ sẽ kém hiệu quả và không kinh tế.

3. Đúng liều lượng: Pha thuốc đúng liều lượng, đảm bảo khả năng diệt trừ sâu, bệnh hại cây trồng an toàn, hiệu quả, tránh hiện tượng kháng thuốc, cháy lá trên cây trồng.

4. Đúng phương pháp: Phun (rải) thuốc cho đều, lưu ý chỗ sâu bệnh tập trung. Đối với thuốc trừ cỏ cần bảo đảm nước độ ẩm, độ bằng phẳng của đất thích hợp tùy theo yêu cầu của thuốc hoặc loại cỏ...

B. Hỗn hợp thuốc:

Là pha 2 hay nhiều loại thuốc nhằm trừ cùng một lúc được nhiều loại dịch hại. Một số lưu ý khi hỗn hợp các loại thuốc:

- Chỉ nên pha thuốc theo sự hướng dẫn ghi trên nhãn thuốc hoặc sự hướng dẫn của cán bộ chuyên môn.
- Chỉ nên kết hợp các loại thuốc có các dạng tác dụng khác nhau, như thuốc tiếp xúc pha với thuốc vị độc, hoặc thuốc lưu dẫn pha với thuốc xông hơi...và ngược lại.
- Chỉ nên pha thuốc trừ sâu với thuốc trừ bệnh, thuốc trừ sâu với thuốc trừ cỏ, thuốc trừ cỏ với phân bón. Không nên hỗn hợp thuốc trừ bệnh với phân bón lá hoặc điều hòa sinh trưởng. Không pha thuốc trừ sâu vi sinh với thuốc trừ bệnh có nguồn gốc chất kháng sinh.

C. Luân phiên các loại thuốc:
Sử dụng luân phiên các loại thuốc BVTV, không dùng liên tục nhiều lần 1 loại thuốc để tránh hiện tượng kháng thuốc của dịch hại và kéo dài hiệu lực của thuốc.

D. An toàn khi sử dụng thuốc:
Đọc kỹ và tuân theo các hướng dẫn an toàn ghi trên nhãn.

E. Thời gian cách ly:
Là thời gian từ lần phun thuốc sau cùng đến khi thu hoạch. Mỗi loại thuốc đều có thời gian cách ly khác nhau và được ghi trên nhãn thuốc.

F. Lượng nước phun:
Tùy thuộc vào từng loại cây trồng và giai đoạn sinh trưởng khác nhau.
Ví dụ: Lúa, Bắp, Rau, Đậu các loại phun 500 -750 lít/ha.
Cam, Xoài, Nhãn, Cà Phê, Tiêu phun 1000 - 2000 lít/ha.

G. Thời hạn sử dụng:
Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng. Hầu hết các loại thuốc BVTV có thời hạn sử dụng 2 năm (nếu được bảo quản tốt).

H. Dư lượng thuốc BVTV:
Là hoạt chất của thuốc và các chất biến đổi từ hoạt chất (có độc tính) còn lưu lại trong nông sản, môi trường sau khi phun thuốc BVTV.