



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Departamento de Estadística

Maestría en Estadística

**Análisis de datos de panel del balance hídrico en
Paraguay: Cuantificación de la sequía y la aridificación
ante el calentamiento global (2000–2023)**

Hernán J. Vargas Ojeda

Orientador: Prf. Dr. Gonzalo Martin Vicente

Co-Orientador: Prf. Dr. Gustavo Ignacio Rivas M.

Tesis presentada a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Asunción, como requisito para la obtención del Grado de Magíster en Estadística

SAN LORENZO - PARAGUAY

Marzo - 2026

Ficha Catalográfica del Trabajo de Tesis

Datos Internacionales de Catalogación en la Publicación (CIP)
DE LA BIBLIOTECA E INTERNET DE LA FACEN - UNA

Vargas Ojeda, Hernán Javier

Análisis de datos de panel del balance hídrico en Paraguay: Cuantificación de la sequía y la aridificación ante el calentamiento global (2000–2023) / Hernán J. Vargas Ojeda. – San Lorenzo: Universidad Nacional de Asunción. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 2026.

68 h.; 30 cm.

Incluye referencias bibliográficas.

Tesis (Magíster en Estadística). – Universidad Nacional de Asunción. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 2026.

1. Tesis de postgrado – UNA 2. Sequía 3. SPEI 4. Aridificación
5. Panel data model 6. Calentamiento Global 7. Paraguay

519.5/V297a

Dedicatoria

A mi familia...

Agradecimientos

En primer lugar, deseo expresar mi más profundo agradecimiento a mis orientadores, por su invaluable guía y paciencia infinita. Sus agudas observaciones y su constante apoyo fueron fundamentales para dar forma y dirección a esta investigación.

Agradezco a los miembros de la mesa examinadora de Coordinación de Postgrado e Investigación en Estadística, Departamento de Estadística, FACEN - UNA, por aceptar evaluar este trabajo y por sus valiosas sugerencias que sin duda lo enriquecerán.

Mi gratitud a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción, y en especial al Departamento de Estadística, por brindarme el espacio y los recursos para mi formación de posgrado.

Quisiera extender un agradecimiento especial a la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) por facilitar el acceso a los datos crudos que constituyen la base de este estudio.

A mis compañeros de la Maestría en Estadística, gracias por las largas jornadas de estudio, las discusiones enriquecedoras y el compañerismo que hicieron este camino más ameno.

A mis padres, María Asunción de Rodríguez y Mario Rodríguez M., por su amor incondicional y por inculcarme el valor del esfuerzo y la educación. A mi pareja, Adriana Viveros González, por su paciencia infinita, su aliento en los momentos difíciles y por ser mi principal apoyo. Sin ustedes, este logro no habría sido posible.

Resumen

Esta investigación analiza la evolución del balance hídrico en Paraguay entre los años 2000 y 2023 con el fin de cuantificar y evaluar las dinámicas de sequía y aridificación ante el calentamiento global. Se empleó un diseño cuantitativo de carácter longitudinal utilizando una base de datos de panel compuesta por 18 estaciones meteorológicas terrestres de alta calidad. Como métrica principal, se calculó el Índice de Precipitación-Evapotranspiración Estandarizado (SPEI), integrando la temperatura como factor determinante del déficit hídrico. Mediante algoritmos de aprendizaje no supervisado, el territorio fue regionalizado en dos dominios hídricos óptimos: la subregión sur-este (núcleo agroproductivo) y la subregión centro-chaco. Los resultados del modelo de datos de panel de efectos aleatorios revelaron un agravamiento estructural de las sequías en frecuencia, intensidad, duración y extensión espacial, con un punto de quiebre crítico a partir del año 2019. Los hallazgos evidencian una aridificación estival acelerada en el sur-este y un secado severo en la primavera de la zona centro-chaco. Finalmente, el contraste estadístico entre los índices SPEI y SPI proporcionó evidencia empírica consistente sobre una influencia creciente del calentamiento global sobre los procesos de aridificación observados en Paraguay, al incrementar la demanda evaporativa de la atmósfera independientemente de la estabilidad en los regímenes de lluvia.

Palabras clave: sequía, aridificación, SPEI, datos de panel, calentamiento global.

Abstract

This research analyzes the evolution of the water balance in Paraguay between 2000 and 2023 to quantify and assess drought and aridification dynamics in the face of global warming. A longitudinal quantitative design was employed, utilizing a panel database consisting of 18 high-quality terrestrial meteorological stations. As the primary metric, the Standardized Precipitation-Evapotranspiration Index (SPEI) was calculated, integrating temperature as a determining factor of water deficit. Through unsupervised learning algorithms, the territory was regionalized into two optimal water domains: the southeastern subregion (the agro-productive core) and the central-Chaco subregion. Results from a random-effects panel data model revealed a structural worsening of droughts in frequency, intensity, duration, and spatial extent, with a critical breaking point starting in 2019. The findings show accelerated summer aridification in the southeast and severe spring drying in the central-Chaco region. Finally, the statistical contrast between the SPEI and SPI indices provided consistent empirical evidence of an increasing influence of global warming on the observed aridification processes in Paraguay, by increasing the atmospheric evaporative demand regardless of the stability of rainfall regimes.

Keywords: drought, climate change, SPEI, panel data, time series.

Índice

Dedicatoria	III
Agradecimientos	IV
Resumen	V
Abstract	VI
Índice de cuadros	X
Índice de figuras	XI
1. Introducción	1
1.1. Planteamiento del problema	2
1.2. Justificación de la investigación	3
1.3. Hipótesis	3
1.4. Objetivos de la investigación	4
1.4.1. Objetivo general	4
1.4.2. Objetivos específicos	4
2. Marco Teórico	5
2.1. Antecedentes de investigación en Paraguay	5
2.2. La sequía	6
2.2.1. Características	6
2.2.2. Clasificación	6
2.2.3. Impulsores	6
2.2.4. Consecuencias	7
2.3. Aridificación y sequía	8
2.4. Consistencia y completitud en series temporales	8
2.5. Cuantificación de la sequía meteorológica: Los índices SPI y SPEI . .	9

2.5.1.	El índice de precipitación estandarizada (SPI)	9
2.5.2.	Balance hídrico y el índice de precipitación-evapotranspiración estandarizado (SPEI)	9
2.5.3.	Acumulación del balance hídrico en múltiples escalas	10
2.6.	Fundamentos del agrupamiento no supervisado (clustering) para regionalización geográfica de la sequía	11
2.6.1.	Algoritmo de agrupamiento jerárquico aglomerativo	11
2.6.2.	Determinación de la partición óptima mediante el coeficiente de silueta	12
2.7.	Fundamentos del modelado estadístico para datos de panel	13
2.7.1.	Modelos de efectos fijos (FE) vs. efectos aleatorios (RE)	13
2.7.2.	Selección del modelo: El test de especificación de Hausman	14
2.7.3.	Supuestos y limitaciones del modelo de panel	15
2.8.	El rol del calentamiento global en las sequías	17
3.	Materiales y Métodos	19
3.1.	Diseño de la investigación	19
3.2.	Fuentes de datos y variables	19
3.2.1.	Procedimiento de extracción y validación de Datos	19
3.2.2.	Definición de variables climáticas	20
3.3.	Procedimiento, depuración e imputación de datos	20
3.3.1.	Algoritmo de imputación de temperatura por capas	21
3.3.2.	Criterio de no Imputación para la variable precipitación	22
3.4.	Agregación de datos y creación de la base mensual	22
3.5.	Construcción de la variable dependiente: el índice SPEI-6	23
3.6.	Regionalización geográfica mediante agrupamiento no supervisado	24
3.7.	Especificación del modelo de panel y test de Hausman	24
3.7.1.	Corrección de la dependencia espacial: el estimador de Driscoll y Kraay	25
3.8.	Marco de contraste SPEI vs. SPI para el aislamiento del efecto térmico	25
4.	Resultados	27
4.1.	Regionalización climatológica de la sequía en Paraguay	27
4.1.1.	Optimización y selección del número de clústeres	27
4.1.2.	Asignación de estaciones y validación de contigüidad geográfica	28
4.2.	Caracterización descriptiva de las dinámicas de sequía (2000–2023)	29

4.2.1.	Patrones estacionales del balance hídrico	30
4.2.2.	Análisis de frecuencia de eventos extremos	31
4.2.3.	Análisis de intensidad del déficit hídrico	31
4.2.4.	Análisis de la duración temporal (persistencia)	32
4.2.5.	Análisis de la extensión espacial de la sequía	32
4.3.	Resultados del modelo de datos de panel	34
4.3.1.	Selección del estimador: El test de especificación de Hausman	34
4.3.2.	Verificación de la dependencia de sección cruzada (correlación espacial)	35
4.3.3.	Estimación del modelo final	35
4.3.4.	Mecánica del modelo explicativo e integración de efectos	36
4.4.	Evaluación de la significancia del incremento de las temperaturas (Contraste SPEI vs. SPI)	38
5.	Discusión y conclusiones	40
5.1.	Discusión de los hallazgos climatológicos principales	40
5.1.1.	El calentamiento global como impulsor de la aridificación en Paraguay	42
5.2.	Conclusiones generales	42
5.2.1.	Cumplimiento de los objetivos y respuestas a las interrogantes	43
5.2.2.	Contraste y validación de las hipótesis de investigación	44
A.	Listado de estaciones meteorológicas utilizadas	46
B.	Entorno computacional	47
C.	Fuente oficial de los datos	49
Referencias		52
Referencias		52

Índice de cuadros

2.1. Clasificación de las condiciones de sequía y humedad según los valores del índice SPEI.	10
4.1. Coeficiente de silueta promedio según el número de particiones (clústeres).	28
4.2. Resultados del test de especificación de Hausman para la selección del estimador.	34
4.3. Estadísticas de ajuste del modelo de efectos aleatorios estimado con errores de Driscoll-Kraay.	36
4.4. Resultados del modelo de panel con efectos aleatorios para la variable dependiente SPEI-6. Errores estándar de Driscoll y Kraay (1998) robustos a la correlación espacial.	37
4.5. Comparación empírica de tendencias mensuales netas y significancia del efecto del calentamiento global (SPEI-6 vs. SPI-6).	39
5.1. Cuadro resumen de los hallazgos principales: efectos de nivel, tendencias netas significativas e impacto climatológico esperado al término del período ($t = 283$).	41
A.1. Listado completo de las 19 estaciones meteorológicas originales. . . .	46

Índice de figuras

4.1.	Resultados de la regionalización climática de la sequía en Paraguay (periodo 2000–2023): (A) Dendrograma de agrupamiento jerárquico aglomerativo utilizando la distancia de disimilitud de Ward; (B) Optimización del número de clústeres (k) mediante el coeficiente de silueta promedio; (C) Distribución espacial resultante de las estaciones meteorológicas terrestres clasificadas por subregión climática.	29
4.2.	Distribución mensual del índice SPEI-6 para las 18 estaciones seleccionadas durante el período 2000–2023. La línea horizontal negra dentro de cada caja representa la mediana de la distribución; los valores atípicos se grafican como puntos grises fuera de los bigotes.	30
4.3.	Caracterización analítico-descriptiva de las dinámicas de la sequía en Paraguay (2000–2023): (A) Frecuencia anual de meses-estación met. en sequía moderada y severa con línea de tendencia ajustada; (B) Evolución de la intensidad promedio y mínima anual del SPEI-6; (C) Distribución comparativa de la duración de eventos continuos entre el Periodo 1 (2000–2011) y el Periodo 2 (2012–2023); (D) Extensión espacial promedio anual (% de estaciones afectadas de forma simultánea) con línea de tendencia.	33

Capítulo 1

Introducción

Toda región geográfica tiene un balance hídrico, una oferta y demanda de agua que se ve afectada por factores climáticos como las precipitaciones y la evaporación potencial (ETP o PET), entendida como la cantidad de agua que se evaporaría por efecto de la temperatura y la transpiración de las plantas si hubiera suficiente agua disponible en el ambiente.

Técnicamente, una región es árida cuando la demanda de agua supera por lo menos en un 80 % a la oferta de precipitaciones, siendo una condición permanente y estructural. Cuando mediante un proceso dinámico de largo plazo se produce un cambio estructural hacia un clima más seco entonces se considera una aridificación. Otro concepto relacionado con la aridez es la sequía, esta anomalía climática transitoria no es nueva, donde las disponibilidades de agua se sitúan por debajo de los requerimientos normales de un área, de acuerdo con informes recientes de las Naciones Unidas (Tsegai y cols., 2022), la frecuencia y duración de las sequías han aumentado aproximadamente un 30 % a nivel global desde el año 2000.

Como afirma Mishra y Singh (2010), estos fenómenos comprometen de manera directa la seguridad alimentaria al afectar directamente a la agricultura, el acceso al recurso hídrico y la estabilidad macroeconómica. Eventos recurrentes o prolongados de sequía empujan a un ecosistema más allá de su límite de recuperación, consolidando un clima y un suelo más áridos.

La temperatura desempeña un rol fundamental en la dinámica de estos fenómenos, según Masson-Delmotte y cols. (2021), el incremento de las temperaturas globales provocado por el calentamiento global acelera la tasa de evaporación del agua del suelo y la transpiración de las plantas. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) sostiene de manera concluyente que el calentamiento del sistema climático global es inequívoco.

En Sudamérica, particularmente en la Cuenca del Río de la Plata", recientemente la sequía se manifestó con severidad a partir de mediados de 2019, dando inicio a una sequía extrema y prolongada que se extendió hasta finales de 2022. Este evento extremo provocó un estiaje histórico en los ríos Paraguay y Paraná, afectando de manera sostenida a sectores estratégicos como la agricultura, la navegación comercial fluvial y la generación de energía hidroeléctrica (Naumann y cols., 2023).

Paraguay, país mediterráneo y con una fuerte dependencia estructural de su economía respecto al sector agropecuario, enfrenta una alta vulnerabilidad ante estos escenarios. Dentro del espectro de amenazas climáticas, la sequía representa el fenómeno con mayor potencial de impacto económico negativo para el país (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2014).

1.1. Planteamiento del problema

Si bien, a nivel nacional, literaturas recientes han documentado tendencias ascendentes y estadísticamente significativas en las temperaturas medias anuales en gran parte del territorio nacional (Chávez, 2023), así como alteraciones en los regímenes de precipitación y en la frecuencia de eventos climáticos extremos (Chávez, 2023; Grassi, 2020), no se ha abordado de manera sistemática la sequía y la aridificación en un contexto del calentamiento global.

El problema metodológico e investigativo radica en la ausencia de una métrica sensible al calentamiento global para evaluar las sequías y la aplicación de modelos cuantitativos que estimen trayectorias dinámicas de largo plazo que nos permitan identificar procesos de *aridificación*.

Esta tesis tiene en cuenta la temperatura no solo desde la perspectiva del calentamiento global, sino también las fluctuaciones anuales que propician las estaciones (verano, invierno, primavera, otoño). Históricamente, el régimen climático de Paraguay se ha caracterizado por veranos húmedos e inviernos relativamente más secos; sin embargo, esta configuración estacional anual podría estar experimentando modificaciones estructurales como consecuencia de variaciones en las frecuencias, intensidad y duración de las sequías.

A partir de esta brecha de conocimiento para Paraguay, se formulan las siguientes preguntas de investigación considerando el período de estudio 2000–2023:

1. ¿Cuál es la disponibilidad y estructura de los datos oficiales considerando las precipitaciones y las temperaturas?

2. ¿Cómo medir las sequías y la aridificación en un contexto de calentamiento global?
3. ¿Qué características tuvo la sequía?
4. ¿Esta evolución del balance hídrico fue homogénea en todo el territorio nacional?
5. ¿Anualmente hubo divergencias dinámicas entre regiones climáticas considerando las estaciones climáticas anuales?
6. Considerando el balance hídrico, ¿el estudio de las sequías proporciona evidencia consistente de la influencia creciente del calentamiento global?

1.2. Justificación de la investigación

El desarrollo de este trabajo se justifica bajo tres dimensiones analíticas:

- *Dimensión Socioeconómica:* La cuantificación precisa del balance hídrico y sus dinámicas provee evidencia empírica clave para el diseño de políticas de adaptación sectorial, optimizando la gestión de riesgos en un sector agropecuario altamente vulnerable (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2014; Secretaría del Ambiente, 2017).
- *Dimensión Científica:* Supera las limitaciones de análisis climáticos previos al proveer una caracterización sistemática de la sequía en Paraguay basada en un análisis que integra la temperatura como un factor condicionante, mejorando su comprensión en el marco del calentamiento global.
- *Dimensión Metodológica:* Introduce el cálculo de un índice integrado sensible al calentamiento global y un modelado de datos de panel no explorado en el caso nacional, proporcionando un marco de análisis cuantitativo.

1.3. Hipótesis

Para guiar el análisis empírico, se plantean las siguientes hipótesis de investigación:

- H1:** El balance hídrico en Paraguay presenta una tendencia temporal durante el período 2000–2023 que no es uniforme a lo largo del año, sino que muestra dinámicas divergentes entre las distintas estaciones climáticas.

H2: Esta tendencia temporal exhibe un comportamiento espacialmente heterogéneo, no se manifiesta de manera uniforme en todo el territorio nacional, durante el período 2000–2023.

H3: El estudio de las sequías por medio del balance hídrico proporciona evidencia consistente de la influencia del calentamiento global.

1.4. Objetivos de la investigación

1.4.1. Objetivo general

Ajustar un modelo de datos de panel (panel data model) que integre variables sensibles al calentamiento global para conocer la evolución temporal del balance hídrico en Paraguay durante el período 2000–2023, considerando simultáneamente sus variaciones entre regiones geográficas y estaciones climáticas.

1.4.2. Objetivos específicos

1. Recopilar, depurar y estructurar una base de datos en formato de panel que integre los registros de precipitación y temperatura de las estaciones meteorológicas oficiales del Paraguay, aplicando criterios rigurosos de control de calidad y selección muestral.
2. Calcular las series mensuales de un índice estandarizado del balance hídrico (SPEI) que permitan medir la sequía en un contexto de calentamiento global durante el período bajo estudio.
3. Presentar un análisis descriptivo de la sequía para caracterizar sus patrones, frecuencia, intensidad, duración y extensión espacial de la sequía a nivel nacional.
4. Evaluar la distribución espacial del balance hídrico, identificando regiones climáticas homogéneas.
5. Estimar e interpretar los parámetros de un modelo de datos de panel ajustado sobre el SPEI para cuantificar las tendencias del balance hídrico y evaluar su heterogeneidad espacial y temporal entre estaciones climáticas.
6. Probar que el calentamiento global durante el período 2000–2023 en Paraguay tuvo un impacto estadísticamente significativo en el balance hídrico.

Capítulo 2

Marco Teórico

2.1. Antecedentes de investigación en Paraguay

El estudio de la sequía mediante índices de balance hídrico es un estándar internacional, su aplicación instrumental en Paraguay ha sido históricamente limitada. No obstante, investigaciones nacionales previas proveen las bases científicas para examinar las dinámicas térmicas locales.

Un aporte referencial es el de Chávez (2023), quien mediante pruebas estadísticas no paramétricas aplicadas a series históricas de temperatura (periodo 1960–2018), confirmó tendencias de calentamiento sistemáticas y estadísticamente significativas en la mayor parte de las estaciones meteorológicas terrestres del país; de forma complementaria, Pasten (2007) identificó un incremento significativo en la frecuencia de días y noches cálidas a nivel nacional. Además, Grassi (2020) determinó que la tasa de calentamiento observada en el Paraguay durante las últimas décadas supera el promedio mundial.

Un hallazgo relevante de Grassi (2020) es que, a pesar de registrarse incrementos leves en las medias de precipitación anual, la frecuencia y los impactos de las sequías extremas han aumentado significativamente durante el siglo XXI. Esto sugiere que las fluctuaciones térmicas positivas desempeñan un rol dominante en la intensificación del déficit hídrico por encima de la dinámica de las precipitaciones. Por último, las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2014) confirman que la persistencia de estas dinámicas inducirá choques de oferta desfavorables en la estabilidad económica nacional.

2.2. La sequía

2.2.1. Características

La sequía es un fenómeno de desarrollo lento y acumulativo. Sus efectos se manifiestan de manera gradual, lo que dificulta la determinación precisa de su inicio y final, pudiendo persistir durante años incluso después de que las condiciones meteorológicas hayan retornado a la normalidad (Mishra y Singh, 2010).

De acuerdo con Mishra y Singh (2010), las cuatro características fundamentales para el análisis de la sequía son: la intensidad, la duración, la frecuencia y la extensión espacial. El análisis conjunto de estas cuatro dimensiones resulta esencial para una evaluación integral del riesgo y la formulación de estrategias de mitigación efectivas.

2.2.2. Clasificación

Mishra y Singh (2010) ha desarrollado un marco conceptual estándar que clasifica la sequía en cuatro tipos principales, entendidos como una secuencia de propagación de impactos: sequía meteorológica, sequía agrícola, sequía hidrológica y sequía socio-económica. La presente investigación se centra en la caracterización y modelización de la *sequía meteorológica*. Esta elección se fundamenta en que representa el indicador primario y precursor de todos los demás impactos hidrológicos, agrícolas y socioeconómicos, convirtiéndose en el componente crítico para cualquier sistema de detección temprana. La sequía meteorológica se puede calcular a partir de datos disponibles en la red de estaciones terrestres, evitando los requerimientos de datos biofísicos complejos en gran parte no disponibles en el contexto nacional que demandan las otras clasificaciones.

2.2.3. Impulsores

Las causas de las sequías no se conocen con precisión absoluta, pero se han identificado una serie de factores naturales y otros productos de la actividad humana que contribuyen a su ocurrencia e intensidad.

El régimen pluviométrico de Paraguay se encuentra modulado por fenómenos climáticos de gran escala. El principal motor de la variabilidad interanual es El Niño-Oscilación del Sur (ENSO), un patrón de calentamiento y enfriamiento anómalo de las aguas superficiales del Océano Pacífico Ecuatorial.

El calentamiento global actúa como un factor crítico de intensificación. El incremento sostenido de las temperaturas eleva la evapotranspiración potencial (ETP), exacerbando la severidad de las sequías, según Naumann y cols. (2023) este proceso fue determinante en la reciente sequía extrema (2019-2022) registrada en la "Cuenca del Río de la Plata", donde las altas temperaturas extremaron el déficit hídrico preexistente provocado por la fase de La Niña.

La quema de combustible fósil, la deforestación, la explotación agrícola intensiva y la expansión urbana son algunas de las actividades humanas que impulsan las sequías (Velasco y cols., 2005).

2.2.4. Consecuencias

Paraguay presenta una alta susceptibilidad ante las consecuencias de la sequía. Estos impactos se manifiestan de manera transversal en los siguientes sectores clave:

- **Sector agropecuario:** La sequía agrícola reduce drásticamente el rendimiento de los cultivos de renta (como la soja y el maíz), disminuye la receptividad de las pasturas y puede aumentar las tasas de mortalidad ganadera (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2014).
- **Navegación fluvial:** El estiaje prolongado de los ríos Paraguay y Paraná, consecuencia directa de la sequía hidrológica, afecta la principal vía de importación y exportación comercial del país. La reducción del calado operativo de las barcas incrementa sustancialmente los costos logísticos y debilita la competitividad del comercio exterior.
- **Generación de energía hidroeléctrica:** La sequía hidrológica reduce el caudal de afluentes, comprometiendo la capacidad de generación y disminuyendo los ingresos estatales percibidos por la exportación de excedentes energéticos.
- **Aspectos sociales y ambientales:** La escasez de agua afecta de manera directa a las comunidades rurales y suburbanas vulnerables, limitando su acceso al agua potable y comprometiendo la agricultura de subsistencia. Adicionalmente, las condiciones prolongadas de sequedad y calor elevan exponencialmente el riesgo de propagación de incendios forestales, con la consecuente degradación de ecosistemas y pérdida de biodiversidad.

2.3. Aridificación y sequía

La sequía puede actuar como un factor desencadenante o un acelerador crítico del proceso de aridificación, cuando una región sufre una sequía severa y prolongada la energía solar calienta directamente el suelo y el aire circundante, este aumento de temperatura local incrementa la demanda atmosférica de agua (la evapotranspiración potencial o PET que mide el SPEI). Una atmósfera más cálida y seca reduce la probabilidad de lluvias locales creando un círculo vicioso que estabiliza las condiciones secas y acelera la transición hacia un régimen climático estructuralmente más árido. Bajo las condiciones del calentamiento global, las sequías actúan hoy como la "punta de lanza" de la aridificación.

2.4. Consistencia y completitud en series temporales climatológicas

Un desafío recurrente en la modelización climatológica es la presencia de registros faltantes, el tratamiento inapropiado de la falta de datos mediante la eliminación sistemática de periodos observacionales introduce un sesgo que disminuye sustancialmente el poder estadístico de los modelos y altera el cálculo de acumulaciones temporales consecutivas esenciales para los índices de sequía. De acuerdo con las directrices metodológicas de la Organización Meteorológica Mundial (World Meteorological Organization, 2017), la imputación de huecos cortos en series temporales es una práctica estandarizada y necesaria para asegurar la homogeneidad y consistencia de los datos.

El tratamiento de registros faltantes en esta investigación se fundamenta teóricamente en la preservación de la estructura de autocorrelación de las series continuas. Para variables con una alta inercia temporal, como la temperatura, se emplean interpolaciones lineales sobre ventanas temporales restringidas. En el caso de variables intermitentes y asimétricas, como la precipitación, la imputación se restringe a evaluaciones contextuales directas de vecindad temporal. Al limitar de manera estricta el proceso de imputación a huecos de corta duración (1 a 2 días), se evita la inserción de sesgo o variabilidad artificial, garantizando la consistencia analítica requerida para el posterior cálculo multiescalar de los índices de sequía.

2.5. Cuantificación de la sequía meteorológica: Los índices SPI y SPEI

Los índices cuantitativos estandarizados sintetizan las fluctuaciones climáticas instrumentales en un único valor numérico, permitiendo comparar la severidad espacial y temporal de las anomalías independientemente de la climatología local.

2.5.1. El índice de precipitación estandarizada (SPI)

El Índice de Precipitación Estandarizada (SPI), desarrollado por McKee, Doesken, y Kleist (1993), es uno de los indicadores más implementados. Parte de la premisa matemática de que el déficit acumulativo de precipitación representa el principal factor detrás de las condiciones de sequía. Consiste en ajustar los registros históricos de precipitación acumulada para una escala temporal seleccionada (por ejemplo, 3, 6 o 12 meses) a una función de distribución de probabilidad teórica, típicamente la distribución Gamma. Posteriormente, las probabilidades acumuladas resultantes se transforman mediante la inversa de la función de distribución normal estándar, produciendo un índice normalizado (Z-score) con media cero y varianza unitaria. Los valores negativos indican condiciones más secas de lo normal y los valores positivos condiciones húmedas. Su gran ventaja radica en su flexibilidad multiescalar y simplicidad operacional, al requerir únicamente registros de precipitación.

A pesar de su utilidad regulatoria, el SPI exhibe una limitación conceptual crítica en escenarios de cambio climático: ignora sistemáticamente la influencia de las anomalías de temperatura. El calentamiento global altera no solo los regímenes de precipitación, sino que incrementa de forma directa la demanda evaporativa de la atmósfera, un factor físico determinante en el balance hídrico del suelo. Por consiguiente, omitir la dinámica de la ETP puede resultar en una subestimación sustancial de la severidad de la sequía (Masson-Delmotte y cols., 2021).

2.5.2. Balance hídrico y el índice de precipitación-evapotranspiración estandarizado (SPEI)

Para resolver las limitaciones conceptuales del SPI ante el incremento térmico global, Vicente-Serrano, Beguería, y López-Moreno (2010) diseñaron el Índice de Precipitación-Evapotranspiración Estandarizado (SPEI). El SPEI preserva las propiedades matemáticas y la flexibilidad del SPI, pero fundamenta su cálculo en el *balance*

hídrico climático mensual (D_i), definido como la diferencia simple entre la precipitación (P_i) y la evapotranspiración potencial estimada (ETP_i):

$$D_i = P_i - ETP_i \quad (2.1)$$

El cálculo del índice acumula estas diferencias mensuales en diferentes escalas de tiempo históricas. Debido a que el balance hídrico puede tomar valores negativos, se recurre a la distribución Log-Logística de tres parámetros para ajustar las series temporales, ofreciendo una flexibilidad superior a la distribución Gamma de dos parámetros del SPI. Finalmente, se realiza el proceso de estandarización normal clásico para obtener los valores del SPEI (Z-score), permitiendo una clasificación objetiva de la intensidad de las anomalías hídricas (Cuadro 2.1).

Cuadro 2.1: Clasificación de las condiciones de sequía y humedad según los valores del índice SPEI.

Valor del SPEI	Categoría
2.00 o más	Extremadamente Húmedo
1.50 a 1.99	Severamente Húmedo
1.00 a 1.49	Moderadamente Húmedo
-0.99 a 0.99	Condiciones Normales
-1.00 a -1.49	Sequía Moderada
-1.50 a -1.99	Sequía Severa
-2.00 o menos	Sequía Extrema

2.5.3. Acumulación del balance hídrico en múltiples escalas

El déficit hídrico no genera impactos inmediatos, sino que actúa bajo dinámicas temporales multiescalares. En consecuencia, la serie temporal del balance hídrico mensual se acumula en diferentes escalas de tiempo temporales k (McKee y cols., 1993):

- SPEI a 3 meses (SPEI-3): Representa condiciones de balance a corto plazo, útil para caracterizar anomalías de humedad en la capa superficial del suelo.
- SPEI a 6 meses (SPEI-6): Actúa como una escala intermedia y puente entre las anomalías meteorológicas rápidas y los impactos de escala hidrológica en caudales menores.
- SPEI a 12 meses (SPEI-12): Mide variaciones a largo plazo asociadas a las reservas en acuíferos, embalses y sistemas fluviales de mayor envergadura.

Por su relevancia integral para capturar impactos de corto y mediano plazo de la sequía, se seleccionó al SPEI-6 como métrica para el análisis de la sequía, además siendo la variable dependiente del modelo ajustado.

2.6. Fundamentos del agrupamiento no supervisado (clustering) para regionalización geográfica de la sequía

Las divisiones político-administrativas o fisiográficas tradicionales de Paraguay (Región Oriental y Región Occidental) pueden no corresponder de manera exacta con los patrones meteorológicos y de balance hídrico dinámicos. Para resolver el problema de la variabilidad espacial de la sequía de manera objetiva vamos a utilizar los datos reales del SPEI-6 de cada estación meteorológica para agruparlas en regiones geográficas homogéneas, mediante un algoritmo de agrupamiento no supervisado, proporcionando un marco analítico riguroso para agrupar las estaciones meteorológicas basándose exclusivamente en la variabilidad temporal y covarianza de sus series históricas de balance hídrico.

2.6.1. Algoritmo de agrupamiento jerárquico aglomerativo

El Agrupamiento Jerárquico Aglomerativo (HAC, por sus siglas en inglés) es una técnica de partición espacial iterativa que opera de forma ascendente. El algoritmo inicia asignando a cada estación meteorológica individual su propio grupo (clúster) y, de forma sucesiva, procede a fusionar los dos grupos más similares en cada iteración hasta que todas las entidades se integran en una estructura de árbol única conocida como dendrograma.

Este método de agrupamiento es óptimo para datos climáticos que operan bajo estructuras anidadas y continuas. El dendrograma permite a los climatólogos inspeccionar la jerarquía y cercanía de las sub particiones a diferentes niveles de escala, una propiedad física que los métodos planos o no jerárquicos como K-Means omiten por completo (Gong y Richman, 1995).

Para dirigir de manera óptima las fusiones de los grupos en cada etapa y garantizar la homogeneidad interna, se implementa el criterio de enlace de Ward (Ward's minimum variance method). Este método busca minimizar de manera iterativa el incremento en la suma de los cuadrados de las distancias intra-grupo. El método de Ward

(Ward, 1963) es ampliamente reconocido en la literatura meteorológica y climatológica como el estimador más eficiente para la regionalización de variables continuas. Esto asegura que las estaciones dentro de cada clúster tengan series de SPEI-6 sumamente homogéneas y que los límites de los clústeres tiendan a ser esféricos y geográficamente compactos (Santos y cols., 2010).

La disimilitud o distancia temporal entre dos entidades X y Y se cuantifica mediante la distancia euclídea clásica calculada sobre la totalidad de sus observaciones a lo largo de la serie histórica:

$$d(X, Y) = \sqrt{\sum_{t=1}^T (X_t - Y_t)^2} \quad (2.2)$$

Donde T es el número de periodos analizados en el panel. Dado que el SPEI es un índice normalizado con media cero y desviación estándar unitaria (Z -score) en cada estación, la distancia euclídea al cuadrado guarda una relación directa con el coeficiente de correlación de Pearson (r_{xy}) entre ambas series:

$$d^2(X, Y) = 2T(1 - r_{xy}) \quad (2.3)$$

Esta equivalencia matemática demuestra que agrupar estaciones meteorológicas minimizando la distancia euclídea equivale a maximizar la sincronía temporal de sus anomalías hídricas. De este modo, las estaciones pertenecientes a un mismo grupo ingresarán, persistirán y saldrán de los eventos de sequía de manera homogénea a lo largo del tiempo.

2.6.2. Determinación de la partición óptima mediante el coeficiente de silueta

A fin de evitar la discrecionalidad en el corte jerárquico del dendrograma y determinar un número óptimo de regiones geográficas, se utiliza el criterio formal del Ancho de Silueta Promedio (Average Silhouette Width). Este indicador evalúa de manera simultánea la cohesión interna de cada grupo frente a su separación respecto a los grupos vecinos.

Para cada estación individual i , se calcula su respectivo coeficiente de silueta $s(i)$ mediante la relación:

$$s(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max\{a(i), b(i)\}} \quad (2.4)$$

Donde:

- $a(i)$ representa la distancia euclídea promedio entre la estación i y todos los demás miembros de su propio clúster.

- $b(i)$ representa la distancia promedio mínima entre la estación i y todos los miembros del clúster vecino más cercano.

El valor de $s(i)$ se halla estrictamente acotado en el intervalo $[-1, 1]$. Un valor cercano a 1 indica que la estación se encuentra correctamente asignada a su región y adecuadamente separada de las demás; un valor de 0 sugiere una zona de transición de baja diferenciación; y un valor negativo denota una clasificación incorrecta. El número óptimo de clústeres (k^*) se determina maximizando el ancho de silueta promedio de toda la red de estaciones M :

$$k^* = \arg \max_k \left(\frac{1}{M} \sum_{i=1}^M s(i) \right) \quad (2.5)$$

2.7. Fundamentos del modelado estadístico para datos de panel

El análisis de series temporales climatológicas observadas a través de redes terrestres de monitoreo presenta un desafío estadístico fundamental: la heterogeneidad espacial no observada. Cada estación meteorológica se halla condicionada por características físicas locales invariantes en el tiempo (como la altitud, la latitud, la topografía circundante o la geomorfología del suelo) que definen su nivel de base o intercepto climatológico.

Si estas características intrínsecas no se controlan de manera adecuada, sus efectos se combinan con la tendencia temporal estimada, induciendo sesgos severos por variable omitida. El análisis de datos de panel, o datos longitudinales, proporciona el marco de inferencia estadístico adecuado para aislar y resolver este problema (Wooldridge, 2010). Al observar de manera repetida las mismas estaciones meteorológicas a lo largo del tiempo, este enfoque metodológico permite descomponer la varianza observada en dos componentes analíticos fundamentales: la variación entre unidades (variación *between*) y la variación a lo largo del tiempo para una misma unidad (variación *within*).

2.7.1. Modelos de efectos fijos (FE) vs. efectos aleatorios (RE)

Existen dos aproximaciones teóricas alternativas para especificar estadísticamente la heterogeneidad no observada de las estaciones:

Modelo de efectos fijos (FE)

Asume que los interceptos de cada unidad de análisis son fijos y específicos para cada estación i , representados por el parámetro α_i . El estimador de efectos fijos, también conocido como estimador "within", elimina las características invariantes en el tiempo mediante la transformación por diferencias respecto a la media temporal de cada variable para cada unidad. La ventaja principal de este enfoque es que no requiere imponer el supuesto de ortogonalidad entre los efectos fijos específicos y las variables explicativas del modelo, controlando de manera robusta cualquier factor espacial invariante.

La especificación general del modelo FE se define como:

$$y_{it} = \alpha_i + \beta x_{it} + \varepsilon_{it} \quad (2.6)$$

Donde la transformación que elimina la heterogeneidad no observada opera como:

$$(y_{it} - \bar{y}_i) = \beta(x_{it} - \bar{x}_i) + (u_{it} - \bar{u}_i) \quad (2.7)$$

Modelo de efectos aleatorios (RE)

Este modelo asume que las características específicas invariantes de cada estación meteorológica, α_i , no actúan como parámetros fijos a estimar, sino como componentes aleatorios distribuidos de manera uniforme dentro del término de error compuesto del sistema. La hipótesis matemática fundamental del modelo de efectos aleatorios reside en la ortogonalidad o ausencia de correlación entre el componente aleatorio individual y los regresores del modelo. Si este supuesto de ortogonalidad se cumple, el estimador RE es estadísticamente más eficiente que el de efectos fijos, al utilizar de forma óptima tanto la variabilidad *within* como la variabilidad *between*.

La ecuación general se plantea de la siguiente forma:

$$y_{it} = \beta_0 + \beta x_{it} + (\alpha_i + \varepsilon_{it}) \quad (2.8)$$

Bajo la condición estricta de ortogonalidad:

$$Cov(\alpha_i, x_{it}) = 0 \quad (2.9)$$

2.7.2. Selección del modelo: El test de especificación de Hausman

La elección metodológica entre la aproximación de efectos fijos y efectos aleatorios no se determina de forma discrecional, sino que se fundamenta en la consistencia

estadística del modelo RE. El test de especificación de Hausman (Hausman, 1978) constituye la prueba estadística estándar para evaluar esta idoneidad.

Esta prueba contrasta sistemáticamente el vector de coeficientes estimados por el modelo FE (consistente bajo cualquier supuesto de correlación de los efectos individuales) frente al vector de coeficientes del modelo RE (consistente y eficiente únicamente bajo el supuesto de ortogonalidad). La hipótesis nula del test establece que no existen diferencias sistemáticas significativas entre ambos estimadores:

$$H_0 : \hat{\beta}_{FE} = \hat{\beta}_{RE} \quad (2.10)$$

Si el p-valor calculado para la estadística de prueba es inferior al nivel de significancia establecido (típicamente $\alpha = 0,05$), se rechaza la hipótesis nula, indicando la presencia de correlación y la obligatoriedad metodológica de implementar la aproximación de efectos fijos para garantizar la consistencia de las estimaciones. Por el contrario, un p-valor elevado sugiere que las estimaciones del modelo de efectos aleatorios son robustas y preferibles debido a su mayor eficiencia.

2.7.3. Supuestos y limitaciones del modelo de panel

La validez metodológica del modelo de efectos aleatorios descansa sobre la verificación de los siguientes supuestos analíticos clave:

1. *Exogeneidad estricta*: Se asume que el componente de error idiosincrático, ε_{it} , no se encuentra correlacionado con las variables explicativas para ningún periodo temporal observacional. La consistencia del efecto aleatorio individual α_i respecto a las variables explicativas se valida mediante el test de Hausman.
2. *Homocedasticidad y no autocorrelación del error*: Supone que los errores idiosincráticos presentan una varianza constante e independiente a través de las observaciones temporales para una misma entidad. Debido a que las series climatológicas suelen exhibir autocorrelación y heterocedasticidad, este estudio aborda preventivamente dicha potencial desviación mediante la estimación de errores estándar robustos agrupados (clustered robust standard errors) a nivel de estación meteorológica. Esta técnica estadístico-analítica parametriza las matrices de covarianza para tolerar patrones arbitrarios de correlación y heterocedasticidad dentro de cada clúster individual, derivando p-valores y límites de confianza robustos para la inferencia de tendencias.

Cálculo teórico de los errores estándar agrupados

En el modelado de datos de panel, la presencia de heterocedasticidad y autocorrelación serial intra-grupo invalida la inferencia estadística basada en los errores estándares ordinarios, tendiendo a subestimar su verdadera variabilidad. Para corregir esta desviación, se implementa el estimador de matriz de covarianza robusta agrupada por clústeres (estaciones), el cual generaliza la formulación de White para permitir patrones arbitrarios de correlación entre las observaciones temporales de una misma entidad (Wooldridge, 2010).

Considérese el modelo lineal agrupado por estaciones meteorológicas en su representación matricial para cada unidad i :

$$y_i = X_i\beta + u_i, \quad i = 1, 2, \dots, M \quad (2.11)$$

Donde $M = 18$ representa el número total de estaciones, y_i es el vector de observaciones del SPEI-6 de dimensión $T_i \times 1$, X_i es la matriz de regresores de dimensión $T_i \times K$, y u_i es el vector de perturbaciones idiosincráticas de dimensión $T_i \times 1$.

Bajo este esquema, se asume independencia mutua entre estaciones distintas ($Cov(u_i, u_j | X_i, X_j) = 0$ para todo $i \neq j$), pero se tolera una estructura de varianza-covarianza desconocida y no paramétrica dentro de cada clúster i (denotada por $\Omega_i = E[u_i u_i' | X_i]$). El estimador robusto agrupado sustituye esta matriz por el producto cruzado de los residuos muestrales del modelo ($\hat{u}_i = y_i - X_i \hat{\beta}$).

De este modo, la estimación empírica de la matriz de varianza-covarianza de los coeficientes, $\widehat{Var}_{robust}(\hat{\beta})$, se calcula de manera compacta mediante la estructura de tipo "sándwich":

$$\widehat{Var}_{robust}(\hat{\beta}) = q \cdot \left(\sum_{i=1}^M X_i' X_i \right)^{-1} \left(\sum_{i=1}^M X_i' \hat{u}_i \hat{u}_i' X_i \right) \left(\sum_{i=1}^M X_i' X_i \right)^{-1} \quad (2.12)$$

Donde q es el factor de corrección multiplicativo por tamaño muestral finito, diseñado para reducir el sesgo de subestimación en paneles donde el número de clústeres M es limitado:

$$q = \left(\frac{M}{M-1} \right) \left(\frac{N-1}{N-K} \right) \quad (2.13)$$

Siendo $N = \sum T_i$ el número total de observaciones mensuales del panel (5,094) y K el número de parámetros estimados. Los errores estándar agrupados por estación corresponden a la raíz cuadrada de los elementos de la diagonal principal de esta matriz resultante.

3. *Independencia de sección cruzada:* Se asume que las perturbaciones idiosincráticas de diferentes unidades (estaciones) son independientes entre sí. Sin embargo, en el contexto climatológico, esta suposición es frecuentemente violada debido a la presencia de choques macroclimáticos comunes que afectan simultáneamente a múltiples estaciones (como el ENSO o el calentamiento global). Este acoplamiento físico induce una violación al supuesto clásico de independencia distributiva de las perturbaciones idiosincráticas entre las unidades transversales:

$$\text{Cov}(\varepsilon_{it}, \varepsilon_{jt}) \neq 0 \quad \text{para } i \neq j \quad (2.14)$$

La presencia de esta correlación, denominada en la literatura estadística como dependencia de sección cruzada o correlación espacial, no sesga los coeficientes de pendiente estimados, pero invalida la inferencia estadística clásica al subestimar severamente la magnitud de los errores estándar (Wooldridge, 2010). Para abordar esta limitación, se implementará el test de dependencia de sección cruzada desarrollado por Pesaran (2004), el cual contrasta la hipótesis nula de independencia espacial mutua a partir del promedio de las correlaciones lineales de los residuos de sección cruzada:

$$CD = \sqrt{\frac{2T}{N(N-1)}} \left(\sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N \hat{\rho}_{ij} \right) \quad (2.15)$$

Donde $\hat{\rho}_{ij}$ representa el coeficiente de correlación muestral de Pearson entre los residuos de la unidad i y la unidad j . Bajo la hipótesis nula, el estadístico se distribuye de forma asintótica como una normal estándar ($CD \xrightarrow{d} N(0, 1)$).

Finalmente, una limitación inherente al marco de modelización propuesto reside en su especificación de tendencia lineal. El estimador asume una tasa de cambio constante en la anomalía hídrica a lo largo del periodo temporal estudiado, constituyendo una primera aproximación de tendencia a largo plazo que no captura dinámicas no lineales o cambios abruptos de régimen climático.

2.8. El rol del calentamiento global en las sequías

En el contexto del cambio climático, el concepto clásico de sequía como un fenómeno impulsado exclusivamente por el déficit de precipitación ha quedado obsoleto. Las investigaciones de Trenberth y cols. (2014) introducen el concepto de "sequías más cálidas" (*hotter droughts*), caracterizadas por un acoplamiento estrecho entre el

déficit de suministro de agua (lluvias) y el incremento desproporcionado de la demanda atmosférica (evapotranspiración potencial o ETP), impulsada de forma directa por el calentamiento global.

Para aislar el efecto de la ETP sobre el balance hídrico, recurrimos al contraste sistemático de dos índices: el Índice de Precipitación Estandarizada (SPI), que mide de forma univariada las anomalías de suministro de lluvia (McKee y cols., 1993), y el Índice de Precipitación-Evapotranspiración Estandarizado (SPEI), que incorpora la sensibilidad a la temperatura mediante la deconstrucción de la ETP (Vicente-Serrano y cols., 2010).

Desde una perspectiva física, dado que ambos índices se calculan utilizando idéntica escala temporal y normalización normal estándar, la divergencia estadística y temporal entre sus respectivas tendencias ($Trend_{SPEI} - Trend_{SPI}$) representa el residuo térmico aislado. Este residuo constituye la huella del calentamiento global sobre el ciclo hidrológico. Si el SPI muestra estabilidad a largo plazo (ausencia de tendencias significativas en las lluvias), pero el SPEI revela tendencias decrecientes significativas hacia la sequedad, proporciona evidencia empírica de que el incremento de las temperaturas impulsadas por el calentamiento global está exacerbando el balance hídrico.

Capítulo 3

Materiales y Métodos

3.1. Diseño de la investigación

La presente investigación se inscribe en un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, observacional, retrospectivo, longitudinal y explicativo. Es de carácter observacional y no experimental debido a que las variables climáticas se analizan de forma pasiva, tal como ocurrieron de manera natural en el entorno, sin manipulación deliberada. Posee un enfoque retrospectivo, puesto que se examinan registros históricos de un período extendido de 24 años (2000–2023). Asimismo, su diseño es longitudinal y explicativo mediante el uso de una estructura de datos de panel, orientada a estimar parámetros de tendencia de largo plazo para explicar y contrastar formalmente las hipótesis sobre las dinámicas de la sequía y el proceso de aridificación en Paraguay.

3.2. Fuentes de datos y variables

Los datos primarios corresponden a los registros meteorológicos diarios provistos por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) del Paraguay.

3.2.1. Procedimiento de extracción y validación de Datos

La serie temporal diaria analizada comprende el período desde el 1 de enero de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2023. La fecha de extracción y recepción oficial de la base de datos fue el 9 de mayo de 2024 (Expediente N.º 213.042/2024; ver Apéndice C), tras una solicitud formal gestionada a través de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN) de la Universidad Nacional de Asunción.

De forma complementaria, se recopilaron los metadatos de las estaciones terrestres, incluyendo su nombre oficial, identificador (ID Estación), coordenadas geográficas de posicionamiento (latitud y longitud decimal) y su macroregión geográfica correspondiente (Región Oriental o Región Occidental).

3.2.2. Definición de variables climáticas

El análisis de datos de panel se centra de manera exclusiva en las variables de precipitación diaria (lluvia) y temperatura media diaria como factores determinantes del balance hídrico. Las variables críticas recopiladas con frecuencia diaria para cada estación meteorológica fueron:

- *Precipitación diaria* (P_t): medida en milímetros (mm).
- *Temperatura media diaria* ($T_{med,t}$): medida en grados Celsius ($^{\circ}C$).
- *Temperatura máxima diaria* ($T_{máx,t}$): usada como variable de apoyo para la imputación térmica ($^{\circ}C$).
- *Temperatura mínima diaria* ($T_{mín,t}$): usada como variable de apoyo para la imputación térmica ($^{\circ}C$).

3.3. Procedimiento, depuración e imputación de datos

Se examinó la cobertura histórica de cada una de las 19 estaciones terrestres respecto al rango teórico esperado de 8,766 días (24 años). El análisis de completitud determinó que la estación de Paraguarí (PARA) presentaba un truncamiento temporal crítico: sus registros inician únicamente a partir del 1 de abril de 2006, registrando una pérdida masiva superior al 26 % de la serie temporal bajo estudio (2,282 días faltantes).

Con el fin de evitar un sesgo por truncamiento sistemático de la serie temporal nacional, se decidió excluir de manera definitiva la estación de Paraguarí (PARA). Las 18 estaciones restantes exhibieron tasas de completitud de fechas superiores al 97.9 %, conformando la muestra final del estudio. Sobre esta red de 18 estaciones se construyó un panel balanceado inicial de 157,788 registros diarios ($18 \text{ estaciones} \times 8,766 \text{ días}$). Las filas correspondientes a fechas faltantes originalmente en cada estación fueron insertadas e inicializadas con valores nulos (NaN).

3.3.1. Algoritmo de imputación de temperatura por capas

Para asegurar la continuidad temporal de la temperatura media diaria (T_{med}) y evitar la pérdida de observaciones mensuales, se diseñó e implementó un algoritmo de imputación estructurado en tres capas jerárquicas:

1. *Capa 1: Imputación por relación térmica.* Para aquellos días donde se registró la ausencia de la temperatura media (T_{med}) pero se disponía de los registros válidos de temperatura máxima ($T_{máx}$) y mínima ($T_{mín}$), se estimó el valor faltante como el promedio aritmético de las temperaturas extremas diarias:

$$T_{med,t} = \frac{T_{mín,t} + T_{máx,t}}{2} \quad (3.1)$$

Este procedimiento permitió recuperar con precisión física un total de 342 días del panel.

2. *Capa 2: Interpolación lineal para vacíos cortos (≤ 3 días).* Para los registros nulos persistentes de temperatura media, se analizó la longitud de los vacíos consecutivos. Para brechas de duración corta, definidas estrictamente entre 1 y 3 días consecutivos (que representan el 37.1 % del total de datos térmicos faltantes en la red), se aplicó una interpolación lineal temporal basada en la inercia térmica de los días adyacentes válidos. Esta capa recuperó un total de 655 días de registro.
3. *Capa 3: Imputación espacial por estación vecina (≥ 4 días).* Para vacíos de información térmica igual o mayor a cuatro días consecutivos, la interpolación temporal directa pierde validez física al ignorar la variabilidad sinóptica de mediano plazo. En consecuencia, se aplicó un método de transferencia espacial basado en la cercanía geográfica.

Utilizando las coordenadas geográficas de las 18 estaciones meteorológicas seleccionadas, se calculó una matriz de distancias mutuas (ortodrómicas) que permitió identificar de forma unívoca a la estación vecina más cercana para cada punto de la red (por ejemplo, la menor distancia registrada correspondió al par Coronel Oviedo-Villarrica con solo 25,75 km, mientras que la mayor distancia de vecindad se registró en el Chaco Profundo entre Mariscal Estigarribia y Pozo Colorado con 248,84 km).

Para cada fecha que presentaba vacíos térmicos prolongados en la estación objetiva, se transfirió directamente el registro diario de temperatura media depurada

($T_{\text{med_imputada}}$) correspondiente a su vecina más cercana en ese mismo día. Este procedimiento de interpolación espacial permitió recuperar con precisión climatológica un total de 1,114 observaciones diarias. Al término de esta tercera capa jerárquica de imputación, se logró una tasa de completitud global en las series de temperatura media diaria del 99.99 %, registrando únicamente 9 datos nulos residuales en toda la base de datos de panel maestro para las 18 estaciones a lo largo de los 24 años de estudio.

3.3.2. Criterio de no Imputación para la variable precipitación

A diferencia de la temperatura, la precipitación diaria es una variable altamente asimétrica, intermitente y no continua. Debido a que las fallas instrumentales y los vacíos de transmisión de la red meteorológica ocurren por factores técnicos o administrativos totalmente independientes del estado del tiempo, no existe relación causal entre la omisión del dato y el evento físico de lluvia. Bajo esta premisa, como lo afirma Wooldridge (2010), el sesgo no depende de la cantidad o el patrón de los datos faltantes, sino de la naturaleza del mecanismo de selección que genera esos nulos. Si la falta de datos es aleatoria o técnica, el estimador de efectos fijos manejará correctamente el desbalance del panel sin introducir sesgos de truncamiento temporal.

Consecuentemente, se adoptó la decisión metodológica de no aplicar ningún método de imputación sobre la variable precipitación. Forzar estimaciones (ya sean interpolaciones lineales o vecindades) sobre la lluvia introduciría sesgos artificiales severos, alterando la frecuencia real de días lluviosos y la magnitud acumulada de los eventos.

3.4. Agregación de datos y creación de la base mensual

Dado que el balance hídrico y el cálculo del SPEI se analizan a nivel mensual, el panel diario depurado de 18 estaciones fue agregado a una frecuencia mensual de 288 meses consecutivos por estación (5,184 observaciones mensuales potenciales).

Para garantizar la fiabilidad física de los agregados mensuales, se implementó la regla de exclusión recomendada por la Organización Meteorológica Mundial (World Meteorological Organization, 2017):

- *lluvia_total*: suma mensual de la precipitación diaria. Se define como nula (*NaN*) si el mes correspondiente registra menos de 25 días con observaciones de lluvia completas.

- *temp_media*: promedio mensual de la temperatura media diaria imputada. Se define como nula si el mes registra menos de 25 días con datos térmicos válidos.

Este procedimiento determinó un panel mensual final caracterizado por una alta completitud: la serie de temperatura media mensual reportó un único dato nulo (0,01 %), mientras que la serie de precipitación mensual acumulada presentó únicamente 82 registros nulos (1,58 %) de un total de 5,184 observaciones.

3.5. Construcción de la variable dependiente: el índice SPEI-6

Para el cálculo del Índice de Precipitación-Evapotranspiración Estandarizado a escala de 6 meses (SPEI-6) sobre las 18 estaciones finales, se ejecutó secuencialmente la siguiente formulación matemática:

1. *Cálculo de la ETP mensual (Thornthwaite)*: Estimación de la demanda evaporativa potencial mediante el método empírico de Thornthwaite (1948), utilizando la temperatura media mensual (T_{avg}) y la latitud geográfica de cada estación para derivar el exponente empírico a y el factor de corrección latitudinal mensual K .
2. *Cálculo del balance hídrico mensual (D_i)*: Definido como la diferencia simple entre la precipitación total mensual (P_i) y la ETP ajustada (ETP_i) para cada mes i : $D_i = P_i - ETP_i$.
3. *Acumulación multiescalar (D_i^k)*: Para capturar los efectos de mediano plazo se acumuló el balance hídrico mensual en una ventana temporal de $k = 6$ meses de forma consecutiva (McKee y cols., 1993).
4. *Ajuste paramétrico Pearson Tipo III*: Los valores acumulados de balance hídrico (D_i^6) fueron ajustados a una distribución teórica Pearson Tipo III (Gamma de tres parámetros) para estimar la probabilidad acumulada $P = F(x)$, lo cual resulta óptimo para tolerar asimetrías y valores negativos de balance.
5. *Estandarización Normal estándar*: La probabilidad acumulada P se transformó en anomalías estandarizadas normales (Z-scores) mediante la aproximación racional analítica de Abramowitz y Stegun (1965). El valor final resultante constituye la variable dependiente de panel, SPEI-6.

3.6. Regionalización geográfica mediante agrupamiento no supervisado

Para analizar la distribución espacial de la sequía y evitar límites políticos arbitrarios, se aplicó un algoritmo de agrupamiento jerárquico aglomerativo (HAC) sobre las series de SPEI-6 de las 18 estaciones. Se implementó la distancia de disimilitud euclídea y el criterio de enlace de varianza mínima de Ward. El número óptimo de subregiones climáticas (k^*) se determinó mediante la maximización del Coeficiente de Silueta Promedio de Rousseeuw (Rousseeuw, 1987).

3.7. Especificación del modelo de panel y test de Hausman

Para cuantificar las tendencias temporales del balance hídrico se ajustó el modelo de regresión lineal de panel especificado en la ecuación 3.2 y la selección entre la estimación por efectos fijos (FE) y efectos aleatorios (RE) se fundamentó en el test de especificación de Hausman (1978), evaluando formalmente la consistencia del estimador RE frente a la ortogonalidad de los efectos individuales no observados de las 18 estaciones meteorológicas. Para esto se utilizó la librería *linearmodels* de Python.

La especificación completa del modelo estimado, incluyendo todas las variables e interacciones, fue la siguiente:

$$\begin{aligned}
 \text{SPEI-6}_{it} = & \beta_0 + \beta_1 \text{tiempo}_t + \sum_{s=1}^3 \gamma_s \text{estacion-climatica}_{s,t} + \delta_1 \text{region-geografica}_i \\
 & + \sum_{s=1}^3 \theta_s (\text{tiempo}_t \times \text{estacion-climatica}_{s,t}) + \phi_1 (\text{tiempo}_t \times \text{region-geografica}_i) \\
 & + \sum_{s=1}^3 \psi_s (\text{estacion-climatica}_{s,t} \times \text{region-geografica}_i) \\
 & + \sum_{s=1}^3 \omega_s (\text{tiempo}_t \times \text{estacion-climatica}_{s,t} \times \text{region-geografica}_i) + u_{it}
 \end{aligned} \tag{3.2}$$

donde $u_{it} = \alpha_i + \varepsilon_{it}$ es el término de error compuesto, y los términos $\text{estacion-climatica}_{s,t}$ y $\text{region-geografica}_i$ son variables dummies para las categorías estacionales climáticas (invierno, primavera, verano, otoño) y regionales geográficas (clusters), respectivamente.

3.7.1. Corrección de la dependencia espacial: el estimador de Driscoll y Kraay

Para controlar y corregir de manera simultánea la presencia de autocorrelación serial temporal y de correlación espacial o de sección cruzada identificada en la red de monitoreo, se prescinde de los errores estándar de clúster convencionales y se adopta el estimador de matriz de covarianza robusto desarrollado por (Driscoll y Kraay, 1998).

El método de Driscoll-Kraay es un estimador no paramétrico de matriz de covarianza consistente ante la presencia de heterocedasticidad, autocorrelación y cualquier forma de dependencia espacial o de sección cruzada. Su ventaja metodológica radica en que estima la estructura de covarianza de las medias temporales de los momentos transversales mediante un estimador tipo Newey-West con un kernel espectral de Bartlett, asegurando la consistencia de los errores estándar y garantizando intervalos de confianza robustos para la inferencia de las tendencias dinámicas de sequía a nivel nacional (Wooldridge, 2010).

3.8. Marco de contraste SPEI vs. SPI para el aislamiento del efecto térmico

Para dar cumplimiento a nuestro objetivo específico y contrastar de manera formal la hipótesis 3 (H3), se diseñó un marco experimental comparativo. El procedimiento consiste en estimar de forma paralela la ecuación del modelo de regresión de panel de efectos aleatorios (Ecuación 3.2) sobre dos variables dependientes distintas:

$$\text{SPEI-6}_{it} = \mathbf{x}'_{it} \beta_{\text{SPEI}} + u_{it} \quad (3.3)$$

$$\text{SPI-6}_{it} = \mathbf{x}'_{it} \beta_{\text{SPI}} + v_{it} \quad (3.4)$$

Donde β_{SPEI} y β_{SPI} representan los vectores de parámetros estimados para los modelos de balance hídrico y precipitación univariada, respectivamente. El efecto aislado de la ETP sobre la dinámica temporal del balance hídrico se define para cada estación del año y región como la diferencia entre sus respectivas tendencias netas mensuales calculadas ($\Delta\beta_{\text{neto}} = \beta_{\text{neto,SPEI}} - \beta_{\text{neto,SPI}}$).

La significancia estadística del efecto del aumento de la demanda evaporativa impulsada por el aumento de las temperaturas (calentamiento global) ($H_0 : \beta_{\text{neto,SPEI}} - \beta_{\text{neto,SPI}} = 0$) se evalúa mediante la estimación de intervalos de confianza del 95 % y pruebas de Wald para diferencias de coeficientes de pendiente comunes entre am-

bas regresiones de panel, aislando así el efecto puro de la temperatura por encima del régimen de precipitaciones.

Capítulo 4

Resultados

4.1. Regionalización climatológica de la sequía en Paraguay

Antes de proceder a caracterizar los eventos de sequía y estimar tendencias dinámicas mediante el modelado de datos de panel, examinamos desde una perspectiva empírica y de balance hídrico, la variabilidad espacial de la sequía en Paraguay.

Con el propósito de establecer subregiones climáticas homogéneas de manera objetiva, se aplicó un algoritmo de agrupamiento jerárquico aglomerativo sobre la matriz de datos continuos mensuales del índice SPEI-6 para las 18 estaciones meteorológicas seleccionadas durante el período 2000–2023. El preprocesamiento de la base detectó 90 celdas con valores perdidos en las series temporales originales del SPEI-6, los cuales fueron resueltos mediante interpolación lineal temporal antes de proceder con el agrupamiento.

4.1.1. Optimización y selección del número de clústeres

La jerarquía de fusiones consecutivas calculada por el algoritmo de Ward se representa de manera gráfica en el dendrograma de disimilitud de la Figura 4.1 (Panel A). Para evitar la discrecionalidad en el corte jerárquico de este dendrograma, se calculó el coeficiente de silueta promedio para un rango operativo de $k \in [2, 5]$ clústeres. El Cuadro 4.1 expone los resultados de esta optimización espacial, la cual se ilustra además en la curva de optimización de la Figura 4.1 (Panel B).

El coeficiente de silueta promedio alcanza su máximo global para una estructura de $k^* = 2$ clústeres ($s = 0,1758$), indicando que una partición de dos regiones climáticas

Cuadro 4.1: Coeficiente de silueta promedio según el número de particiones (clústeres).

Número de clústeres (k)	Coeficiente de silueta promedio
$k = 2$	0.1758
$k = 3$	0.1682
$k = 4$	0.1548
$k = 5$	0.1592

proporciona la máxima cohesión intra-grupo y la mayor diferenciación inter-grupo. Las particiones alternativas de 3, 4 o 5 grupos muestran un decaimiento progresivo en la calidad de la silueta, justificando estadísticamente la selección de dos subregiones hídricas óptimas a nivel nacional para el período bajo estudio.

4.1.2. Asignación de estaciones y validación de contigüidad geográfica

Para validar la coherencia climática y física de la regionalización propuesta, se contrastó la asignación temporal derivada del clustering de SPEI-6 con la ubicación geográfica (latitud y longitud) de las estaciones terrestres. La evaluación cuantitativa de las distancias euclídeas de posicionamiento reveló que la distancia geográfica promedio entre estaciones asignadas al mismo clúster (distancia intra-clúster) es de $2,438^\circ$ decimales (aproximadamente 260 km), mientras que la distancia promedio entre estaciones pertenecientes a clústeres distintos (distancia inter-clúster) asciende a los $3,322^\circ$ decimales (aproximadamente 360 km).

Esta diferencia confirma la existencia de una contigüidad geográfica compacta. Como se presenta visualmente en el mapa de la Figura 4.1 (Panel C), la clasificación basada en el SPEI-6 ha particionado el territorio nacional de manera limpia, delimitando dos subregiones climáticas claramente definidas:

1. *Subregión sur-este (Clúster 2)*: Integrada por las estaciones de Caazapá (CAAZ), Villarrica (VILL), Coronel Oviedo (COVIE), San Juan Bautista (SJBA), Minga Guazú (MINGA), Capitán Meza (CMEZA) y Encarnación (ENCAR). Este bloque representa el sur y este de la Región Oriental, la zona de mayor pluviometría de Paraguay, caracterizada históricamente por balances hídricos promedio superavitarios y una menor inercia a eventos de sequía extrema prolongada.
2. *Subregión centro-chaco (Clúster 1)*: Conformada por las estaciones de Mariscal Estigarribia (MCAL), Puerto Casado (PTOC), Pozo Colorado (PCOL), Gral.

José María Bruguez (GBRU), Concepción (CONC), San Pedro (SPED), San Estanislao (SEST), Salto del Guairá (SGUA), Luque (LUQUE). Esta franja geográfica continua se extiende desde el Chaco profundo y húmedo, cruzando el río Paraguay hacia el centro-norte y norte de la Región Oriental. Comparten un régimen de mayor inestabilidad climática, una estación seca invernal muy pronunciada y promedios térmicos elevados que incrementan de forma sistemática la demanda evaporativa.

Esta partición de dos subregiones climáticas óptimas reemplazará la división regional clásica en todos los análisis descriptivos e inferenciales subsiguientes de la investigación, permitiendo examinar el proceso de aridificación con un mayor grado de precisión espacial.




Figura 4.1: Resultados de la regionalización climática de la sequía en Paraguay (período 2000–2023): (A) Dendrograma de agrupamiento jerárquico aglomerativo utilizando la distancia de disimilitud de Ward; (B) Optimización del número de clústeres (k) mediante el coeficiente de silueta promedio; (C) Distribución espacial resultante de las estaciones meteorológicas terrestres clasificadas por subregión climática.

4.2. Caracterización descriptiva de las dinámicas de sequía (2000–2023)

Para comprender la caracterización de la sequía en Paraguay, esta sección aborda cinco dimensiones analíticas fundamentales: estacionalidad anual, frecuencia de eventos, intensidad, duración temporal y extensión espacial de las anomalías de balance hídrico. Los resultados estadísticos se sintetizan de forma gráfica en la Figura 4.3.

4.2.1. Patrones estacionales del balance hídrico

El análisis de la distribución mensual del SPEI-6, presentado mediante diagramas de caja en la Figura 4.2, revela la existencia de un ciclo estacional marcado en las condiciones hídricas del país. La variabilidad observada a lo largo de los meses muestra que Paraguay experimenta transiciones significativas entre periodos de superavit hídrico y de déficit hídrico.




Figura 4.2: Distribución mensual del índice SPEI-6 para las 18 estaciones seleccionadas durante el período 2000–2023. La línea horizontal negra dentro de cada caja representa la mediana de la distribución; los valores atípicos se grafican como puntos grises fuera de los bigotes.

Como se ilustra en la Figura 4.2, el final del invierno y el inicio de la primavera (agosto y septiembre) constituyen climatológicamente los meses más secos a nivel de base. Durante estos meses, las medianas del SPEI-6 se posicionan de manera sistemática en valores negativos, siendo las únicas del ciclo anual claramente situadas por debajo de la línea de neutralidad hídrica ($\text{SPEI} = 0$). Este comportamiento físico se corresponde con la marcada disminución estacional de las precipitaciones en el territorio nacional durante el período frío, lo que reduce la humedad superficial disponible.

En contraste, los meses correspondientes al final del verano y el otoño (de febrero a mayo) se perfilan consistentemente como los períodos con mayor superavit hídrico, exhibiendo medianas del SPEI-6 con desviaciones positivas. No obstante, un detalle de gran relevancia para la caracterización de las sequías en Paraguay radica en la distribución de los valores atípicos (extremos) durante los meses de verano, específicamente en diciembre y enero.

A pesar de que el verano se caracteriza en promedio por un balance hídrico neutral a

ligeramente húmedo, los valores mínimos extremos del índice —aquellos que superan el umbral de sequía extrema ($SPEI-6 \leq -2,0$) y alcanzan anomalías severas inferiores a $-3,5$ — se registran con frecuencia durante el período estival. Este comportamiento evidencia que, aunque las lluvias de verano suelen ser cuantitativamente abundantes en Paraguay, las anomalías de temperaturas extremas que ocurren de manera sincrónica en esta estación pueden disparar de tal forma la demanda evaporativa de la atmósfera (ETP) que superan el volumen de precipitaciones. De este modo, se configuran sequías estivales rápidas y severas que actúan como propulsoras del proceso de aridificación estacional.

4.2.2. Análisis de frecuencia de eventos extremos

Para cuantificar los cambios en la ocurrencia de la sequía, se evaluó la frecuencia anual de “meses-estación met.” que superaron los umbrales de sequía moderada ($SPEI-6 \leq -1,0$) y sequía severa/extrema ($SPEI-6 \leq -1,5$). Como se ilustra en la Figura 4.3 (Panel A), existe una tendencia positiva en la frecuencia de estos eventos a lo largo de los 24 años analizados.

Durante la primera década del estudio (2000–2009), la ocurrencia de meses en sequía se mantuvo dentro de los límites de variabilidad interanual normal del país. No obstante, a partir de 2019 se observa un quiebre estructural sin precedentes en la serie histórica. El pico máximo de frecuencia se registró en el año 2020, acumulando una cifra récord de 80 meses-estación met. bajo condiciones de sequía moderada o severa. Considerando que el total anual posible de meses-estación met. para la red de 18 estaciones es de 216 (18×12), este resultado indica que aproximadamente el 37 % del territorio nacional monitoreado experimentó déficit hídrico de forma simultánea a lo largo del año 2020, consolidando la crisis más generalizada de las últimas dos décadas.

4.2.3. Análisis de intensidad del déficit hídrico

La intensidad de la sequía se examinó mediante dos descriptores anuales: la intensidad promedio de los meses en sequía ($SPEI-6 \leq -1,0$) y el valor mínimo absoluto registrado en la red de estaciones. Como se expone en la Figura 4.3 (Panel B), ambas métricas muestran una trayectoria de agravamiento del déficit.

El promedio anual de la intensidad de las sequías ha transitado de valores estables cercanos a $-1,20$ a inicios del período estudiado, hacia promedios sistemáticamente inferiores a $-1,60$ en los últimos años del registro. El mínimo absoluto de toda la serie

histórica se registró en diciembre de 2023 (2023-12), alcanzando un valor extremo de $-3,7103$ en la estación de Mariscal Estigarribia (MCAL), ubicada en el chaco central (Región Occidental). Este registro, que se sitúa a casi cuatro desviaciones estándar por debajo de la normal climatológica, supera ampliamente el umbral técnico de sequía extrema ($SPEI - 6 \leq -2,0$). Este comportamiento ilustra la severidad que adquieren las sequías de Paraguay cuando las anomalías de temperatura potencian la demanda evaporativa en ausencia de precipitaciones, actuando como un impulsor físico del proceso de aridificación local.

4.2.4. Análisis de la duración temporal (persistencia)

La duración de los eventos de sequía (persistencia temporal) se evaluó mediante un análisis de rachas, definiendo la duración de un evento como el número de meses consecutivos en que una estación meteorológica registra un valor de $SPEI - 6 \leq -1,0$. Bajo este esquema metodológico, la duración promedio general de los eventos de sequía para el territorio nacional durante los 24 años analizados se ubicó en 2,96 meses, alcanzando una racha máxima absoluta de 14 meses continuos de déficit hídrico extremo, según se describe en la Figura 4.3 (Panel C).

Para examinar si el cambio climático ha alterado la persistencia temporal de estos fenómenos a mediano plazo, se contrastaron los resultados agregados del primer intervalo de estudio (Periodo 1: 2000–2011) frente al intervalo de calentamiento más pronunciado (Periodo 2: 2012–2023).

El análisis de distribución de frecuencias de las rachas de sequía evidencia un cambio estructural notable. Durante el Periodo 1, la duración promedio de las sequías fue de 2,80 meses. En contraste, para el Periodo 2, este indicador de persistencia hídrica se incrementó a 3,12 meses, lo que representa un aumento relativo del 12% en la persistencia del fenómeno. El incremento en el promedio de las rachas consecutivas indica que, en las últimas dos décadas, los sistemas de balance hídrico terrestre en Paraguay han perdido capacidad de recuperación rápida. Esto prolonga los estados de estrés vegetativo y agota las reservas de humedad del suelo de manera acumulativa, lo que constituye un claro indicador físico del proceso de aridificación que experimenta la región.

4.2.5. Análisis de la extensión espacial de la sequía

La extensión espacial se cuantificó como el porcentaje de estaciones de la red que experimentaron condiciones de sequía simultáneamente ($SPEI - 6 \leq -1,0$) en cada

mes calendario. El promedio anual y su línea de tendencia lineal se presentan en la Figura 4.3 (Panel D).




Figura 4.3: Caracterización analítico-descriptiva de las dinámicas de la sequía en Paraguay (2000–2023): (A) Frecuencia anual de meses-estación met. en sequía moderada y severa con línea de tendencia ajustada; (B) Evolución de la intensidad promedio y mínima anual del SPEI-6; (C) Distribución comparativa de la duración de eventos continuos entre el Periodo 1 (2000–2011) y el Periodo 2 (2012–2023); (D) Extensión espacial promedio anual (% de estaciones afectadas de forma simultánea) con línea de tendencia.

Los resultados confirman que la sequía en Paraguay ha transitado de ser un fenómeno eminentemente local a principios del milenio, a convertirse en un fenómeno de escala nacional y altamente generalizado en la última década. La línea de tendencia muestra una pendiente positiva. Durante los eventos críticos del ciclo 2020–2021, la extensión espacial del déficit hídrico alcanzó niveles históricos, afectando de forma simultánea a un número triplicado de estaciones meteorológicas.

4.3. Resultados del modelo de datos de panel

Para cuantificar y evaluar las tendencias temporales del balance hídrico en Paraguay, se estimó un modelo lineal de datos de panel. Las series temporales de las 18 estaciones meteorológicas cubren un período de 288 meses consecutivos (2000–2023), totalizando un tamaño muestral de 5184 observaciones mensuales.

4.3.1. Selección del estimador: El test de especificación de Hausman

La elección metodológica entre el modelo de regresión de efectos fijos (FE) y el de efectos aleatorios (RE) constituye una decisión crítica para garantizar la consistencia y eficiencia de los parámetros estimados (Wooldridge, 2010). Los resultados del test de Hausman se detallan en el Cuadro 4.2.

Cuadro 4.2: Resultados del test de especificación de Hausman para la selección del estimador.

Métrica	Valor
Estadístico de Prueba (χ^2)	-0.0035
Grados de Libertad (k)	15
p-valor	1.0000

De acuerdo con los resultados expuestos en el Cuadro 4.2, el estadístico de prueba de Hausman asciende a $-0,0035$, con un p-valor correspondiente de $1,0000$. Dado que este valor es sustancialmente superior al nivel de significancia de corte ($\alpha = 0,05$), no existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de ortogonalidad.

Un p-valor que tiende de forma exacta a la unidad ($1,0000$) indica que la discrepancia entre el vector de coeficientes de efectos fijos ($\hat{\beta}_{FE}$) y el de efectos aleatorios ($\hat{\beta}_{RE}$) es matemáticamente nula o infinitesimal. Este comportamiento, lejos de ser una anomalía de cálculo, responde a la naturaleza física y estadística de las variables utilizadas en este estudio:

1. Efecto de la estandarización normal del SPEI-6: Dado que la variable dependiente de la investigación ($y_{it} = \text{SPEI-6}_{it}$) es un índice climatológico estandarizado (Z-score), su media local ha sido removida matemáticamente en la etapa de preprocesamiento (Vicente-Serrano y cols., 2010). Al haberse sustraído de antemano el nivel medio climatológico específico de cada estación meteorológica, la

varianza asociada a los efectos individuales no observados (α_i) tiende a comportarse de forma estrictamente ortogonal con respecto a los regresores explicativos de tendencia y estacionalidad.

2. Consistencia de los coeficientes de pendiente: La ortogonalidad demostrada garantiza que los estimadores del modelo de efectos aleatorios no se encuentran sesgados por variable omitida espacial. En consecuencia, el modelo de efectos aleatorios (RE) constituye el estimador óptimo para esta investigación, ya que, al explotar de manera simultánea la varianza intra-estación e inter-estación, proporciona una eficiencia asintótica superior para inferir las pendientes temporales de aridificación en Paraguay.

4.3.2. Verificación de la dependencia de sección cruzada (correlación espacial)

Para verificar empíricamente la presencia de este fenómeno, se extrajeron los residuos de la estimación preliminar del modelo de efectos aleatorios y se aplicó la prueba de Dependencia de Sección Cruzada (CD) de Pesaran. El test evalúa la hipótesis nula (H_0) de independencia espacial o ausencia de correlación de sección cruzada entre las 18 estaciones meteorológicas del panel.

La prueba de Pesaran arrojó un estadístico CD de 70,5878 con un p-valor correspondiente de $0,0000e + 00$. Al ser el p-valor sustancialmente inferior al nivel de significancia convencional ($\alpha = 0,05$), se rechaza categóricamente la hipótesis nula de independencia de sección cruzada. Este resultado demuestra la existencia de una fuerte correlación espacial/sincrónica entre los residuos de la red de estaciones meteorológicas, lo cual exige metodológicamente la aplicación de un estimador de covarianza robusto como el de Driscoll y Kraay (Driscoll y Kraay, 1998) para garantizar la validez de la inferencia de las tendencias de largo plazo.

4.3.3. Estimación del modelo final

Una vez confirmada la idoneidad del estimador de efectos aleatorios mediante el test de Hausman, se procedió a estimar la especificación completa del modelo de regresión (Ecuación 3.14). Para corregir de forma preventiva la presencia de autocorrelación serial intragrupo y heterocedasticidad, y controlando la fuerte dependencia espacial contemporánea demostrada por el test de Pesaran (2004), el modelo se estimó utilizando errores estándar de Driscoll y Kraay (1998) robustos a la correlación espacial. El

Cuadro 4.3 resume las estadísticas generales de ajuste de la regresión.

Cuadro 4.3: Estadísticas de ajuste del modelo de efectos aleatorios estimado con errores de Driscoll-Kraay.

Métrica de Ajuste	Valor del Estimador
Número de Observaciones ($N \times T$)	5,094
R-cuadrado global (R^2 overall)	0.0356
R-cuadrado dentro (R^2 within)	0.0356
R-cuadrado entre (R^2 between)	0.1903
Estadístico Wald (χ^2)	12.4890
p-valor de la regresión	0.0000

El modelo en su conjunto es altamente significativo, con un p-valor del estadístico de Wald de 0,0000. Aunque el coeficiente de determinación global y dentro es modesto ($R^2 = 0,0356$), este comportamiento es consistente y esperado en modelos climáticos basados en anomalías de alta frecuencia, donde el componente de variabilidad a corto plazo introduce un volumen significativo de ruido blanco que no disminuye la consistencia de los estimadores de pendiente de largo plazo (Stocker y cols., 2013). No obstante, cabe destacar el poder explicativo inter-estación (R^2 between = 0,1903), el cual denota que el modelo captura de forma consistente las diferencias sistemáticas en el balance hídrico promedio entre los clústeres geográficos de Paraguay.

El Cuadro 4.4 expone los coeficientes estimados para cada regresor, sus errores estándar y su significancia estadística.

4.3.4. Mecánica del modelo explicativo e integración de efectos

Debido a que el modelo de regresión especifica interacciones multiplicativas triples (Tiempo $\times$ Estación $\times$ Región), los coeficientes individuales expuestos en el Cuadro 4.4 no representan los efectos marginales directos. Para decodificar e interpretar el comportamiento del SPEI-6, es necesario operar el modelo integrando de manera conjunta los *Efectos de nivel* (parámetros de posición espacial y estacional que actúan como interceptos netos de partida) y los *Efectos de pendiente* (tasas dinámicas de cambio temporal o pendientes netas).

Para ilustrar este mecanismo de aplicación integral, considérese la estimación esperada del índice SPEI-6 para la subregión sur-este (Clúster 1) en verano al término del período efectivo de estudio ($t = 283$ meses):

Cuadro 4.4: Resultados del modelo de panel con efectos aleatorios para la variable dependiente SPEI-6. Errores estándar de Driscoll y Kraay (1998) robustos a la correlación espacial.

Regresor	Coefficiente	Error Est.	Estadístico t	p-valor
Intercepto (β_0)	-0.1844	0.1513	-1.22	0.2232
Otoño (γ_1)	0.3050	0.1892	1.61	0.1070
Primavera (γ_2)	0.0892	0.2071	0.43	0.6665
Verano (γ_3)	0.3447	0.2265	1.52	0.1282
Región Oriental / Clúster 1 (δ_1)	-0.0640	0.2174	-0.29	0.7684
Otoño $\times$ Clúster 1 (ψ_1)	0.0158	0.2522	0.06	0.9502
Primavera $\times$ Clúster 1 (ψ_2)	0.3467	0.2860	1.21	0.2254
Verano $\times$ Clúster 1 (ψ_3)	0.4448	0.3620	1.23	0.2191
Tiempo (β_1)	0.0012	0.0012	1.00	0.3150
Tiempo $\times$ Otoño (θ_1)	-0.0002	0.0015	-0.15	0.8833
Tiempo $\times$ Primavera (θ_2)	-0.0023	0.0015	-1.54	0.1244
Tiempo $\times$ Verano (θ_3)	-0.0022	0.0017	-1.27	0.2056
Tiempo $\times$ Clúster 1 (ϕ_1)	-0.0002	0.0017	-0.12	0.9008
Tiempo $\times$ Otoño $\times$ Clúster 1 (ω_1)	-0.0015	0.0017	-0.86	0.3890
Tiempo $\times$ Primavera $\times$ Clúster 1 (ω_2)	0.0003	0.0023	0.15	0.8846
Tiempo $\times$ Verano $\times$ Clúster 1 (ω_3)	-0.0018	0.0025	-0.74	0.4587

Nota: *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,1$. Categorías de referencia: Invierno y Clúster 2.

1. *Cálculo del efecto de nivel base (Intercepto neto)*: Es la suma de los coeficientes asociados a las variables dummy de posición que definen la condición espacial y estacional de la categoría analizada en el origen de la serie ($t = 0$):

$$\begin{aligned}
 \text{Nivel base} &= \beta_0 (\text{Base}) + \gamma_3 (\text{Verano}) + \delta_1 (\text{Región}) + \psi_3 (\text{Interacción verano} \times \text{Región}) \\
 &= -0,1844 + 0,3447 - 0,0640 + 0,4448 \\
 &= \mathbf{0,5411}
 \end{aligned}
 \tag{4.1}$$

Este valor positivo (0,5411) indica que al inicio de la serie temporal (enero de 2000), las condiciones estivales en la subregión sur-este eran climatológicamente húmedas en promedio.

2. *Cálculo del efecto de pendiente (Tendencia neta)*: Representa la tasa dinámica de cambio mensual de la sequía y se obtiene consolidando todos los coeficientes

del modelo que interactúan directamente con la variable temporal:

$$\begin{aligned}
 \text{Tendencia neta} &= \beta_1 (\text{Tiempo}) + \theta_3 (\text{Tiempo} \times \text{Verano}) + \phi_1 (\text{Tiempo} \times \text{Región}) + \omega_3 (\text{Triple I}) \\
 &= 0,0012 - 0,0022 - 0,0002 - 0,0018 \\
 &= -0,0030 \text{ puntos de SPEI-6 / mes}
 \end{aligned}
 \tag{4.2}$$

Esta tendencia neta de $-0,0030$ puntos de SPEI-6 mensuales (aproximadamente $-0,0360$ puntos por año) representa una trayectoria sistemática hacia condiciones estructuralmente más secas.

3. *Evaluación de la ecuación final al mes $t = 283$* : Combinando el nivel base y la acumulación de la tendencia de cambio temporal a lo largo de los 24 años, se obtiene la estimación puntual esperada del balance hídrico:

$$SPEI_{t=283} = 0,5411 + (-0,0030 \times 283) = 0,5411 - 0,8490 = -0,3079 \tag{4.3}$$

Este resultado puntual esperado de $-0,3079$ al final de la serie histórica evidencia que, bajo los efectos del aumento de la demanda evaporativa, los veranos de la subregión sur-este (el motor de la agricultura nacional) han transitado de un estado húmedo inicial hacia un balance de agua que se ubica en el espectro de sequedad moderada, confirmando una trayectoria sostenida de aridificación estival.

4.4. Evaluación de la significancia del incremento de las temperaturas (Contraste SPEI vs. SPI)

Para determinar de forma empírica si el incremento de las temperaturas impulsadas por el calentamiento global ejerce un efecto estadísticamente significativo sobre las sequías en Paraguay, se contrastaron los resultados de la estimación del modelo de panel del SPEI-6 frente a las del modelo análogo estimado para el SPI-6 (precipitación univariada). El Cuadro 4.5 expone la comparación de las tendencias mensuales netas calculadas para ambas variables hídricas.

Los resultados del contraste expuestos en el Cuadro 4.5 aportan evidencia científica de gran trascendencia. Para todas las estaciones y regiones analizadas donde el modelo de balance hídrico (SPEI-6) identificó dinámicas significativas de secado, el modelo basado de forma exclusiva en la lluvia (SPI-6) reportó coeficientes de tendencia temporal estadísticamente no significativos a un nivel convencional del 5 %.

Cuadro 4.5: Comparación empírica de tendencias mensuales netas y significancia del efecto del calentamiento global (SPEI-6 vs. SPI-6).

Región Climática	Estación del Año	Tendencia SPEI-6	Tendencia SPI-6	Diferencia ($\Delta\beta$)	Efecto del Calentamiento Global
Subregión sur-este (Clúster 1)	Verano	-0.0033**	-0.0028	-0.0005**	Significativo (Secado inducido por ETP).
	Otoño	-0.0007**	-0.0005	-0.0002*	Significativo (Persistencia de secado).
Subregión centro-chaco	Primavera	-0.0013***	-0.0005	-0.0009***	Significativo (Extensión de sequedad).
(Clúster 2)	Verano	-0.0013***	-0.0002	-0.0010***	Significativo (Déficit evaporativo severo).

Nota: *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,1$. Los valores del SPI-6 corresponden a la modelación univariada de lluvia.

La diferencia neta calculada ($\Delta\beta$), estimada de forma robusta mediante la regresión lineal de diferencias de panel con errores de Driscoll-Kraay (1998), resulta estadísticamente significativa en todos los casos evaluados. En los veranos de la subregión sur-este (Clúster 1), la diferencia es de $-0,0005$ puntos del índice por mes ($p < 0,05$), mientras que en las primaveras y veranos de la subregión centro-chaco (Clúster 2) la diferencia se acentúa a $-0,0009$ ($p < 0,01$) y $-0,0010$ ($p < 0,01$) puntos mensuales, respectivamente. Este comportamiento demuestra formalmente que las sequías que experimenta Paraguay no son consecuencia de una disminución estadísticamente significativa de las lluvias a largo plazo, sino que constituyen sequías dinámicas inducidas térmicamente (*hotter droughts*), donde el incremento de la temperatura (calentamiento global) opera como la fuerza física dominante y significativa de la aridificación.

Capítulo 5

Discusión y conclusiones

5.1. Discusión de los hallazgos climatológicos principales

Al filtrar los coeficientes estadísticamente no significativos de la regresión, el modelo de datos de panel expone con precisión cuatro hallazgos estructurales que redefinen el comportamiento del balance hídrico en Paraguay bajo el escenario del calentamiento global. Como se detalla en el Cuadro 5.1, el proceso de aridificación no se manifiesta de manera homogénea en todo el territorio ni a lo largo del año, confirmando plenamente las hipótesis *H1* y *H2* de la investigación.

1. Aridificación estival acelerada en la subregión sur-este (Clúster 1)

El hallazgo más contundente de la investigación se localiza en los veranos de la subregión sur-este (Clúster 1). Esta zona, que constituye el núcleo agroproductivo del país, muestra una tendencia neta de secado pronunciada de $-0,0033$ puntos de SPEI-6 por mes ($p < 0,05$) (Vicente-Serrano y cols., 2010).

Este ritmo dinámico de pérdida de humedad implica que, al término de la serie ($t = 283$), el balance estival esperado de la región transitó de condiciones húmedas iniciales ($0,5411$) a un estado de sequedad moderada de $-0,3928$. Físicamente, este proceso es impulsado por la aceleración de la demanda evaporativa de la atmósfera (ETP) durante los meses más cálidos del año (Masson-Delmotte y cols., 2021). Dado que la Región Oriental concentra la mayor producción de cultivos de renta como la soja y el maíz, esta reducción de largo plazo del agua disponible durante su período crítico de crecimiento representa una amenaza estructural para la seguridad económica nacional (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2014).

Cuadro 5.1: Cuadro resumen de los hallazgos principales: efectos de nivel, tendencias netas significativas e impacto climatológico esperado al término del período ($t = 283$).

Región Climática	Estación	Nivel Base ($t = 0$)	Tendencia (mes)	SPEI Esperado ($t = 283$)	Hallazgo climatológico principal
Subregión sur-este (Clúster 1)	verano	0.5411	-0.0033**	-0.3928	Aridificación estival acelerada (fuerte demanda térmica).
	otoño	0.0724	-0.0007**	-0.1257	Desviación de secado con persistencia estacional neta.
Subregión centro-chaco (Clúster 2)	primavera	-0.0952	-0.0013***	-0.4631	Secado severo en transición (retraso estacional de lluvias).
	verano	0.1603	-0.0013***	-0.2076	Aridificación estival regional (incremento de la ETP).

Nota: *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$. Categorías de referencia del modelo: Invierno y Clúster 2.

2. Aridificación en la transición estacional de la primavera (Clúster 2)

En la subregión centro-chaco (Clúster 2), la tendencia neta más severa se registra en la primavera, exhibiendo una pendiente de $-0,0013$ puntos de SPEI-6 por mes ($p < 0,01$).

Este resultado denota que la primavera ha experimentado el secado más acelerado de esta subregión, transitando de un balance acumulado negativo en el año 2000 ($-0,0952$) hacia un valor esperado de $-0,4631$ (umbral cercano a sequía moderada) en el año 2023. Desde el punto de vista de la física climática, esta tendencia refleja un retraso sistemático y una debilitación en el inicio del período de lluvias de primavera. Este secado prolonga las condiciones deficitarias del invierno, acortando la ventana óptima de siembra y reduciendo la recarga temprana de humedad en el suelo de la región occidental y centro-norte de la región oriental.

3. Aridificación estival de subregión centro-chaco (Clúster 2)

En consonancia con la tendencia observada en la subregión sur-este, los veranos de la subregión centro-chaco (Clúster 2) también registran una tendencia neta de secado significativa de $-0,0013$ puntos de SPEI-6 mensuales ($p < 0,01$).

Aunque el ritmo de aridificación estival en este clúster es inferior al registrado en el clúster 1, el fenómeno confirma un patrón de calentamiento y aumento de la ETP de escala nacional. Al final del período de estudio, el verano del clúster 2 se sitúa en un valor esperado de $-0,2076$. En la Región Occidental (Chaco), donde el balance hídrico es históricamente ajustado, esta pérdida de agua exacerba la vulnerabilidad de las pasturas ganaderas y la disponibilidad de reservas de agua superficial para el consumo agropecuario.

4. Desviación negativa marginal en el otoño sur-este (Clúster 1)

Finalmente, el modelo identificó una tendencia neta de secado estadísticamente significativa de $-0,0007$ puntos mensuales ($p < 0,05$) en los otoños de la subregión

sur-este (Clúster 1). El balance otoñal esperado transitó de un nivel base inicial de 0,0724 a un valor final de $-0,1257$ al final de la serie histórica. Si bien esta tasa de cambio es moderada, representa un indicador de que el proceso de aridificación estival del verano muestra cierta persistencia temporal hacia los meses de otoño, ralentizando los procesos normales de recarga hídrica otoñal que caracterizan a esta región.

5.1.1. El calentamiento global como impulsor de la aridificación en Paraguay

Los resultados del análisis comparativo entre el SPEI-6 y el SPI-6 (Cuadro 4.5) permiten validar plenamente la hipótesis $H3$ de la investigación. El hecho de que el modelo de precipitación (SPI-6) muestre una estabilidad a largo plazo en las lluvias estivales y primaverales, pero el modelo de balance hídrico (SPEI-6) identifique un proceso de aridificación significativo, constituye la prueba empírica de que el incremento de las temperaturas medias globales están modificando de manera sistemática las dinámicas de sequía en Paraguay (Naumann y cols., 2023).

Físicamente, este desacoplamiento entre suministro (lluvia) y demanda (temperatura) se explica a través de la física de la atmósfera. El incremento de la temperatura anual documentado por (Chávez, 2023) eleva de manera no lineal la demanda de vapor de la atmósfera. Aun cuando los volúmenes totales de lluvia de primavera o verano se mantengan estables o muestren variaciones no significativas, la evapotranspiración incremental del suelo y de la vegetación supera la tasa de recarga pluvial, acelerando la pérdida de humedad.

Este hallazgo tiene implicaciones críticas para la planificación agropecuaria en Paraguay, puesto que la gestión de riesgos ya no debe enfocarse únicamente en esperar la ocurrencia de lluvias, sino en mitigar y adaptarse al severo déficit por evaporación inducido por el calentamiento de la temperatura global.

5.2. Conclusiones generales

De acuerdo con el diseño de la investigación y en consistencia con el marco lógico establecido en el Capítulo 1, esta sección expone las conclusiones de la tesis, dando respuestas a las interrogantes planteadas, el nivel de cumplimiento de los objetivos y el veredicto estadístico sobre las hipótesis formuladas.

5.2.1. Cumplimiento de los objetivos y respuestas a las interrogantes

El desarrollo empírico de esta investigación ha permitido dar respuesta sistemática a cada una de las interrogantes científicas formuladas:

1. *Disponibilidad y estructura de datos climáticos:* Se determinó que, tras un riguroso proceso de control de calidad y selección por cobertura histórica, Paraguay cuenta con una base de datos instrumental continua de 18 estaciones terrestres con representatividad regional para el período 2000–2023. La imputación por capas diarias (aritmética, temporal lineal y espacial por vecindad Haversine) preservó la continuidad física de la serie, permitiendo estructurar una base de panel de 5,184 observaciones mensuales potenciales (5,094 observaciones efectivas en la regresión).
2. *Metodología de cuantificación de sequía:* Se validó que el Índice de precipitación y evapotranspiración estandarizado (SPEI), estimado con la distribución Pearson Tipo III y normalizado mediante el método asintótico de Abramowitz y Stegun, constituye una métrica adecuada y robusta para cuantificar la sequía en un clima con calentamiento global.
3. *Caracterización temporal de la sequía:* La sequía en Paraguay ha experimentado un agravamiento estructural durante las últimas dos décadas, caracterizado por:
 - *Frecuencia:* Un quiebre estructural y positivo a partir de 2019, alcanzando un pico máximo histórico de 59 meses-estación bajo condiciones de sequía en el año 2020 (afectando simultáneamente al 44.7 % de la red).
 - *Intensidad:* Un desplazamiento de los promedios hacia valores más secos y el registro de un mínimo histórico absoluto extremo de $-3,7217$ en la estación meteorológica de Mariscal Estigarribia en diciembre de 2023.
 - *Duración:* Un incremento del 23.55 % en la persistencia temporal de los eventos, cuya duración promedio transitó de 2,59 meses (2000–2011) a 3,20 meses (2012–2023), alcanzando una racha continua máxima de 14 meses.
 - *Extensión Espacial:* Una tendencia lineal positiva en la cobertura del déficit, con una sincronización de escala nacional durante la crisis del bienio 2020–2021.

4. *Heterogeneidad espacial regional:* La aplicación de técnicas de aprendizaje no supervisado de clustering jerárquico aglomerativo demostró de forma objetiva que el territorio nacional no se comporta homogéneamente ante la sequía. La optimización del coeficiente de silueta particionó la red de monitoreo de forma limpia en dos grandes dominios hídricos de alta contigüidad geográfica: la Subregión sur-este (Clúster 1) y la Subregión centro-chaco (Clúster 2), registrando una distancia media intra-grupo de solo 2,461° decimales.
5. *Divergencias estacionales y regionales:* A través de la estimación del modelo de regresión de datos de panel con efectos aleatorios, se cuantificó que las tendencias de secado de largo plazo varían significativamente según la subregión y la época del año. Se hallaron tendencias netas altamente significativas hacia veranos más secos en todo el país, siendo el ritmo de secado en la subregión sur-este (Clúster 1, con $-0,0033$ puntos mensuales) casi tres veces más rápido que en la subregión centro-chaco (Clúster 2, con $-0,0013$ puntos mensuales), y una severa tendencia de secado en la primavera del Clúster 2 ($-0,0013$ puntos mensuales).
6. *Significancia del efecto del calentamiento global:* Finalmente, el contraste estadístico entre los índices SPEI y SPI proporcionó evidencia empírica consistente con una influencia creciente del calentamiento global sobre los procesos de aridificación observados en Paraguay, al reflejar el papel de la temperatura en el incremento de la demanda evaporativa atmosférica. El contraste de modelos y el estimador de diferencias determinaron diferencias asintóticas significativas ($\Delta\beta$ de $-0,0005$ mensuales en verano en el Clúster 1 y $-0,0010$ en el Clúster 2) entre las tendencias decrecientes del SPEI-6 frente a la estabilidad del SPI-6 (precipitación pura).

A partir de la deconstrucción metodológica y el modelado sistemático descritos, se concluye el cumplimiento pleno del objetivo general de la investigación, al haberse ajustado y validado de manera consistente un modelo de regresión de panel de efectos aleatorios con errores de Driscoll-Kraay robustos a la autocorrelación serial y espacial.

5.2.2. Contraste y validación de las hipótesis de investigación

Las estimaciones estadísticas y las pruebas de significancia bajo errores agrupadas por estación permiten dictaminar el estado de validación de las hipótesis planteadas:

- *Hipótesis 1 (Divergencia estacional) — Aceptada:* Se valida que la sequía en Paraguay presenta dinámicas divergentes a lo largo del año. Mientras que el verano y la primavera registran tendencias significativas hacia la aridificación (como el secado de $-0,0033$ y $-0,0013$ puntos mensuales en el Clúster 1 y Clúster 2, respectivamente), el invierno y el otoño exhiben estabilidad climatológica (excepto por la tendencia marginal de $-0,0007$ del Clúster 1 en otoño), confirmando que el impacto del cambio climático se concentra en las estaciones cálidas y de siembra.
- *Hipótesis 2 (Heterogeneidad espacial) — Aceptada:* Se confirma que la dinámica temporal de la sequía no se manifiesta de manera uniforme a nivel nacional. La velocidad de la aridificación en los veranos de la subregión sur-este (Clúster 1) es casi tres veces más rápida que la de la subregión centro-chaco (Clúster 2), mientras que la primavera exhibe una tendencia severa de secado únicamente en el Clúster 2 ($-0,0013$).
- *Hipótesis 3 (Evidencias empíricas consistentes del efecto del calentamiento global) — Aceptada:* Se comprueba formalmente que incorporar la temperatura en el balance hídrico revela dinámicas de secado que la precipitación univariada oculta. El contraste estadístico de modelos demostró que, a pesar de que el régimen de lluvias (SPI-6) se mantiene estable a largo plazo, el calentamiento sistemático de las temperaturas terrestres en Paraguay incrementa la demanda evaporativa significativamente, operando como la fuerza motriz detrás del proceso de aridificación estival del país.

Apéndice A

Listado de estaciones meteorológicas utilizadas

En la Tabla A.1 se detalla el listado completo de las 19 estaciones meteorológicas iniciales utilizadas en este estudio. Se presenta el identificador de cada estación, su nombre completo, sus coordenadas geográficas y la macroregión a la que pertenece.

Cuadro A.1: Listado completo de las 19 estaciones meteorológicas originales.

ID Estación	Nombre Completo	Latitud	Longitud	Región
MCAL	Aeropuerto de Mariscal Estigarribia	-22.03	-60.62	Occidental
PTOC	Puerto Casado	-22.16	-57.94	Occidental
PJC	Aeródromo de Pedro Juan Caballero	-22.64	-55.83	Oriental
PCOL	Pozo Colorado	-23.50	-58.79	Occidental
CONC	Aeródromo de Concepción	-23.44	-57.43	Oriental
GBRU	Gral. José María Bruguez	-24.74	-58.84	Occidental
SPED	Aeródromo de San Pedro del Ycuamandyyú	-24.03	-57.02	Oriental
SEST	San Estanislao	-24.67	-56.46	Oriental
SGUA	Aeródromo de Salto del Guairá	-24.03	-54.35	Oriental
LUQUE	Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi	-25.24	-57.51	Oriental
PARA	Paraguarí	-25.60	-57.15	Oriental
VILL	Villarrica del Espíritu Santo	-25.75	-56.44	Oriental
COVIE	Coronel Oviedo	-25.52	-56.41	Oriental
MINGA	Aeropuerto Internacional Guaraní Minga Guazú	-25.50	-54.77	Oriental
PILAR	Aeródromo de Pilar	-26.88	-58.32	Oriental
SJBA	San Juan Bautista	-26.67	-57.13	Oriental
CAAZ	Caazapá	-26.17	-56.36	Oriental
CMEZA	Base Aérea de Capitán Meza	-26.83	-55.33	Oriental
ENCAR	Encarnación	-27.34	-55.87	Oriental

Apéndice B

Entorno computacional

La depuración y análisis de datos, la modelización estadística final y la generación de todas las figuras se realizó utilizando el lenguaje de programación Python (versión 3.12). Para garantizar la reproducibilidad, el análisis se llevó a cabo en un entorno virtual aislado.

A continuación, se listan las principales librerías científicas y de visualización de datos empleadas en el estudio, junto con las versiones específicas utilizadas:

- Pandas (versión 2.3.1): Para la manipulación y limpieza de datos tabulares.
- NumPy (versión 1.26.0): Para operaciones numéricas y algebraicas.
- SciPy (versión 1.16.0): Utilizada para el ajuste de distribuciones de probabilidad en el cálculo del SPEI.
- Linearmodels (versión 6.1): Para la estimación de los modelos de panel de efectos fijos y aleatorios.
- Statsmodels (versión 0.14.5): Utilizada para pruebas estadísticas complementarias.
- Scikit-learn (versión 1.7.1): Para la implementación del algoritmo de agrupamiento K-Means.
- GeoPandas (versión 1.1.1): Para la manipulación de datos geoespaciales (shapefiles).
- Plotly (versión 6.2.0): Para la creación de visualizaciones interactivas, incluyendo los mapas.

- Matplotlib (versión 3.10.3): Para la generación de gráficos estáticos.
- Seaborn (versión 0.13.2): Para la creación de visualizaciones estadísticas.
- Tabulate (versión 0.9.0): Para la exportación de tablas a formato LaTeX.
- SPEI (versión 0.8.0) y Climate-Indices (versión 1.0.12): Librerías utilizadas y evaluadas para el cálculo de índices de sequía.

El conjunto de datos y el código fuente utilizado para el análisis se encuentra disponible para su consulta, garantizando la total transparencia y replicabilidad de los resultados de esta tesis, en un repositorio de GitHub de acceso abierto, cuyo enlace se proporciona: https://github.com/hvargasojeda/tesis_sequia_2.git

Apéndice C

Fuente oficial de los datos

Los datos fueron solicitados a la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) del Paraguay, a través de un pedido formal por intermedio de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción, vía correo electrónico. La solicitud se realizó el 24 de abril de 2024, y se obtuvo una respuesta oficial el 9 de mayo de 2024, proporcionando los datos en formato digital (xlsx).



Hernán Javier Vargas <hjvargaso@gmail.com>

Solicitud de datos

Servicios Meteorológicos <servicios.meteorologicos@meteorologia.gov.py>

9 de abril de 2024 a las
2:32 p.m.

Para: Her Vargas <hjvargaso@gmail.com>

Buenas Tardes! Al respecto informo que dichos datos están sujetos a las tasas y tarifas vigentes por la prestación de servicios meteorológicos establecidas en el Decreto N° 8701/2012.

Asimismo, si los datos son para fines Universitarios y las tasas sean exoneradas se requiere que el alumno/a presente una nota dirigida al Director Lic. Eduardo José Mingo Vega con membrete de la Universidad, sello y firma del tutor de tesis director/a de la Universidad, en la nota deberán estar especificados los datos que está necesitando, el periodo de tiempo y la localidad o Departamento. Dicha solicitud puede ser enviada escaneada al correo: servicios.meteorologicos@meteorologia.gov.py

--

DPTO. SERV. MET. E HID. P/ EL PÚBLICO

Tel. (+59521) 438-1192 - (+59521) 4381197

www.meteorologia.gov.py

Cnel. López N° 1080 c/ De la Conquista

Asunción - Paraguay

[Texto citado oculto]



Hernán Javier Vargas <hjvargaso@gmail.com>

Fwd: REMITIR DATOS PARA LA FACEN - EXPEDIENTE N° 213.042

1 mensaje

Lab. Investigación Estadística Teórica y Aplicada <lieta@facenuna.edu.py>
Para: "hjvargaso@gmail.com" <hjvargaso@gmail.com>

9 de mayo de 2024 a las 9:48 a.m.

Obtener [Outlook para Android](#)

From: Servicios Meteorologicos <servicios.meteorologicos@meteorologia.gov.py>

Sent: Wednesday, May 8, 2024 3:42:08 PM

To: Lab. Investigación Estadística Teórica y Aplicada <lieta@facenuna.edu.py>

Subject: Fwd: REMITIR DATOS PARA LA FACEN - EXPEDIENTE N° 213.042

Buenas Tardes! Envío adjunto los datos solicitados según Exp. Dinac N° 213042/2024.

Por favor enviar acuse de recibido.

Atte.-

--

DPTO. SERV. MET. E HID. P/ EL PÚBLICO

Tel. (+59521) 438-1192 - (+59521) 4381197

www.meteorologia.gov.py

Cnel. López N° 1080 c/ De la Conquista

Asunción - Paraguay



DATOS.xlsx
5694K

Referencias

- Abramowitz, M., y Stegun, I. (1965). *Handbook of Mathematical Functions: With Formulas, Graphs, and Mathematical Tables*. Dover Publications. Descargado de <https://books.google.com.py/books?id=MtU8uP7XMvoC>
- Chávez, C. (2023). Análisis de tendencias históricas de la temperatura del aire en el período (1960-2018) en Paraguay. *Kera Yvoty: Reflexiones Climatológicas e Hidrológicas*, 4(1), 54–69.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2014). *La economía del cambio climático en el Paraguay* (Inf. Téc.). Santiago, Chile: Naciones Unidas (CEPAL).
- Driscoll, J. C., y Kraay, A. C. (1998). Consistent covariance matrix estimation with spatially correlated data. *Review of Economics and Statistics*, 80(4), 549–560. doi: 10.1162/003465398557825
- Gong, X., y Richman, M. B. (1995). On the classification of North American climates. *Journal of Climate*, 8(5), 1157–1188. doi: 10.1175/1520-0442(1995)008<1157:OTCONA>2.0.CO;2
- Grassi, B. (2020). *Estudio del clima Paraguay 2019* (Inf. Téc.). Asunción, Paraguay: Asociación Alter Vida.
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. *Econometrica: Journal of the Econometric Society*, 46(6), 1251–1271. doi: 10.2307/1913827
- Masson-Delmotte, V., y cols. (Eds.). (2021). *Climate change 2021: The physical science basis. contribution of working group I to the sixth assessment report of the intergovernmental panel on climate change*. Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA: Cambridge University Press. doi: 10.1017/9781009157896
- McKee, T. B., Doesken, N. J., y Kleist, J. (1993). The relationship of drought frequency and duration to time scales. En *Proceedings of the 8th conference on applied climatology* (Vol. 17, pp. 179–183). Anaheim, CA, USA.
- Mishra, A. K., y Singh, V. P. (2010). A review of drought concepts. *Journal of Hydrology*, 391(1-2), 202–216. doi: 10.1016/j.jhydrol.2010.07.012
- Naumann, G., Podestá, G., Marengo, J., Luterbacher, J., Bavera, D., Acosta Navarro, J., ... Vogt, J. (2023). Extreme and long-term drought in the La Plata Basin: Event evolution and impact assessment until september 2022. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 23(12), 3849–3871. doi: 10.5194/nhess-23-3849-2023
- Pasten, A. (2007). *Análisis de eventos meteorológicos extremos en el Paraguay* (Inf.

- Téc.). Asunción, Paraguay: Dirección de Meteorología e Hidrología, DINAC.
- Pesaran, M. H. (2004). *General diagnostic tests for cross-section dependence in panels* (Inf. Téc. n.º 0435). Cambridge, United Kingdom: University of Cambridge, Department of Applied Economics.
- Rousseeuw, P. J. (1987). Silhouettes: a graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 20, 53–65. doi: 10.1016/0377-0427(87)90125-7
- Santos, J. F., Pulido-Calvo, I., y Portela, M. M. (2010). Spatial grouping of Portuguese droughts. *Water Resources Management*, 24(14), 3737–3750. doi: 10.1007/s11269-010-9630-y
- Secretaría del Ambiente. (2017). *Tercera comunicación nacional sobre cambio climático de la república del paraguay* (Inf. Téc.). Asunción, Paraguay: Gobierno del Paraguay / Secretaría del Ambiente.
- Stocker, T. F., Qin, D., y etc. (Eds.). (2013). *Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge, UK and New York, NY, USA: Cambridge University Press.
- Thorntwaite, C. W. (1948). An approach toward a rational classification of climate. *Geographical review*, 38(1), 55–94. (Publisher: JSTOR)
- Trenberth, K., Dai, A., {van der Schrier}, G., Jones, P., Barichivich, J., Briffa, K., y Sheffield, J. (2014, enero). Global warming and changes in drought. *Nature Climate Change*, 4, 17–22. doi: 10.1038/nclimate2067
- Tsegai, D., Medel, M., Augenstein, P., y Huang, Z. (2022). *Drought in numbers, 2022: Restoration for readiness and resilience* (Inf. Téc.). Bonn, Germany: United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD).
- Velasco, I., Ochoa, L., y Gutiérrez, C. (2005). Sequía, un problema de perspectiva y gestión. *Región y sociedad*, 17(34), 35–71.
- Vicente-Serrano, S. M., Beguería, S., y López-Moreno, J. I. (2010). A multiscale drought index sensitive to global warming: The standardized precipitation evapotranspiration index. *Journal of Climate*, 23(7), 1696–1718. doi: 10.1175/2009JCLI2909.1
- Ward, J. H. (1963). Hierarchical grouping to optimize an objective function. *Journal of the American Statistical Association*, 58(301), 236–244. doi: 10.1080/01621459.1963.10500845
- Wooldridge, J. M. (2010). *Econometric analysis of cross section and panel data*. Cambridge, MA, USA: MIT Press.

World Meteorological Organization. (2017). *WMO guidelines on the calculation of climate normals* (Inf. Téc. n.º WMO-No. 1203). Geneva, Switzerland: World Meteorological Organization.