

1 留数

1.1 留数定理

设 f 在 a 的去心邻域内解析，在 a 点不解析，则我们有洛朗展开

$$f(z) = \sum a_n(z-a)^n.$$

从而当 $\rho > 0$ 充分小的时候

$$\int_{|z-a|=\rho} f(z)dz = 2\pi i a_{-1}.$$

我们发现在计算积分的时候 a_{-1} 起了决定性的作用。称 a_{-1} 为 f 在孤立奇点 a 点的留数，记作

$$\text{Res}[f(z), a].$$

于是由柯西积分定理，任意将 a 围起来的简单闭曲线 C ，有

$$\int_C f(z)dz = 2\pi i \text{Res}[f(z), a].$$

进一步我们有以下定理。

定理1 (留数定理). 如果函数 $f(z)$ 在闭路 C 上解析，在 C 内部除了有限个孤立奇点 a_1, \dots, a_n 外也解析，则

$$\int_C f(z)dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}[f(z), a_k].$$

证明是显然的，我么在此略过。有了该定理，我们经常会把求积分转化为求留数。可去奇点的留数为0；本性奇点的留数一般用洛朗展开；极点的留数除了用洛朗展开求还有以下办法：

定理2. 如果 a 是 $f(z)$ 的 m -阶极点，则

$$\text{Res}[f(z), a] = \lim_{z \rightarrow a} \frac{1}{(m-1)!} ((z-a)^m f(z))^{(m-1)}.$$

特别地，当 $m=1$ 地时候， $\text{Res}[f(z), a] = \lim_{z \rightarrow a} (z-a)f(z)$.

证明. 设洛朗展开为

$$f(z) = \sum_{k \geq -m} a_k(z-a)^k.$$

则

$$\frac{1}{(m-1)!} ((z-a)^m f(z))^{(m-1)}|_{z=a} = a_{-1}.$$

推论1. 设 $P(z), Q(z)$ 在 a 点解析， $P(a) \neq 0$ ， a 为 Q 的一级零点。则

$$\text{Res}\left[\frac{P}{Q}, a\right] = \frac{P(a)}{Q'(a)}.$$

证明.

$$\operatorname{Res}\left[\frac{P}{Q}, a\right] = \lim_{z \rightarrow a} (z - a) \frac{P(z)}{Q(z)} = \lim_{z \rightarrow a} \frac{P(z)}{\frac{Q(z) - Q(a)}{z - a}} = \frac{P(a)}{Q'(a)}.$$

例子1. 求留数: $f(z) = \frac{\sin 2z}{(z+1)^3} + \frac{e^z}{z-1}$.

解. f 有两个奇点, $z = 1$ (1阶极点) 以及 $z = -1$ (3阶极点)。

$$\operatorname{Res}[f(z), 1] = \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1)f(z) = e^1.$$

$$\operatorname{Res}[f(z), -1] = \lim_{z \rightarrow -1} \frac{1}{2!} ((z + 1)^3 f(z))^{(2)} = 2 \sin 2.$$

例子2. 求积分

$$\int_{|z|=n} \tan(\pi z) dz.$$

解. $\tan(\pi z) = \frac{\sin \pi z}{\cos \pi z}$. 其所有奇点为

$$z = k + \frac{1}{2}, k \in \mathbb{Z}.$$

且均为一阶极点, 所以

$$\operatorname{Res}[\tan(\pi z), k + \frac{1}{2}] = \frac{\sin((k + \frac{1}{2})\pi)}{-\pi \sin((k + \frac{1}{2})\pi)} = -\frac{1}{\pi}.$$

所以

$$\int_{|z|=n} \tan(\pi z) dz = -\frac{4n\pi i}{\pi} = -4ni.$$

例子3. $\int_{|z|=3} \frac{z+5}{1-\cos(z-2)} dz$.

解. 首先我们求出所有的奇点。即解方程

$$1 - \cos(z - 2) = 0.$$

解得

$$z_k = 2k\pi + 2, k \in \mathbb{Z}.$$

在 $|z| < 3$ 内有且只有一个孤立奇点为

$$z_0 = 2.$$

计算留数: 在 $z = 2$ 点的留数, 将 $1 - \cos(z - 2)$ 在 $z = 2$ 泰勒展开

$$1 - \cos(z - 2) = (z - 2)^2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k + 2)!} (z - 2)^{2k} = (z - 2)^2 \varphi(z).$$

$z = 2$ 为 2 阶极点。所以

$$\operatorname{Res}\left[\frac{z+5}{1-\cos(z-2)}, 2\right] = \lim_{z \rightarrow 2} \left(\frac{z+5}{1-\cos(z-2)} (z-2)^2 \right)' = \lim_{z \rightarrow 2} \left(\frac{z+5}{\varphi(z)} \right)' = \frac{\varphi - (z+5)\varphi'}{\varphi^2} \Big|_{z=2} = 2.$$

所以

$$\int_{|z|=3} \frac{z+5}{1-\cos(z-2)} dz = 2\pi i \operatorname{Res}\left[\frac{z+5}{1-\cos(z-2)}, 2\right] = 4\pi i.$$

当然我们可以用更直接的办法求留数：在 $z=2$ 的洛朗展开为

$$\frac{z+5}{1-\cos(z-2)} = \frac{z+5}{\frac{1}{2}(z-2)^2 - (z-2)^4\phi} = \frac{2}{(z-2)^2}((z-2)+7)(1+(z-2)^2\phi+\cdots).$$

显然 $a_{-1}=2$ 即 $\text{Res}[\frac{z+5}{1-\cos(z-2)}, 2] = 2$ 。

例子4. 求积分

$$I = \int_{|z|=1} \frac{z \sin z}{(1-e^z)^3} dz.$$

解. 首先把所有奇点都找出来

$$z_k = 2k\pi i, k \in \mathbb{Z}.$$

除了 $z_0=0$ 为一阶极点外其余都是三阶极点。但求积分只要考虑零就行了。

$$\text{Res}[\frac{z \sin z}{(1-e^z)^3}, 0] = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z^2 \sin z}{(1-e^z)^3} = -1.$$

故积分为 $-2\pi i$ 。

1.2 定积分的计算

1.2.1 $I = \int_0^{2\pi} R(\sin \theta, \cos \theta) d\theta$ 类型积分

这里 $R(a, b)$ 是关于 a, b 的有理函数。变换

$$z = e^{i\theta}, \theta \in [0, 2\pi].$$

则有

$$d\theta = \frac{dz}{iz}, \cos \theta = \frac{1}{2}(z + \frac{1}{z}), \sin \theta = \frac{1}{2i}(z - \frac{1}{z}).$$

可以把积分变为

$$I = \int_{|z|=1} R\left(\frac{1}{2i}(z - \frac{1}{z}), \frac{1}{2}(z + \frac{1}{z})\right) \cdot \frac{1}{iz} dz.$$

例子5. 求积分 $I = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{1-2p \cos \theta + p^2}, (0 < p < 1)$ 。

解. 变换

$$z = e^{i\theta}, \theta \in [0, 2\pi].$$

得到

$$I = \int_{|z|=1} \frac{1}{1+p^2-p(z+z^{-1})} \cdot \frac{1}{iz} dz = \int_{|z|=1} \frac{idz}{pz^2+p-z(1+p^2)}.$$

注意到

$$pz^2+p-z(1+p^2) = (pz-1)(z-p).$$

因而有两个奇点 $z=p$ (1阶极点), $z=\frac{1}{p}$ (1阶极点)。只有 $z=p$ 在 $|z|<1$ 内, 所以

$$\text{Res}[\frac{idz}{pz^2+p-z(1+p^2)}, p] = \lim_{z \rightarrow p} \frac{idz}{pz^2+p-z(1+p^2)}(z-p) = \frac{i}{p^2-1}.$$

所以

$$I = 2\pi i \text{Res}[\frac{idz}{pz^2+p-z(1+p^2)}, p] = \frac{2\pi}{1-p^2}.$$

例子6. 求积分

$$I = \int_0^{\pi} \frac{\cos mx}{5 - 4 \cos x} dx.$$

解. 注意到

$$\int_0^{\pi} \frac{\cos mx}{5 - 4 \cos x} dx = \int_{-\pi}^0 \frac{\cos mx}{5 - 4 \cos x} dx.$$

所以

$$I = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos mx}{5 - 4 \cos x} dx.$$

把另一半补上

$$J = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin mx}{5 - 4 \cos x} dx.$$

则

$$I + iJ = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{z^m}{5 - 4 \cos x} dx = \frac{1}{2i} \int_{|z|=1} \frac{z^m}{5z - 2z^2 - z} dz.$$

有两个孤立奇点 $2, \frac{1}{2}$, 均为一阶。

$$\text{Res}\left[\frac{z^m}{5z - 2z^2 - z}, \frac{1}{2}\right] = \frac{1}{2^m} \cdot \frac{1}{5 - 4 \times 1/2} = \frac{1}{3 \times 2^m}.$$

所以

$$I + iJ = \frac{1}{2i} \times 2\pi i \text{Res}\left[\frac{z^m}{5z - 2z^2 - z}, \frac{1}{2}\right] = \frac{\pi}{3 \times 2^m}.$$

对照实部与虚部, 我们有

$$I = \frac{\pi}{3 \times 2^m}.$$

例子7. 求积分 $I = \int_{|z|=2} \frac{|dz|}{|z-i|^2}$.

解. 先做一个变换

$$z = 2e^{i\theta}, \theta \in [0, 2\pi).$$

则

$$|dz| = 2d\theta, \theta \in [0, 2\pi).$$

所以

$$I = \int_{|z|=2} \frac{|dz|}{|z-i|^2} = \int_0^{2\pi} \frac{2d\theta}{(2e^{i\theta} - i)(2e^{-i\theta} + i)}.$$

再做一个变换 $\xi = e^{i\theta}, \theta \in [0, 2\pi)$. 得到

$$I = \int_{|\xi|=1} \frac{2dz}{iz(2z-i)(2z^{-1}+i)} = \int_{|\xi|=1} \frac{2dz}{i(2z-i)(2+iz)}.$$

有两奇点 $2i, \frac{i}{2}$ 都是一阶。我们仅需要考虑 $\frac{i}{2}$

$$\text{Res}\left[\frac{2}{i(2z-i)(2+iz)}, i/2\right] = \frac{2}{3i}.$$

所以

$$I = \frac{4\pi}{3}.$$

1.2.2 $I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} dx$ 型积分

这一小节我们将计算

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} dx.$$

其中, P, Q 均为多项式, Q 的次数比 P 至少高二次, Q 的所有零点都不在实轴上。我们需要以下引理:

引理1. 设当 R 充分大得时候, 复函数 f 在圆弧 $C_R = Re^{i\theta}, \alpha < \theta < \beta$ 上连续, 并且

$$\lim_{z \rightarrow \infty} zf(z) = A.$$

则

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} f(z) dz = i(\beta - \alpha)A.$$

证明. 设 $z = Re^{i\theta}$, 则 $dz = iRe^{i\theta} d\theta = izd\theta$ 。所以

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} f(z) dz = \int_{\alpha}^{\beta} f(z) iz d\theta = i(\beta - \alpha)A.$$

现在我们计算 I , 补上一个 $C_R: |z| = R, \arg z \in [0, \pi]$ 。则

$$I = \lim_{R \rightarrow \infty} \left(\int_{C_R \cup [-R, R]} \frac{P(z)}{Q(z)} dz - \int_{C_R} \frac{P(z)}{Q(z)} dz \right).$$

注意到 Q 的次数比 P 至少高二次, 所以

$$\lim_{|z| \rightarrow \infty} z \frac{P(z)}{Q(z)} = 0.$$

根据引理, 我们有

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} \frac{P(z)}{Q(z)} dz = 0.$$

所以仅需要计算

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R \cup [-R, R]} \frac{P(z)}{Q(z)} dz.$$

由留数定理

$$I = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R \cup [-R, R]} \frac{P(z)}{Q(z)} dz = 2\pi i \sum_{z_i} \text{Res} \left[\frac{P(z)}{Q(z)}, z_i \right],$$

其中 z_i 为 Q 所有位于上半复平面的零点。

例子8. 计算积分

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(x^2 + a^2)^3} \quad (a > 0).$$

解. $\frac{1}{(x^2 + a^2)^3}$ 在上半平面只有一个奇点 $z = ai$ (三阶极点)。所以

$$2\pi i \text{Res} \left[\frac{1}{(x^2 + a^2)^3}, ai \right] = 2\pi i \frac{1}{2} \lim_{z \rightarrow ai} \left(\frac{1}{(x^2 + a^2)^3} (z - ai)^2 \right)'' = \frac{3\pi}{8a^5}.$$

1.2.3 $I_1 = \int_{-\infty}^{\infty} R(x) \cos mx dx$ 和 $I_2 = \int_{-\infty}^{\infty} R(x) \sin mx dx$, ($m > 0$) 型积分

这里 $R = \frac{P}{Q}$, P, Q 都是多项式, Q 的零点不在实轴上, Q 的次数至少比 P 高一次。显然我们仅需求

$$I_1 + iI_2 = \int_{-\infty}^{\infty} R(x)e^{imx} dx.$$

要求这个积分, 我们也要一个引理

引理2 (若当引理). 当 R 充分大的时候 $g(z)$ 在 $C_R : |z| = R, \operatorname{Im}(z) > -a$ ($a \geq 0$) 上连续, 并且 $\lim_{z \rightarrow \infty} g(z) = 0$. 则对任意正数 λ , 我们有

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} g(z)e^{i\lambda z} dz = 0.$$

我们先默认该引理是对的, 补上一个 $C_R : |z| = R, \arg z \in [0, \pi]$. 则

$$I_1 + iI_2 = \lim_{R \rightarrow \infty} \left(\int_{C_R \cup [-R, R]} R(z)e^{imz} dz - \int_{C_R} R(z)e^{imz} dz \right).$$

注意到

$$\lim_{z \rightarrow \infty} R(z) = 0.$$

所以由若当引理, 我们有

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} R(z)e^{imz} dz = 0.$$

所以

$$\begin{aligned} I_1 + iI_2 &= \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R \cup [-R, R]} R(z)e^{imz} dz = 2\pi i \sum_{z_i} \operatorname{Res}[R(z)e^{imz}, z_i]. \\ I_1 &= \operatorname{Re} \left(2\pi i \sum_{z_i} \operatorname{Res}[R(z)e^{imz}, z_i] \right). \\ I_2 &= \operatorname{Im} \left(2\pi i \sum_{z_i} \operatorname{Res}[R(z)e^{imz}, z_i] \right). \end{aligned}$$

其中 z_i 为所有 $R(z)$ 位于上半复平面的奇点, 也就是 $Q(z)$ 所有位于上半平面的零点。我们证明若当引理:

证明. 图见书: 首先是侧面的小弧, 当 R 很大的时候

$$\left| \int_{\widehat{AB}} g(z)e^{i\lambda z} dz \right| \leq \int_{-\alpha}^0 M_R e^{-\lambda R \sin \theta} R d\theta \leq \int_{-\alpha}^0 M_R e^{\lambda \alpha} R d\theta = M_R e^{\lambda \alpha} R \alpha \leq 2M_R e^{\lambda \alpha} R \sin \alpha = \frac{\pi}{2} M_R e^{\lambda \alpha} a.$$

即

$$\left| \int_{\widehat{AB}} g(z)e^{i\lambda z} dz \right| \rightarrow 0 (R \rightarrow \infty).$$

然后是最上面的大弧,

$$\left| \int_{\widehat{BC}} g(z)e^{i\lambda z} dz \right| \leq \int_0^{\pi} M_R e^{-\lambda R \sin \theta} R d\theta = 2 \int_0^{\pi/2} M_R e^{-\lambda R \sin \theta} R d\theta \leq 2 \int_0^{\pi/2} M_R e^{-\frac{2}{\pi} \lambda R \theta} R d\theta.$$

所以

$$\left| \int_{\widehat{BC}} g(z)e^{i\lambda z} dz \right| \leq -\frac{M_R}{\lambda} e^{-\frac{2}{\pi} \lambda R \theta} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \rightarrow 0.$$

例子9. 计算积分

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{(x^2 + a^2)^2} dx \quad (a > 0).$$

解. $\frac{e^{iz}}{(z^2 + a^2)^2}$ 在上半复平面只有一个奇点 $z = ai$ (二阶极点)。所以

$$\text{Res}\left[\frac{e^{iz}}{(z^2 + a^2)^2}, ai\right] = \lim_{z \rightarrow ai} \left(\frac{e^{iz}}{(z^2 + a^2)^2} (z - ai)^2 \right)' = -\frac{e^{-a}i}{4a^2} - \frac{e^{-a}i}{4a^3}.$$

$$I = \text{Re} \left(2\pi i \text{Res}\left[\frac{e^{iz}}{(z^2 + a^2)^2}, ai\right] \right) = \frac{\pi e^{-a}}{2a^2} + \frac{\pi e^{-a}}{2a^3}.$$

最后我们举个例子说明孤立奇点在实轴上的情形。此时往往会用到以下引理：

引理3. 设当 r 充分小的时候，复函数 f 在圆弧 $C_r = a + re^{i\theta}, \alpha < \theta < \beta$ 上连续，并且

$$\lim_{z \rightarrow a} (z - a)f(z) = A.$$

则

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_r} f(z) dz = i(\beta - \alpha)A.$$

例子10. 计算积分 $\int_0^{\infty} \frac{1 - \cos x}{x^2(x^2 + 9)} dx$.

解. 仅需求

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1 - \cos x}{x^2(x^2 + 9)} dx.$$

这题目和前面的很像，但不能代公式，因为实轴上有个奇点 $z = 0$ 。

补上一个大圆弧 $C_R: |z| = R, \arg z \in [0, \pi]$ 和一个小圆弧 $C_r: |z| = r, \arg z \in [0, \pi]$ 。设 C 是由实轴和圆弧形成的简单闭曲线。则

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1 - \cos x}{x^2(x^2 + 9)} dx = \text{Re} \left(\lim_{\substack{R \rightarrow \infty \\ r \rightarrow 0}} \int_C - \int_{C_R} + \int_{C_r} \frac{1 - e^{iz}}{z^2(z^2 + 9)} dz \right).$$

每一段我们都能求出来：

$$\lim_{\substack{R \rightarrow \infty \\ r \rightarrow 0}} \int_C \frac{1 - e^{iz}}{z^2(z^2 + 9)} dz = 2\pi i \frac{1 - e^{-3}}{(3i)^2(3i + 3i)} = \frac{\pi(e^{-3} - 1)}{27}.$$

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} \frac{1}{z^2(z^2 + 9)} dz = 0.$$

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_r} \frac{e^{iz}}{z^2(z^2 + 9)} dz = 0.$$

因为

$$\lim_{r \rightarrow 0} z \frac{1 - e^{iz}}{z^2(z^2 + 9)} = -\frac{i}{9}.$$

所以

$$\int_{C_r} \frac{1 - e^{iz}}{z^2(z^2 + 9)} dz = \frac{\pi}{9}.$$

所以结果为

$$\frac{\pi(e^{-3} + 2)}{54}.$$

例子11. 计算积分 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x(x^2+1)} dx$.

解. 同样地, 我们仅需要计算

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix}}{x(x^2+1)} dx.$$

补上一个大圆弧 $C_R: |z| = R, \arg z \in [0, \pi]$ 和一个小圆弧 $C_r: |z| = R, \arg z \in [0, \pi]$ 。设 C 是由实轴和圆弧形成的简单闭曲线。则

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x(x^2+1)} dx = \operatorname{Im} \left(\lim_{\substack{R \rightarrow \infty \\ r \rightarrow 0}} \int_C - \int_{C_R} + \int_{C_r} \frac{e^{iz}}{z(z^2+1)} dz \right).$$

每一段我们都能求出来:

$$\lim_{\substack{R \rightarrow \infty \\ r \rightarrow 0}} \int_C \frac{e^{iz}}{z(z^2+1)} dz = 2\pi i \frac{e^{i^2}}{i(2i)} = -\frac{\pi i}{e}.$$

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} \frac{e^{iz}}{z(z^2+1)} dz = 0.$$

因为

$$\lim_{r \rightarrow 0} z \frac{e^{iz}}{z(z^2+1)} = 1.$$

所以

$$\lim_{r \rightarrow 0} \int_{C_r} \frac{e^{iz}}{z(z^2+1)} dz = \pi i.$$

所以结果为

$$\pi - \frac{\pi}{e}.$$

1.2.4 杂例

例子12. 计算积分 $\int_0^{\infty} \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 dx$.

解. 我们仅需要计算

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1 - \cos(2x)}{2x^2} dx.$$

补上一个大圆弧 $C_R: |z| = R, \arg z \in [0, \pi]$ 和一个小圆弧 $C_r: |z| = R, \arg z \in [0, \pi]$ 。设 C 是由实轴和圆弧形成的简单闭曲线。则

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1 - \cos(2x)}{2x^2} dx = \operatorname{Re} \left(\lim_{\substack{R \rightarrow \infty \\ r \rightarrow 0}} \int_C - \int_{C_R} + \int_{C_r} \frac{1 - e^{2zi}}{2z^2} dz \right).$$

每一段我们都能求出来:

$$\lim_{\substack{R \rightarrow \infty \\ r \rightarrow 0}} \int_C \frac{1 - e^{2zi}}{2z^2} dz = 0.$$

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} \frac{1 - e^{2zi}}{2z^2} dz = 0.$$

因为

$$\lim_{r \rightarrow 0} z \frac{1 - e^{2zi}}{2z^2} = -i.$$

所以

$$\lim_{r \rightarrow 0} \int_{C_r} \frac{1 - e^{2zi}}{2z^2} dz = \pi.$$

所以结果为

$$\frac{\pi}{2}.$$

例子13 (弗雷涅积分). $I = \int_0^\infty \cos x^2 dx$.

解. 考察全平面解析函数 $\cos(z^2) + i \sin z^2 = e^{iz^2}$. 画折线 $C: 0 \rightarrow R \xrightarrow{C_1} R + Ri \xrightarrow{C_2} 0$ (见书本). 则

$$J = \int_0^\infty e^{iz^2} dz = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_C - \int_{C_1} - \int_{C_2} e^{iz^2} dz.$$

每一段我们都能求出来:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_C e^{iz^2} dz = 0.$$

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \left| \int_{C_1} e^{iz^2} dz \right| \leq \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R |e^{(R+it)^2 i}| dt \leq \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R e^{-2Rt} dt = \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{1}{2R} = 0.$$

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_2} e^{iz^2} dz = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_R^0 e^{(1+i)^2 t^2 i} (1+i) dt = - \lim_{R \rightarrow \infty} (1+i) \int_0^R e^{-2t^2} dt = -\frac{1+i}{2\sqrt{2}} \sqrt{\pi}.$$

所以 $J = \frac{1+i}{2\sqrt{2}} \pi$. 即

$$\int_0^\infty \cos x^2 dx = \int_0^\infty \sin x^2 dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{2}}.$$

例子14. 计算 $I_1 = \int_{-\infty}^\infty e^{-ax^2} \cos bxdx$ 和 $I_2 = \int_{-\infty}^\infty e^{-ax^2} \sin bxdx$ ($a > 0$).

解. 仅需要计算 $J = I_1 + iI_2$.

$$J = \int_{-\infty}^\infty e^{az^2 + ibz} dz = \int_{-\infty}^\infty e^{-a(z - \frac{bi}{2a})^2 - \frac{b^2}{4a}} dz = \int_{-\infty - \frac{bi}{2a}}^{\infty + \frac{bi}{2a}} e^{-az^2 - \frac{b^2}{4a}} dz.$$

画一个矩形的闭曲线 $-R \rightarrow R \xrightarrow{C_1} R - \frac{bi}{2a} \rightarrow -R - \frac{bi}{2a} \xrightarrow{C_2} -R$ (见书本).

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \left| \int_{C_1} e^{-az^2 - \frac{b^2}{4a}} dz \right| \leq \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_1} |e^{-az^2 - \frac{b^2}{4a}}| |dz| \leq \lim_{R \rightarrow \infty} e^{-R^2 + \frac{b^2}{4a}} \times \frac{b}{2a} = 0.$$

所以 $\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_1} e^{-az^2 - \frac{b^2}{4a}} dz = 0$; 同理 $\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_2} e^{-az^2 - \frac{b^2}{4a}} dz = 0$. 所以

$$J = \int_{-\infty - \frac{bi}{2a}}^{\infty + \frac{bi}{2a}} e^{-az^2 - \frac{b^2}{4a}} dz = \int_{-\infty}^\infty e^{-az^2 - \frac{b^2}{4a}} dz = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{a}} e^{-\frac{b^2}{4a}}.$$

即 $I_1 = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{a}} e^{-\frac{b^2}{4a}}$, $I_2 = 0$. 书上 \int_0^∞ , 所以是一半.

1.2.5 多值情形：只要求了解。

计算某些积分的时候，我们会碰到多值的情形。

例子15. 计算积分

$$I = \int_0^{\infty} \frac{\ln x}{(x^2 + 1)^2} dx.$$

解. 复函数 $\frac{Lnz}{(z^2+1)^2}$, $Ln(z) = \ln|z| + iArgz$, $Argz \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2})$ 解析区域为全复平面去掉负虚轴；围道 $C: -R \xrightarrow{C_1} -r \xrightarrow{\text{小圆弧 } C_r} r \xrightarrow{C_2} R \xrightarrow{\text{大圆弧 } C_R} -R$.

$$\int_{C_1} \frac{Lnz}{(z^2+1)^2} dz = \int_R^r \frac{Ln(-x)}{((-x)^2+1)^2} (-1) dx = - \int_R^r \frac{\ln x + i\pi}{(x^2+1)^2} dx = \int_r^R \frac{\ln x + i\pi}{(x^2+1)^2} dx.$$

$$\int_{C_2} \frac{Lnz}{(z^2+1)^2} dz = \int_r^R \frac{\ln x}{(x^2+1)^2} dx.$$

$$\lim_{r \rightarrow 0} \int_{C_r} \frac{Lnz}{(z^2+1)^2} dz = \lim_{z \rightarrow 0} z \frac{Lnz}{(z^2+1)^2} \times (\pi i) = 0.$$

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} \frac{Lnz}{(z^2+1)^2} dz = \lim_{z \rightarrow \infty} z \frac{Lnz}{(z^2+1)^2} \times (\pi i) = 0.$$

最后当 R 很大 r 很小的时候,

$$\lim_{\substack{R \rightarrow \infty \\ r \rightarrow 0}} \int_{C_1} + \int_{C_2} + \int_{C_r} + \int_{C_R} = 2\pi i \operatorname{Res}[\frac{Lnz}{(z^2+1)^2}, i] = \frac{\pi + 2i}{8}.$$

最后

$$I = \frac{\pi + 2i}{16} - \frac{1}{2} \int_0^{\infty} \frac{i\pi}{(x^2+1)^2} dx = \frac{\pi + 2i}{16} - \frac{1}{4} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{i\pi}{(x^2+1)^2} dx = -\frac{\pi}{4}.$$

一般情形

$$2 \int_0^{\infty} R(x) \ln x dx + \pi \int_0^{\infty} R(x) dx = 2\pi i \sum_{z_i} \operatorname{Res}[R(z) \ln z, z_i].$$

其中 z_i 为所有上半平面奇点；其中 $R(x)$ 为偶的有理多项式，分母比分子至少高二次，零点不在实轴上。

例子16. $I = \int_0^{\infty} z^p R(z) dz$, p 不是整数； R 为有理多项式，奇点不在正实轴；并且满足

$$\lim_{z \rightarrow 0} z^{p+1} R(z) = \lim_{z \rightarrow \infty} z^{p+1} R(z) = 0.$$

解. 图见书本：画围道 $C: r \xrightarrow{\text{实轴上沿 } C_1} R \xrightarrow{\text{大圆 } C_R} R \xrightarrow{\text{实轴下沿 } C_2} r \xrightarrow{\text{小圆 } C_r} r$.

$$\lim_{\substack{R \rightarrow \infty \\ r \rightarrow 0}} \int_C z^p R(z) dz = 2\pi i \sum_i \operatorname{Res}[z^p R(z), z_i].$$

其中 z_i 表示所有奇点。

$$\int_{C_2} z^p R(z) dz = - \int_{C_1} e^{2\pi p} z^p R(z) dz.$$

由两个引理：

$$\lim_{r \rightarrow 0} \int_{C_r} z^p R(z) dz = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} z^p R(z) dz = 0.$$

所以

$$\lim_{\substack{R \rightarrow \infty \\ r \rightarrow 0}} \int_{C_1} z^p R(z) dz = \frac{1}{1 - e^{2\pi p}} 2\pi i \sum_i \text{Res}[z^p R(z), z_i].$$

其中 z_i 表示所有奇点。

1.3 罗歇定理

在这一节中，我们主要关心一个解析函数在简单闭曲线内部的零点个数。设 $C: [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ （逆时针）是简单闭曲线并且 $f|_C$ 恒不为零， f 在 C 和 C 所围城的曲线内部除了极点 (b_1, \dots, b_l) ，阶数相应为 n_1, \dots, n_l 解析，我们不妨用指数形式表示

$$f(z) = r(z)e^{i\theta(z)}.$$

其中 $r(z)$ 是模， $\theta(z)$ 是幅角（每个点取一个幅角但要保证连续，首尾取值可以不相等）。所以限制在 C 上，

$$\frac{f'}{f} = \frac{r'e^{i\theta} + rie^{i\theta}\theta'}{re^{i\theta}} = \frac{r'}{r} + i\theta'.$$

所以

$$\int_C \frac{f'}{f} dz = \ln r(z)|_{z_1}^{z_2} + i \int_C 1 d\theta, .$$

所以

$$\int_C \frac{f'}{f} dz = i \int_C 1 d\theta.$$

又设 f 在 C 内部的所有零点为 a_1, \dots, a_k 相应阶数为 m_1, \dots, m_k ，则在 C 内部 f 可以写为

$$f = (z - a_1)^{m_1} \dots (z - a_k)^{m_k} (z - b_1)^{-n_1} \dots (z - b_l)^{-n_l} g$$

$g(z)$ 在 C 和 C 内没有零点且解析。所以

$$\int_C \frac{f'}{f} dz = \int_C \sum_i \frac{m_i}{z - a_i} - \sum_i \frac{n_i}{z - b_i} + \frac{g'}{g} dz.$$

由柯西积分定理和柯西积分公式，我们有

$$\int_C \frac{f'}{f} dz = 2\pi i \sum_i m_i - 2\pi i \sum_i n_i.$$

比较得到

定理3.

$$\sum_i m_i - \sum_i n_i = \frac{\int_C 1 d\theta}{2\pi} = \frac{\Delta_C \arg[f]}{2\pi}.$$

换句话说就是零点个数（计重数）减去极点个数（计算重数）等于曲线在 f 下的象围绕 0 点的圈数。

显然有以下性质

$$\Delta_C \arg[f g] = \Delta_C \arg[f] + \Delta_C \arg[g].$$

但是呢直接数曲线的象围绕 0 点的圈数并不容易。我们往往用到以下定理来找零点个数：

定理4. 假设解析函数 f, φ 在简单闭曲线 C 上满足

$$|f| > |\varphi|.$$

则 f 和 $f \pm \varphi$ 在 C 内有相同的零点个数。

证明.

$$\Delta_C \arg[f \pm \varphi] = \Delta_C \arg[f(1 \pm \frac{\varphi}{f})] = \Delta_C \arg[f] + \Delta_C \arg[1 \pm \frac{\varphi}{f}].$$

仅需要说明 $\Delta_C \arg[1 \pm \frac{\varphi}{f}] = 0$ 。实际上 $1 \pm \frac{\varphi}{f}$ 将曲线 C 映入 $\operatorname{Re}(z) > 0$ ，其围绕0的圈数必定是零，所以 $\Delta_C \arg[1 \pm \frac{\varphi}{f}] = 0$ 。

例子17. 求 $z^{2020} + z^{20} = 20$ 在 $1 < |z| < 2$ 内部的零点个数。

解. 设 $f_1 = z^{2020}$ 、 $\varphi_1 = z^{20} - 20$ 则在 $|z| = 2$ 上

$$|f_1| > |\varphi_1|.$$

所以 $f_1 + \varphi_1$ 在 $|z| < 2$ 有2020个零点。

又设 $f_2 = 20$ 、 $\varphi_2 = z^{2020} + z^{20}$ ，则在 $|z| = 1$ 上

$$|f_2| > |\varphi_2|.$$

所以 $\varphi_2 - f_2$ 在 $|z| \leq 1$ 没有零点。所以 f 在 $1 < |z| < 2$ 有2020个零点。