

6章 図形と式

§2 2次曲線 (p.201~p.202)

練習問題 2-A

1.

$$(1) (x^2 - 4x) + (y^2 + 2y) - 7 = 0$$

$$(x-2)^2 - 4 + (y+1)^2 - 1 - 7 = 0$$

$$(x-2)^2 + (y+1)^2 = 12$$

$$(x-2)^2 + (y+1)^2 = (2\sqrt{3})^2$$

よって、中心 $(2, -1)$ 、半径 $2\sqrt{3}$

$$(2) x^2 + (y^2 - 3y) + 1 = 0$$

$$x^2 + \left(y - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{9}{4} + 1 = 0$$

$$x^2 + \left(y - \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{5}{4}$$

$$x^2 + \left(y - \frac{3}{2}\right)^2 = \left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^2$$

よって、中心 $\left(0, \frac{3}{2}\right)$ 、半径 $\frac{\sqrt{5}}{2}$

2.

(1) 求める円の方程式を

$$(x-1)^2 + (y+2)^2 = r^2$$

とおくと、この円が点 $(4, 1)$ を通るので

$$(4-1)^2 + (1+2)^2 = r^2$$

よって、 $r^2 = 18$

したがって、

$$(x-1)^2 + (y+2)^2 = 18$$

(2) 円の中心の座標は、与えられた2点の中点だから

$$\left(\frac{2+6}{2}, \frac{4+(-2)}{2}\right) = (4, 1)$$

半径は、この中心と点 $(2, 4)$ との距離だから

$$\sqrt{(2-4)^2 + (4-1)^2} = \sqrt{13}$$

よって、求める円の方程式は、

$$(x-4)^2 + (y-1)^2 = (\sqrt{13})^2$$

$$(x-4)^2 + (y-1)^2 = 13$$

(3) 求める円の方程式を、

$$x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$$

とおくと、この円が、与えられた3点を通るから

$$\begin{cases} 1+1+a+b+c=0 \\ 4+16+2a+4b+c=0 \\ 25+9+5a+3b+c=0 \end{cases}$$

整理すると

$$\begin{cases} a+b+c=-2 \\ 2a+4b+c=-20 \\ 5a+3b+c=-34 \end{cases}$$

これを解いて、 $(a, b, c) = (-6, -4, 8)$

よって、求める方程式は、

$$x^2 + y^2 - 6x - 4y + 8 = 0$$

3.

点Pの座標を (x, y) とすると

$$\begin{cases} AP^2 = (x-2)^2 + y^2 \\ BP^2 = x^2 + (y-2)^2 \end{cases} \cdots \textcircled{1}$$

(1) 与式に①を代入すると

$$(x-2)^2 + y^2 + x^2 + (y-2)^2 = 6$$

$$x^2 - 4x + 4 + y^2 + x^2 + y^2 - 4y + 4 = 6$$

$$2x^2 - 4x + 2y^2 - 4y = -2$$

$$x^2 - 2x + y^2 - 2y = -1$$


$$(x-1)^2 - 1 + (y-1)^2 - 1 = -1$$

$$(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$$

$$(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1^2$$

よって、求める軌跡は、

中心 $(1, 1)$ 、半径 1 の円である。

(2) $AP : BP = 1 : 2$ より、 $2AP = BP$ であるから

$$4AP^2 = BP^2$$

これに①を代入すると

$$4\{(x-2)^2 + y^2\} = x^2 + (y-2)^2$$

$$4(x^2 - 4x + 4 + y^2) = x^2 + y^2 - 4y + 4$$

$$4x^2 - 16x + 16 + 4y^2 = x^2 + y^2 - 4y + 4$$

$$3x^2 - 16x + 3y^2 + 4y + 12 = 0$$

$$x^2 - \frac{16x}{3} + y^2 + \frac{4y}{3} + 4 = 0$$


$$\left(x - \frac{8}{3}\right)^2 - \frac{64}{9} + \left(y + \frac{2}{3}\right)^2 - \frac{4}{9} + 4 = 0$$

$$\left(x - \frac{8}{3}\right)^2 + \left(y + \frac{2}{3}\right)^2 = \frac{32}{9}$$

$$\left(x - \frac{8}{3}\right)^2 + \left(y + \frac{2}{3}\right)^2 = \left(\frac{4\sqrt{2}}{3}\right)^2$$

よって、求める軌跡は、

中心 $\left(\frac{8}{3}, -\frac{2}{3}\right)$, 半径 $\frac{4\sqrt{2}}{3}$ の円である.




(3) 与式に①を代入すると、

$$(x-2)^2 + y^2 - \{x^2 + (y-2)^2\} = 4$$

$$x^2 - 4x + 4 + y^2 - (x^2 + y^2 - 4y + 4) = 4$$


$$-4x + 4y = 4$$

$$y = x + 1$$




4.

$$(1) \frac{x^2}{3^2} + \frac{y^2}{(\sqrt{2})^2} = 1$$




$$(2) y^2 = \frac{4}{3}x$$

$$y^2 = 4 \cdot \frac{1}{3}x$$



$$(3) \frac{x^2}{2^2} - \frac{y^2}{(\sqrt{3})^2} = 1$$



5.

(1) 焦点が $(0, \pm\sqrt{3})$ であるから、

求める楕円の方程式は

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (b > a > 0)$$

とおくことができる. 長軸の長さが6であるから

$$2b = 6$$

よって、 $b = 3$

$$\sqrt{b^2 - a^2} = \sqrt{3}$$


であるから、これに $b = 3$ を代入して

$$9 - a^2 = 3$$

よって、 $a^2 = 6$

したがって、楕円の方程式は

$$\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{9} = 1$$



(2) 焦点はy軸上にあるので、求める双曲線の方程式は

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1 \quad (a > 0, b > 0)$$

とおくことができる.

点(0, 1)を通るから

$$-\frac{1}{b^2} = -1$$

よって、 $b^2 = 1 \cdots \textcircled{1}$

漸近線の傾きが $\pm \frac{1}{2}x$ であるから

$$\frac{b}{a} = \frac{1}{2}$$


よって、 $a = 2b$ となるので

$$a^2 = 4b^2$$

①を代入して、 $a^2 = 4 \cdot 1 = 4$

したがって、双曲線の方程式は

$$\frac{x^2}{4} - y^2 = -1$$



6.

$y = x + k$ を、 $5x^2 - y^2 = -5$ に代入して整理すると

$$5x^2 - (x + k)^2 = -5$$

$$5x^2 - (x^2 + 2kx + k^2) = -5$$

$$4x^2 - 2kx - k^2 + 5 = 0 \cdots \textcircled{1}$$

この2次方程式の判別式を D とすると

$$\frac{D}{4} = (-k)^2 - 4(-k^2 + 5)$$

$$= k^2 + 4k^2 - 20$$

$$= 5k^2 - 20$$

双曲線と直線が接するための条件は、

$D = 0$ であるから

$$5k^2 - 20 = 0$$

$$k^2 = 4$$

$$k = \pm 2$$

このとき、①は

$$4x^2 \mp 4x + 1 = 0$$

となるから、これを解いて

$$(2x \mp 1)^2 = 0$$

$$x = \pm \frac{1}{2}$$

$$y = x + k$$

$$= \pm \frac{1}{2} \pm 2 \quad (\text{複号同順})$$

$$= \pm \frac{5}{2}$$

よって、 $k = \pm 2$

焦点の座標は

$$\left(\pm \frac{1}{2}, \pm \frac{5}{2}\right) \quad (\text{複号同順})$$

7.

(1) $x^2 + y^2 > 4$ の表す領域は、円 $x^2 + y^2 = 4$ の外部である。

$$x + y + 2 > 0 \text{ より, } y > -x - 2$$

この不等式の表す領域は、直線 $y = -x - 2$ の上側である。

円と直線の交点の座標を求めると

$$x^2 + (-x - 2)^2 = 4$$

$$x^2 + x^2 + 4x + 4 = 4$$


$$2x^2 + 4x = 0$$

$$x(x + 2) = 0$$

$$x = 0, -2$$

よって、 $(0, -2), (-2, 0)$

したがって、求める領域は、2つの領域の共通部分であるから、図の斜線部分である。



ただし、境界を含まない。

(2) $x^2 + y \leq 0$ より、 $y \leq -x^2$

この不等式の表す領域は、放物線 $y = x^2$ の下側である。

$$2x - y - 3 \leq 0 \text{ より, } y \geq 2x - 3$$

この不等式の表す領域は、直線 $y = 2x - 3$ の上側である。

放物線と直線の交点を求めると

$$-x^2 = 2x - 3$$


$$x^2 + 2x - 3 = 0$$

$$(x + 3)(x - 1) = 0$$

$$x = -3, 1$$

よって、 $(-3, -9), (1, -1)$

したがって、求める領域は、2つの領域の共通部分であるから、図の斜線部分である。



ただし、境界を含む。

8.

2 直線 $y = x + 1$, $y = 3x - 1$ の交点の座標は、

$(1, 2)$,


2 直線 $y = -x + 1$, $y = 3x - 1$ の交点の座標は、

$(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$,

2 直線 $y = x + 1$, $y = -x + 1$ の交点の座標は、

$(0, 1)$ である。


よって、与えられた連立不等式の表す領域は図の斜線部分である。ただし、境界線を含む。



$2x + y = k$ とおくと

$$y = -2x + k \cdots \textcircled{1}$$

①は、傾きが-2、切片が k の直線を示す。



図より、直線①が点 $(1, 2)$ を通るとき、 k の値は最大となる。

$$\text{このとき、} k = 2x + y = 2 \cdot 1 + 2 = 4$$

また、直線①が点 $(0, 1)$ を通るとき、 k の値は最小となる。

$$\text{このとき、} k = 2x + y = 2 \cdot 0 + 1 = 1$$

よって

最大値 4 ($x = 1, y = 2$ のとき)

最小値 1 ($x = 0, y = 1$ のとき)

練習問題 2-B

(1) 中心の座標は、 $(0, t)$ と表されるので、

求める円の方程式を

$$x^2 + (y - t)^2 = r^2$$

とおくと、この円が与えられた2点を通るから

$$\begin{cases} 1 + (1 - t)^2 = r^2 \\ 4 + (4 - t)^2 = r^2 \end{cases}$$

r^2 を削除すると

$$1 + (1 - t)^2 = 4 + (4 - t)^2$$

$$1 + 1 - 2t + t^2 = 4 + 16 - 8t + t^2$$

$$6t = 18$$

$$t = 3$$

$$\text{よって、} r^2 = 1 + (1 - 3)^2 = 5$$

したがって

$$x^2 + (y - 3)^2 = 5$$

(2) 中心の座標は、 (t, t) と表されるので、

求める円の方程式を

$$(x - t)^2 + (y - t)^2 = r^2$$

とおくと、この円が与えられた2点を通るから

$$\begin{cases} t^2 + t^2 = r^2 \\ (1 - t)^2 + (3 - t)^2 = r^2 \end{cases}$$

r^2 を削除すると

$$2t^2 = (1 - t)^2 + (3 - t)^2$$

$$2t^2 = 1 - 2t + t^2 + 9 - 6t + t^2$$

$$8t = 10$$

$$t = \frac{5}{4}$$

$$\text{よって、} r^2 = 2t^2 = 2 \cdot \frac{25}{16} = \frac{25}{8}$$

したがって

$$\left(x - \frac{5}{4}\right)^2 + \left(y - \frac{5}{4}\right)^2 = \frac{25}{8}$$

2.

$y = mx$ を $x^2 + y^2 - 3x - 2y + 3 = 0$ に代入して整理すると

$$x^2 + (mx)^2 - 3x - 2(mx) + 3 = 0$$

$$(m^2 + 1)x^2 - (2m + 3)x + 3 = 0$$

この2次方程式の判別式を D とすると

$$D = \{-(2m + 3)\}^2 - 4 \cdot (m^2 + 1) \cdot 3$$

$$= 4m^2 + 12m + 9 - 12m^2 - 12$$

$$= -8m^2 + 12m - 3$$

直線と円が接するのは、 $D = 0$ のときであるから

$$8m^2 - 12m + 3 = 0$$

$$m = \frac{12 \pm \sqrt{(-12)^2 - 4 \cdot 8 \cdot 3}}{2 \cdot 8}$$

$$= \frac{12 \pm \sqrt{144 - 96}}{16}$$

$$= \frac{12 \pm \sqrt{48}}{16}$$

$$= \frac{12 \pm 4\sqrt{3}}{16}$$

$$= \frac{3 \pm \sqrt{3}}{4}$$

また、直線と円が共有点を持たないのは、 $D < 0$ のときであるから

$$-8m^2 + 12m - 3 < 0$$

$$8m^2 - 12m + 3 > 0$$


$$8\left(m - \frac{3 - \sqrt{3}}{4}\right)\left(m - \frac{3 + \sqrt{3}}{4}\right) > 0$$

よって

$$m < \frac{3 - \sqrt{3}}{4}, m > \frac{3 + \sqrt{3}}{4}$$

3.

円 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ と円周上の点 (x_1, y_1) を、 x 軸方向に $-a$ 、 y 軸方向に $-b$ だけ平行移動させると、円は $x^2 + y^2 = r^2$ に、円周上の点は $(x_1 - a, y_1 - b)$ に移る。



円 $x^2 + y^2 = r^2$ の、点 $(x_1 - a, y_1 - b)$ における接線の方程式は

$$(x_1 - a)x + (y_1 - b)y = r^2$$

である。

求める戦線の方程式は、この直線を、 x 軸方向に a 、 y 軸方向に b だけ平行移動させればよいから

$$(x_1 - a)(x - a) + (y_1 - b)(y - b) = r^2$$

$(x_1, y_1) = (1, 3)$, $a = -2$, $b = 1$, $r^2 = 13$ で

あるから、求める接線の方程式は

$$(1 + 2)(x + 2) + (3 - 1)(y - 1) = 13$$

$$3(x + 2) + 2(y - 1) = 13$$

$$3x + 6 + 2y - 2 = 13$$

$$3x + 2y = 9$$

4.

$y = mx + 1$ を $x^2 + 4y^2 = 2$ に代入して整理すると

$$x^2 + 4(mx + 1)^2 = 2$$

$$x^2 + 4(m^2x^2 + 2mx + 1) = 2$$

$$(4m^2 + 1)x^2 + 8mx + 2 = 0$$

この2次方程式の判別式を D とすると

$$\frac{D}{4} = (4m)^2 - (4m^2 + 1) \cdot 2$$

$$= 16m^2 - 8m^2 - 2$$

$$= 8m^2 - 2 = 0$$

i) $D > 0$ のとき、すなわち

$$8m^2 - 2 > 0$$

$$4m^2 - 1 > 0$$

$$(2m + 1)(2m - 1) > 0$$

$$m < -\frac{1}{2}, m > \frac{1}{2} \text{のとき,}$$

共有点の個数は2個。

ii) $D = 0$ のとき、すなわち

$$m = \pm \frac{1}{2} \text{のとき}$$

共有点の個数は1個。

iii) $D < 0$ のとき、すなわち

$$-\frac{1}{2} < m < \frac{1}{2} \text{のとき}$$

共有点の個数は0個。


よって

$$m < -\frac{1}{2}, m > \frac{1}{2} \text{ のとき } 2 \text{ 個}$$

$$m = \pm \frac{1}{2} \text{ のとき } 1 \text{ 個}$$

$$-\frac{1}{2} < m < \frac{1}{2} \text{ のとき } 0 \text{ 個}$$

5.



点 A, B の x 座標を t とすると

$$y^2 = 4pt \text{ より, } y = \pm 2\sqrt{pt}$$

ここで, $A(t, 2\sqrt{pt}), B(t, -2\sqrt{pt})$ とする.

$$OA = \sqrt{t^2 + (2\sqrt{pt})^2}$$

$$= \sqrt{t^2 + 4pt}$$

$$AB = 2\sqrt{pt} - (-2\sqrt{pt})$$

$$= 4\sqrt{pt}$$

$OA = AB$ より, $OA^2 = AB^2$ であるから

$$t^2 + 4pt = 16pt$$

$$t^2 - 12pt = 0$$

$$t(t - 12p) = 0$$

$t = 0$ であるから, $t = 12p$

よって

$$AB = 4\sqrt{p \cdot 12p} = 8\sqrt{3}p$$

したがって

$$\triangle OAB = \frac{1}{2} AB \cdot t$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 8\sqrt{3}p \cdot 12p$$

$$= 48\sqrt{3}p^2$$

6.

(1) $\triangle OAB$ で, $OA^2 + OB^2 = AB^2$ であるから

$$a^2 + b^2 = 3^2$$

$$\text{すなわち, } a^2 + b^2 = 9$$

$$(2) x = \frac{2 \cdot a + 1 \cdot 0}{1 + 2} = \frac{2}{3}a$$

$$y = \frac{2 \cdot 0 + 1 \cdot b}{1 + 2} = \frac{1}{3}b$$

$$(3) x = \frac{2}{3}a \text{ より, } a = \frac{3}{2}x$$


$$y = \frac{1}{3}b \text{ より, } b = 3y$$

これらを, $a^2 + b^2 = 9$ に代入すると

$$\left(\frac{3}{2}x\right)^2 + (3y)^2 = 9$$

$$\frac{9}{4}x^2 + 9y^2 = 9$$

$$\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$$



7.

$$y^2 \leq 4x \text{ より, } x \geq \frac{1}{4}y^2$$

この不等式の表す領域は, $x^2 = \frac{1}{4}y^2$ の右側である.

$$2x + y \leq 12 \text{ より, } y \leq -2x + 12$$

この不等式の表す領域は, 直線 $y = -2x + 12$ の下側である.

放物線と直線の交点の座標を求めると

$$\frac{1}{4}y^2 = -\frac{1}{2}y + 6$$


$$y^2 + 2y - 24 = 0$$

$$(y + 6)(y - 4) = 0$$

$$y = -6, 4$$

よって, $(9, -6), (4, 4)$


したがって, 求める領域は, 2つの領域の共通部分であるから, 図の斜線部分である. ただし, 境界を含む.



$x - y = k$ とおくと

$$y = x - k \cdots \textcircled{1}$$

①は、傾きが1, 切片が $-k$ の直線を表す.



図より、直線①が点(9, -6)を通るとき、
 $-k$ が最小になるので、 k の値は最大となる.

$$\text{このとき, } k = x - y = 9 - (-6) = 15$$

また、直線①と $y^2 = 4x$ との接点において、
 $-k$ が最大になるので、 k の値は最小となる.
 k の値を判別式によって求める.

$y = x - k$ を $y^2 = 4x$ に代入して整理すると、

$$(x - k)^2 = 4x$$

$$x^2 - 2kx + k^2 - 4x = 0$$

$$x^2 + 2(-x - 2)x + k^2 = 0$$

この方程式の判別式を D とすると、

$$\frac{D}{4} = (-k - 2)^2 - k^2$$

$$= k^2 + 4k + 4 - k^2$$

$$= 4k + 4$$

接点を持つ(共有点が1個となる)のは、 $D = 0$
 のときであるから、

$$k + 1 = 0$$

$$k = -1$$

したがって、この値が k の最小値となる.

また、接点の座標は、 $y = x + 1$ と $y^2 = 4x$ の交点で
 あるから、求めると(1, 2)である.

よって

最大値 15 ($x = 9, y = -6$ のとき)

最小値 -1 ($x = 1, y = 2$ のとき)

$PF + PF' = 2a$ に代入すると

$$\sqrt{(x - c)^2 + y^2} + \sqrt{(x + c)^2 + y^2} = 2a$$

$$\sqrt{(x - c)^2 + y^2} = 2a - \sqrt{(x + c)^2 + y^2}$$

両辺を2乗して整理すると

$$(x - c)^2 + y^2 = 4a^2 - 4a\sqrt{(x + c)^2 + y^2} + (x + c)^2 + y^2$$

$$4a\sqrt{(x + c)^2 + y^2} = 4a^2 + 4cx$$

$$a\sqrt{(x + c)^2 + y^2} = a^2 + cx$$

両辺を2乗して整理すると

$$a^2\{(x + c)^2 + y^2\} = a^4 + 2a^2cx + c^2x^2$$

$$a^2x^2 + 2a^2cx + a^2c^2 + a^2y^2 = a^4 + 2a^2cx + c^2x^2$$

$$(a^2 - c^2)x^2 + a^2y^2 = a^2(a^2 - c^2)$$

問題文より、 $a^2 - c^2 = b^2$ であるから

$$b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2$$

両辺を a^2b^2 で割って

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

8.

点P座標を(x, y)とすると

$$PF = \sqrt{(x - c)^2 + y^2}$$

$$PF' = \sqrt{(x + c)^2 + y^2}$$