사회통계연습

평균비교 연습

김현우, PhD[1]

[1] 충북대학교 사회학과 조교수

October 6, 2023

진행 순서

1. 등분산 가정
2. 평균비교를 위한 표
3. 평균비교 연습

등분산 가정

등분산 가정

연습 5. INCOME.SAV를 SPSS에서 불러들여 가구소득과 고졸 이상의 최종학력에 관한 가설을 적절하게 세우고 이를 95% 신뢰수준에서 검정하시오. 그 결과에 대해서도 간단히 논하시오.

등분산 가정

결과를 해석할 때 (두 표본의 분산이 같다는) t 검정의 가정에 대해 살짝 주의해야 한다.

- 이 가정을 등분산(homogeneity of variance)이라고 부른다. 결과표에는 이 가정의 성립 여부에 따라 다른 결과를 제시한다.
- 만일 실험 전후로 같은 사람을 짝지워 평균을 비교하는 경우라면 이 가정은 (상대적으로) 크게 문제되지 않을 수 있다. 만약 같은 초등학생을 1년 전후로 추적하여(before vs after) 사회적 자아를 조사한다면 이 가정의 타당성이 별로 의심스럽지는 않다(Why?).
- 하지만 (쌍체표본 t 검정과는 달리) 독립표본 t 검정을 사용한다면 반드시 같은 사람끼리 짝지어 평균을 비교하지 않을 수도 있다!
- 다른 사람이라면 이 가정의 타당성이 특히 의문스럽고 이 가정은 아예 완화되어야 할 필요가 있다.

등분산 가정

- SPSS에서는 Levene's Test for Equality of Variances 결과를 제공하고 있다.
- 이것의 귀무가설은 "두 집단은 등분산이다"라는 것이다. 귀무가설을 기각하면 아랫쪽 표를 해석하면 된다(Why?).
- 다행히 표본 크기가 커지면 이 가정의 위배는 사실 크게 걱정하지 않아도 된다.

등분산 가정

연습 6. ATTEND.SAV를 SPSS에서 불러들여 “1학년(frosh) 때는 보통 정신 못차리고 놀다가 성적(termgpa)을 망치기 쉽다”는 논지의 가설을 10% 유의수준에서 검정하시오. 그 결과에 대해서도 간단히 논하시오.

평균비교를 위한 표

평균비교를 위한 표

데이터 분석에 앞서 꼼꼼한 준비가 필요하다.

- 평균비교를 할 때 사실 하나는 양적변수, 다른 하나는 질적변수이다(Why?).
- 가설을 세울 때는 먼저 사회학적 상상력이 필요하다. 이 순간에는 컴퓨터 화면에서 시선을 떼고 곰곰히 생각에 생각을 거듭해야 한다. 독립변수와 종속변수는 무엇인가?
- 결측치 처리에 주의해야 한다. 신중하게 기술통계도 살펴보고 시각화도 해보자.
- 분석기법은 무엇이 적절한가? 어떤 자료 구조인가? 가정은 위배되지 않았을까?

평균비교를 위한 표

유의성 검정에서 α 값을 미리 정해놓는 경우는 그다지 없다.

- 실무나 연구 상황에서는 먼저 t 값을 써놓고, 유의성 검정을 수행한 다음에 독특한 표식을 남긴다.
- 그 대신 신뢰수준이 99.9%일 때는 별 3개(***), 99%일 때는 별 2개(**), 95%일 때는 별 1개(*)를 통계량 뒤에 덧붙여 표기한다.
- 좀 더 구차해지고 싶을 때는 90% 신뢰수준에 대해 대거 1개(†)를 붙인다.
- 주의할 것은 이것이 관례에 지나지 않는다는 점이다!

평균비교를 위한 표

연습 7. ATTEND.SAV를 SPSS에서 불러들여 학점(termgpa), 숙제제출 비율(hwrte), 결석 수(skipped)가 1학년인지 여부에 따라 상이한지 검정하시오.

평균비교를 위한 표

- SPSS에서 t 검정을 수행하고 결과를 요약하는 표 하나를 만들 수 있다.
- 먼저 격차 $\bar{X}_1 - \bar{X}_2$를 나타낼 수 있다. 그리고 그 격차가 표본을 넘어 모집단 수준에서 일반화될 수 있는가를 판정하기 위해 t 검정을 수행한다(Why?).
- t 값을 쓰고 그 뒤에 유의확률(=Sig.)을 표시할 수도 있지만, 읽는 사람 입장에서 조금 귀찮기 때문에 별이나 대거로 요약할 수 있다.

	1학년		2·3·4학년		격차	t 값
	평균	표준편차	평균	표준편차		
학점	2.4	0.7	2.7	0.7	0.2	3.4***
숙제제출 비율	84.8	21.3	88.8	18.6	4.0	2.3**
결석 수	6.1	5.3	5.8	5.5	-0.3	-0.5

평균비교를 위한 표

평균비교는 기본적인 그룹 차이를 드러낼 때 보편적으로 활용된다.

- 그룹 두 개를 상정하고 그 차이를 비교하는 것은 매우 일반적인 접근법이다.
- 이민아(2014)를 다시 읽고 남녀 차이가 어떻게 설명되어 있는지 확인해보자.
- 기술통계(descriptive statistics) 수준으로 여러 변수들이 두 개의 사회적 집단 사이에 어떻게 다른지 간단히 보여줄 때도 매우 유용하다(Why?).
- 반드시 표 밑의 각주에 별의 갯수에 대한 설명을 달아야 한다!

평균비교를 위한 표

- 가령 미국의 공화당을 지지하는 주(적색)와 민주당을 지지하는 주(청색) 사이에 살인과 자살 등 폭력이 어떻게 다른지 살펴본 연구를 참고하자.

2000 사망자 (10만 명당)	적색 주(30개)		청색 주(20개)		통계적 유의수준	
	평균	표준편차	평균	표준편차	t	p
살인	5.7	2.85	4.2	2.43	1.90	0.064
자살	13.0	2.89	10.0	2.95	3.57	0.001*
종합	18.7	3.80	14.2	4.02	4.01	0.000*
2004 사망자 (10만 명당)	적색 주(31개)		청색 주(19개)		통계적 유의수준	
	평균	표준편차	평균	표준편차	t	p
살인	5.7	2.67	4.0	2.15	2.38	0.021*
자살	13.9	3.19	10.2	2.70	4.28	0.000*
종합	19.6	4.04	14.2	2.90	5.16	0.000*

(〈왜 어떤 정치인은 다른 정치인보다 해로운가?〉 239페이지)

평균비교 연습

평균비교 연습

연습 8. EFFECTS.SAV를 사용하여 K-다이어트를 수행하였을 때 예전 몸무게(BEFORE)와 이후 몸무게(AFTER)에 차이가 나타났다고 할 수 있는지 가설을 세우고 95% 신뢰수준에서 통계적으로 검정하시오.

평균비교 연습

연습 9. MEDCOND.SAV를 SPSS에서 불러들여 각종 제한사항의 비율을 성별에 따라 비교하는 표를 작성하고 유의성 검정 결과를 보고하시오. 이때 표에는 (노령을 제외한) 모든 제한사항의 총합계 역시 성별로 비교하는 내용을 추가하시오.

평균비교 연습

연습 10. Y2_STD_EDU.SAV와 Y3_STD_EDU.SAV는 같은 아동들을 초등학교 2학년 시기와 3학년 시기에 추적 조사한 자료이다. 회인은 "1년 전후로 신체자기에 관한 총점(합산점수)이 동일하다"라는 귀무가설을 세웠다. 적절한 대립가설을 제시하고 이에 관해 검정하시오.