

3.1 Introduction to detedmenants

$n \geq 2$ 이상일때 $[n \times n]$ 행렬 A_{ij} 의 행렬식은 $\pm a_{1j} * \det A_{1j}$ 와 같다.

즉 첫번째 행에서 $a_{11}, -a_{12}, \dots, a_{1n}$ 에 위의 연산을 연산을 반복하면 A의 determinant 구할 수 있다.

($\det A_{ij}$: 행렬 A에서 i행, j열을 제외하고 계산한 행렬식)

$$\det A = a_{11}\det A_{11} - a_{12}\det A_{12} \dots + (-1)^{n+1}a_{1n}\det A_{1n}$$

$$= \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} a_{1j} \det A_{1j}$$

Cofactor: 위의 연산에서 Cofactor C_{ij} 는 $(-1)^{i+j} \det A_{ij}$ 이다.(그냥det를 쉽게 표기하는 방식이라 보면 된다)

즉 $\det A = "a_{11}\det A_{11} - a_{12}\det A_{12} + \dots + (-1)^{n+1}a_{1n}\det A_{1n}"$ 은
 $"a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + \dots + a_{1n}C_{1n}"$ 처럼 표현할 수 있다.

Theorem 1

$[n \times n]$ 행렬의 행렬식은 어떠한 행이나 열의 cofactor expansion으로도 구할 수 있다.

- 위와 같이 1번째 행이 아니라 어떠한 행에 cofactor expansion을 취해도 결과는 동일하다.

$$\det A = a_{i1}\det A_{i1} + a_{i2}\det A_{i2} \dots a_{in}\det A_{in}$$

- 아래와 같이 특정 열에 취해도 결과는 동일하다.

$$\det A = a_{1j}\det A_{1j} + a_{2j}\det A_{2j} \dots a_{nj}\det A_{nj}$$

Theorem 2

행렬 A가 triangular matrix일때 $\det A$ 는 A의 주대각 원소의 곱이다.

Properties of Determinants

Theorem 3

정방행렬 A에 한번의 행연산(scaling, replacement, interchange)을 하여 행렬 B를 만든다고 생각해보자

- Scaling: $\det B = k \cdot \det A$
- Replacement: $\det B = \det A$
- Interchange: $\det B = -\det A$

이는 $\det EA = (\det E)(\det A)$ 이기 때문이다.

Theorem 4

$\det A \neq 0$ 이라면 A는 invertible하다.

Theorem 5

A가 정방행렬일때 $\det A^T = \det A$

사이즈가 2일때 $C_{j,1} = C_{1,j}$ 이고 3이상일때도 cofactor expansion으로 전개하면 [2*2]행렬의 집합으로 쪼개지므로

Theorem 6. Multiplicative property

A와 B가 정방행렬일때

$$\det AB = (\det A)(\det B)$$

Cramer's Rule, Volume, and Linear Transformations

$A_i(\mathbf{b})$: 행렬 A의 i번째 column을 vector \mathbf{b} 로 변경한 것이다.

$$A_i(\mathbf{b}) = [\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{b}, \dots, \mathbf{a}_n]$$

Theorem 7 Cramer's Rule

invertible한 $[n \times n]$ 행렬 A와 \mathbb{R}^n 에 속한 \mathbf{b} 에 대하여 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 를 만족하는 unique solution \mathbf{x} 의 각 원소는 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\mathbf{x}_i = \frac{\det A_i(\mathbf{b})}{\det A}$$

x를 구하는게 아니라 x의 각 entry를 구하는 방법임을 주의하자

1. $AI_i(\mathbf{x}) = A[\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{x}, \dots, \mathbf{e}_n]$
2. $[A\mathbf{e}_1, \dots, A\mathbf{x}, \dots, A\mathbf{e}_n]$
3. $[a_1, \dots, A\mathbf{x}, \dots, a_n]$
4. $A_i(\mathbf{b})$

$$(\det A)(\det I_i(\mathbf{x})) = \det A_i(\mathbf{b})$$

$$\therefore \mathbf{x}_i = \frac{\det A_i(\mathbf{b})}{\det A}$$

여기서 $\det I_i(\mathbf{x})$ 는 \mathbf{x}_i 와 같다.(replacement를 이용해 echelon form만들고 주대각의 곱)

Using Cramer's Rule to know A^{-1}

- $A\mathbf{x} = \mathbf{e}_j$, $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{e}_j$ 여기서 x는 A^{-1} 의 j번째 column임을 알 수 있다.
- A^{-1} 의 (i, j) entry = $\mathbf{x}_i = \frac{\det A_i(\mathbf{e}_j)}{\det A}$, 크래머 법칙을 사용해 A^{-1} 의 특정 entry를 구할 수 있다.
- $\det A_i(\mathbf{e}_j) = (-1)^{j+i} \det A_{ji} = C_{ji}$ A의 (j, i) entry는 1, 그 column의 나머지는 0이므로 cofactor expansion이 간략화된다.

$$\therefore A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{bmatrix} C_{11} & C_{21} & \dots & C_{n1} \\ C_{12} & C_{22} & \dots & C_{n2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ C_{1n} & C_{2n} & \dots & C_{nn} \end{bmatrix}$$
 이러한 형태를 classical adjoint of A 혹은 $\text{adj}A$ 로 칭한다.(일
 핏 봐도 시간복잡도가 구리고 적용분야도 한정적이라 한다)

Theorem 8.

정방행렬 A에 대하여

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \text{adj}A$$

Theorem 9.

[2*2]행렬 A에 대하여 A의 column들로 이루어진 평행사변형의 넓이는 $|\det A|$ 이다.
 똑같은 방법으로 평행육면체의 부피도 구할 수 있다.

ex) $\begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$ 의 넓이를 구해보자

replacement는 determinant를 변화시키지 않는데 이를 통해 적당히 바꾸면 $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -9 \end{bmatrix}$ 으로코롬 되고 이 두
 column으로 만들어진 사각형의 넓이는 18이다.

처음 $\begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$ 행렬의 행렬식 역시 $|2*3 - (24)| = 18$ 으로 동일한 것을 알 수 있다.

Theorem 10.

$\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 로 보내는 행렬 A와 \mathbb{R}^2 에 평행사변형 S가 있을때

$\{\text{area of } T(S)\} = |\det(A)| \cdot \{\text{area of } S\}$

평행사변형과 A 둘다 정방행렬이므로 정리 6($\det AB = (\det A)(\det B)$)이 성립하기때문